【過去問 1】

次の問いに答えなさい。

(北海道 2016 年度)

問 1 次の文の に当てはまる語句を書きなさい。

(5) 種子植物のうち、マツやスギのように、雌花に子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を 植物という。

問 1	(5)	

問 1	(5)	裸子

問 1 (5) 種子植物のうち、胚珠が子房につつまれている植物を被子植物，胚珠がむき出しになっている植物を裸子植物という。

【過去問 2】

次の問いに答えなさい。

(青森県 2016 年度)

問1 図1は、ある植物の茎の横断面を表したものである。また、図2は、図1の一部を拡大したもので、Aは、根から吸収された水などが通る部分である。次のア、イに答えなさい。

ア Aの名称を書きなさい。

イ この植物について述べたものとして最も適切なものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

- 1 単子葉類に分類され、葉脈は網目状になっており、根はひげ根である。
- 2 単子葉類に分類され、葉脈は平行に並んでおり、根には主根と側根の区別がある。
- 3 双子葉類に分類され、葉脈は網目状になっており、根には主根と側根の区別がある。
- 4 双子葉類に分類され、葉脈は平行に並んでおり、根はひげ根である。

問1	ア	
	イ	

問1	ア	道管
	イ	3

問1

ア 根から吸収された水などが通る部分を道管という。

イ 維管束が輪のように並んでいるので、双子葉類に分類される。双子葉類の葉脈は網目状で、根は主根と側根をもつ。

【過去問 3】

次の問いに答えなさい。

(岩手県 2016 年度)

問1 次の図は、顕微鏡でゾウリムシを観察したときの視野とプレパラートを示した模式図です。視野の左上に見えているゾウリムシを視野の中央に動かしたいとき、プレパラートをどの方向に動かせばよいですか。ア～エのうちから、最も適当なものを一つ選び、その記号を書きなさい。

問1	

問1	ア

問1 ゾウリムシを視野の中央に動かすとき、プレパラートは動かしたい方向と反対に動かす。

【過去問 4】

洋さんは、農業試験場の人から聞いた「新しい品種のジャガイモを開発するときには、無性生殖ではなく、有性生殖を利用する」という話に興味をもち、ジャガイモの有性生殖と無性生殖について調べ、次のようにまとめた。下の問1～問6に答えなさい。

(秋田県 2016 年度)

【子のふえ方】	
〈有性生殖の場合〉 図1のような花が咲き、<u>a</u>受粉して子房が果実になり、<u>図2</u>のような種子でふえる。	〈無性生殖の場合〉 いもにふくまれる <u>b</u>デンプンなどの養分を使い、<u>図3</u>のような芽や根が出てふえる。
図1	図2
図3	

問1 下線部 a から、ジャガイモはどの植物に分類されるか、次から1つ選んで記号を書きなさい。

- ア 被子植物   イ 裸子植物   ウ シダ植物   エ コケ植物

問2 下線部 b があることを確かめるために用いるものは何か、次から1つ選んで記号を書きなさい。

- ア 酢酸カーミン溶液   イ ベネジクト液   ウ B T B 溶液   エ ヨウ素液

問1	
問2	

問1	ア
問2	エ

問1 受粉して子房が果実になるので、被子植物である。

問2 デンプンの指示薬はヨウ素液。ヨウ素液はデンプンに反応すると青紫色に変化する。

【過去問 5】

優太さんは、山形県で生産されている枝豆の品種である「だだちや豆」や「秘伝^{ひでん}」がおいしかったことから、ダイズに興味をもち、ダイズの種子を用いて植物の成長のしくみについて調べた。次は、優太さんが観察したことをまとめたものの一部である。あとの問いに答えなさい。

(山形県 2016 年度)

【根の細胞の観察】

①ダイズの種子を、しめさせたろ紙をしいたペトリ皿に入れた。数日後、根は、**図 1** のように伸びていた。A、B、Cの部分の細胞の様子を観察するために、伸びた根を、先から2cm切り取り、②うすい塩酸につけて処理し、染色した。そのあと、A、B、Cの部分を取り切った。切り取ったそれぞれの部分を、別のスライドガラスにのせ、カバーガラスをかけ、その上から軽くおしつぶし、プレパラートをつくった。それを、顕微鏡で同じ倍率で観察し、それぞれの部分のスケッチを**表**にまとめた。

図 1

表

観察した部分	A	B	C
スケッチ			

問 1 下線部①について、**図 2**のように、種子は果実の中にある。めしべにあり、果実になる部分を何というか、名称を書きなさい。

図 2

問 1	

問 1	子房

問 1 被子植物が受粉すると子房が果実になり、胚珠が種子になる。

【過去問 6】

次の問いに答えなさい。

(福島県 2016 年度)

問1 ヒキガエルの受精卵を水の入ったペトリ皿にとり、受精卵の表面が変化していくようすを 20～40 倍の倍率で観察する。このとき用いる顕微鏡として最も適当なものを、次のア～ウの中から1つ選びなさい。

ア 鏡筒上下式顕微鏡   イ ステージ上下式顕微鏡   ウ 双眼実体顕微鏡

問1	

問1	ウ

問1 鏡筒上下式顕微鏡やステージ上下式顕微鏡は、40倍以上で観察する場合に適している。また、受精卵のような立体的なものを観察するには、双眼実体顕微鏡が適している。

【過去問 7】

次の観察と実験を行った。問いに答えなさい。

(福島県 2016 年度)

観 察

福島県内のある中学校で、5月下旬の晴天の日に、校庭と校舎の周辺で生物の観察を行った。表は、観察することができた植物と動物を示している。

表

植 物		動 物	
イチョウ	ハコベ	トカゲ	カエル
スズメノカタビラ	ナズナ	アリ	マイマイ
スギナ	ツツジ	ムカデ	クモ

実 験

分解者のはたらきについて調べるために、ツツジが植えてある場所のやわらかく、しめった土を採取し、図のような実験を行った。

I 採取した土を、水の入ったビーカーに入れてよくかき混ぜ、しばらく放置し、上ずみ液をつくった。その上ずみ液をすくいにとって2等分し、それぞれ別のビーカーX、Yに入れた。ビーカーYに入れた上ずみ液は、数分間沸とうさせてから、じゅうぶんに冷ましておいた。

II ビーカーX、Yの両方に同量のうすいデンプン溶液を加えて、アルミニウムはくでふたをした。

III 3日後、ビーカーX、Yの溶液をそれぞれ試験管にとり、ヨウ素液を加えて、溶液の色の変化を調べた。

問1 観察について、次の①～③の問いに答えなさい。

- ① 表の植物の中で、葉脈が網目状になっていて、花弁が1つにつながっているものはどれか。適当なものを1つ書きなさい。
- ③ 表の植物の多くは、日当たりのよい場所で観察することができた。次の文は、光がじゅうぶんに当たるときに、植物の葉の細胞で行われていることについてまとめたものである。a、bにあてはまることばの組み合わせはどのようになるか。次のア～エの中から1つ選びなさい。

植物は、光がじゅうぶんに当たるとき、を行っており、出しているの量よりも、とり入れるの量のほうが多くなる。

	a	b
ア	光合成のみ	酸素
イ	光合成のみ	二酸化炭素
ウ	光合成と呼吸	酸素
エ	光合成と呼吸	二酸化炭素

問 1	①	
	③	

問 1	①	ツツジ
	③	エ

問 1

- ① 葉脈が網目状の植物は、被子植物で双子葉類のハコベ、ナズナ、ツツジの3種類。このうち花弁が1つにつながっている合弁花類は、ツツジだけである。
- ③ 植物の呼吸は日光とは関係なく一日中行われている。一方光合成は日光が当たる昼の間だけ行われる。そのため、昼の間は光合成によってとり入れられる二酸化炭素の量が、呼吸によって出される二酸化炭素の量を上回る。

【過去問 8】

次の問いに答えなさい。

(茨城県 2016 年度)

問2 タンポポの一つの花を手で持って図のようなルーペで観察し、スケッチした。このときの適切なルーペの使い方と、適切にスケッチされたものの組み合わせを、下のア〜クの中から一つ選んで、その記号を書きなさい。

【ルーペの使い方】

- A 花とルーペを両方とも前後に動かす。
- B 花は動かさず、ルーペを前後に動かす。
- C ルーペを目に近づけて持ち、花のみを前後に動かす。
- D ルーペを目から遠ざけて持ち、花のみを前後に動かす。

【スケッチ】

・先を細くけずった鉛筆を使い、影をつけてかいてある。

・先を細くけずった鉛筆を使い、影をつけずにかいてある。

ア Aとa	イ Aとb	ウ Bとa	エ Bとb
オ Cとa	カ Cとb	キ Dとa	ク Dとb

問2	

問2	カ

問2 観察するものが動かせるときは、ルーペを目に近づけて持ち、観察するものを前後に動かす。観察したもののスケッチは、細くけずった鉛筆で、はっきりと線がかき、影をつけない。

【過去問 9】

植物の体のつくりを調べるために、次の観察を行った。

このことについて、次の問1、問2、問3、問4に答えなさい。

(栃木県 2016 年度)

問1 図1のように、ホウセンカの根は太い根を中心にして、そこからAのような細い根が数多くのびていた。この細い根を何というか。

問2 図2のような茎の断面をもち、種子をつくる植物のなかまはどれか。

- ア 単子葉類   イ 双子葉類   ウ シダ植物   エ コケ植物

問3 赤い色水を根から吸収させると、根から茎、茎から葉へと水が運ばれるようすを観察することができる。図4は、茎から葉に分かれる部分で色水が通る道すじを模式的に表したものである。ホウセンカでこのような実験を行うとき、赤い色水が通りよく染まる部分は図2、図3のアからキのうちどれか。当てはまるものをすべて選び、記号で書きなさい。

問4 植物が根から吸収した水を葉まで運ぶのは何のためか。葉のはたらきと水の使われ方に着目して簡潔に書きなさい。

問1	
問2	
問3	
問4	

問1	側根
問2	イ
問3	ア, オ
問4	例 光合成の原料（材料）として使うため。

問1・問2 ホウセンカのような双子葉類の根は主根と側根からなり，茎の断面を見ると維管束が輪の形に並んでいる。

問3 根から吸い上げた水は道管を通して植物の全身に運ばれる。道管は茎の維管束では内側，葉では上側を通っている。

問4 葉では，根から吸い上げた水と気孔からとり入れた二酸化炭素を使って光合成が行われ，デンプンなどの養分と酸素が作り出されている。

【過去問 10】

植物の光合成と呼吸について調べるために、次の実験を行った。後の問1～問4に答えなさい。

(群馬県 2016 年度)

〔実験〕

青色のBTB溶液をビーカーに入れ、ストローで息を吹き込み緑色にした。その溶液を、図Iのように試験管A～Dに入れ、試験管A、Bには同じ長さに切ったオオカナダモを1本ずつ入れた。すべての試験管に気泡が入らないようにゴム栓をして、試験管B、Dにはアルミニウムはくを巻き、試験管内に光が当たらないようにした。4本の試験管を十分な光が当たる場所にしばらく置いた後、BTB溶液の色の変化を調べ、その結果を表にまとめた。

表

試験管	A	B	C	D
BTB溶液の色の変化	青色になった	黄色になった	変化なし	変化なし

問1 この実験において、試験管Aに対して試験管C、試験管Bに対して試験管Dを用意したのは、試験管A、Bの結果が、何によるものであることを確かめるためか、適切なものを、次のア～エから選びなさい。

ア 光   イ 温度   ウ 酸素   エ オオカナダモ

問2 試験管Aのオオカナダモの葉をとり出し、薄いヨウ素液をたらして顕微鏡で観察したところ、細胞の中の小さな粒が青紫色に染まっていた。このことについて、

- ① 細胞の中の小さな粒が青紫色に染まったことから、何がつくられていたとわかるか、書きなさい。
- ② この小さな粒を何というか、書きなさい。

問3 試験管Bでは、光合成が行われず、呼吸による二酸化炭素の放出のみが起こり、溶液が酸性となったため、表のような結果になったと考えられる。これに対して、試験管Aが表のような結果になった理由を書きなさい。

問 1		
問 2	①	
	②	
問 3		

問 1	エ	
問 2	①	デンプン
	②	葉緑体
問 3	例 光合成による二酸化炭素の吸収量の方が，呼吸による二酸化炭素の放出量よりも多くなり， 溶液がアルカリ性となったから。	

問 1 比較実験では，比較する条件以外の条件は同一にする。試験管 A と C，試験管 B と D では，オオカナダモ以外の条件は同一であることから，オオカナダモの有無による結果のちがいを観察するためのものであることが分かる。

問 2

- ① ヨウ素液と反応して青紫色に染まるのはデンプンである。
- ② デンプンがつくられるのは，光合成が行われる葉緑体の部分である。

問 3 試験管 A では，光合成と呼吸の両方が行われている。光合成では液中の二酸化炭素が吸収され，呼吸では液中に二酸化炭素が放出される。ただし光合成のはたらきの方が大きいので，液中の二酸化炭素は減少していく。そのため，溶液はアルカリ性が強くなっていき，BTB 溶液が青色になる。

【過去問 11】

次の問に答えなさい。

(埼玉県 2016 年度)

問3 次の①～④は、ゼニゴケとスギゴケのそれぞれの雄株、雌株をスケッチしたものです。雄株はどれですか。その番号の組み合わせとして最も適切なものを、下のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

問3	

問3	エ

問3 コケ植物は、胞子をつくり出す胞子のうをもつほうが雌株である。ゼニゴケは切れこみの深い傘状の胞子体の下に胞子のうができ、スギゴケは上にのびた胞子体の先に胞子のうができる。よって、これらのつくりをもたない②と④が雄株である。

【過去問 12】

Sさんは、雑木林に生息する生物を観察しました。また、自然界における生物どうしのつながりについて調べました。問1～問5に答えなさい。

(埼玉県 2016 年度)

観察

- 1 学校の近くの雑木林に生息する動物を調査した。次の表は、雑木林で見られた動物をまとめたものである。

表	トカゲ	バッタ	クモ	マイマイ
	ヘビ	カエル	モンシロチョウ	

- 2 雑木林に積もった落ち葉を観察したところ、表面の一部が白い毛のようなものでおおわれた落ち葉を見つけた。
- 3 2で見られた白い毛のようなものを、図1の顕微鏡を使って150倍の倍率で観察したところ、「細長い細胞のつながり」が見られた。図2はそのスケッチである。

調べてわかったこと

- 1 雑木林に生息する生物について調べたところ、観察の1で見られた動物のほかにも多くの生物が生息しており、雑木林の中では、草食動物が植物を食べ、その草食動物を肉食動物が食べて生活するという関係があることがわかった。また、①雑木林に生息するすべての生物と、水や空気などの生物以外の環境を一つのまとまりとしてとらえることができることもわかった。
- 2 肉食動物、草食動物、植物を、数量の多いものから順に下から積み上げていくと、つり合いが保たれている状態の数量の関係は、図3のようなピラミッドの形で表すことができることがわかった。また、②何らかの原因で草食動物の数量の一時的な増加がみられたとき、肉食動物と植物の数量は変動するが、ある程度長い期間で考えると、再び生物の数量的なつり合いが保たれている状態に戻ることもわかった。
- 3 観察の2で見られた白い毛のようなものを調べるとカビのなかまであり、③カビは生物の死がいや排出物などの有機物を無機物に分解していることがわかった。

【過去問 13】

SさんとTさんは、学校に植えられているアジサイについて**観察1**、**2**と**実験**を行い、その**結果**について考察しました。これに関して、あとの**問1**～**問3**に答えなさい。

(千葉県 2016 年度 後期)

観察1

アジサイの花を一つとり、花のつくりを観察した。図1は、そのときスケッチしたものである。

図1

観察2

葉を観察すると、一本のアジサイの中に図2のように3種類の葉があった。

葉x：緑色の部分がなく、全体が白色の葉

葉y：緑色と白色の部分の両方がある葉

葉z：白色の部分がなく、全体が緑色の葉

図2

実験

十分に日光が当たっている葉x～zを採取し、それぞれを、図3のように、約80℃の湯であたためたエタノールにひたした。その後、水で葉を洗って、ヨウ素液(ヨウ素^{ようえき}溶液)につけた。

余分なヨウ素液を除いてから、葉の色を観察した。

図3

結果

葉の白色だった部分は、ヨウ素液で^{せんしよく}染色されず、緑色だった部分は濃く染色された。

問1 図1のAは何か。次のア～エのうちから最も適当なものを一つ選び、その符号を書きなさい。

- ア 花卉   イ がく   ウ 子葉   エ 子房^{しぼう}

問2 実験で、下線部の操作は何のために行うのか。その理由を簡潔に書きなさい。

問3 次の文章は、実験の結果について考察したときの会話である。あとの①、②の問いに答えなさい。

Sさん：葉の白色だった部分は、ヨウ素液で染まらなかったので、葉xは光合成を行っていないのだと思います。

Tさん：光合成を行っていないのに、葉xはなぜ枯れ^かれないのですか。

先 生：植物の体の全ての細胞^{さいぼう}が光合成を行っているわけではありません。

葉でつくられたデンプンが 体全体へ運ばれます。

Sさん：光合成を行っていることを、別の方法で調べることはできませんか。

先 生：図4のように、アジサイの葉を透明なポリエチレンの袋でおおい、ストローで息をふきこんでから、空気の出入りがないように袋を密閉します。光合成を行うのに十分な強さの日光を数時間当て、袋の中の酸素と二酸化炭素の割合の変化を調べます。

Sさん：葉が光合成を行っていれば袋の中の し、葉が光合成を行っていなければ袋の中の と思います。

先 生：そのとおりです。

① 会話文中の にあてはまる最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

- ア 水に溶けやすい物質に変わり、道管を通して
- イ 水に溶けやすい物質に変わり、師管を通して
- ウ デンプンのまま水と混ざり、道管を通して
- エ デンプンのまま水と混ざり、師管を通して

② 会話文中の にあてはまる最も適当なものを、Q群のア、イのうちから、また、 にあてはまる最も適当なものを、R群のア～ウのうちからそれぞれ一つずつ選び、その符号を書きなさい。

- Q群 ア 酸素の割合が増加し、二酸化炭素の割合は減少する
- イ 酸素の割合が減少し、二酸化炭素の割合は増加する
- R群 ア 酸素の割合が増加し、二酸化炭素の割合は減少する
- イ 酸素の割合が減少し、二酸化炭素の割合は増加する
- ウ 酸素の割合も二酸化炭素の割合も変化しない

問1				
問2				
問3	①			
	②	q		r

問1	イ			
問2	葉の緑色の部分を脱色するため。			
問3	①	イ		
	②	q	ア	r

問1 アジサイの大きな花弁のように見える部分はがくである。

問2 葉をあたためたエタノールにひたしてから水で洗うと、葉の緑色の部分が脱色され、ヨウ素液による色の変化が見やすくなる。

問3

① 葉でつくられたデンプンは、水に溶けやすい物質に変わり、師管を通して運ばれる。また、根で吸い上げた水や肥料分は、道管を通して運ばれる。

② 植物は呼吸によって酸素をとりこみ、二酸化炭素を放出する。また、光合成によって二酸化炭素をとりこみ、酸素を放出する。葉が光合成を行っている場合、光合成のはたらきは呼吸のはたらきよりも大きいので、袋の中の酸素の割合が増加し、二酸化炭素の割合は減少する。葉が光合成を行っていない場合、呼吸のはたらきによって酸素の割合が減少し、二酸化炭素の割合は増加する。

【過去問 14】

次の問いに答えなさい。

(千葉県 2016 年度 前期)

問4 シダ植物の特徴として最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

- ア 胞子^{ほうし}でふえる。
- イ 維管束がない。
- ウ 花を咲かせる。
- エ 根^{くき}, 茎, 葉の区別がない。

問4	

問4	ア

問4 シダ植物は種子植物とはちがい花を咲かせず胞子でふえるが、維管束をもち根、茎、葉の区別がある。

【過去問 15】

植物の体のつくりの観察と遺伝の規則性を調べる実験について、次の問いに答えよ。

(東京都 2016 年度)

<観察>を行ったところ、<結果 1>のようになった。

<観察>

- (1) 校庭にあるアサガオの葉をとり、ルーペで観察し、スケッチした。
- (2) 校庭にあるアサガオの花をとり、カミソリの刃で縦に切り、花の断面をルーペで観察し、スケッチした。

<結果 1>

- (1) 校庭にあるアサガオは、並葉の個体と丸葉の個体の 2 種類だけであり、観察した葉のつくりは、どちらも図 1 のように網状脈だった。
- (2) 観察したアサガオの花のつくりは、図 2 のようにおしべとめしべが花弁に包まれている構造で、おしべには花粉が付いていた。

図 1

図 2

問 1 <結果 1>から、アサガオの茎の維管束や根のつくりと、アサガオの殖え方を組み合わせたものとして適切なのは、次の表の **ア**~**エ**のうちではどれか。

	アサガオの茎の維管束や根のつくり	アサガオの殖え方
ア	維管束は全体に散らばっており、主根はなく、細い根が広がっている。	生殖細胞をつくらずに、細胞分裂によって新しい個体を殖やす。
イ	維管束は全体に散らばっており、主根はなく、細い根が広がっている。	精細胞と卵細胞がつくられ、二つの核が合体して新しい個体を殖やす。
ウ	維管束は輪のように並んでおり、主根を中心に側根が伸びている。	生殖細胞をつくらずに、細胞分裂によって新しい個体を殖やす。
エ	維管束は輪のように並んでおり、主根を中心に側根が伸びている。	精細胞と卵細胞がつくられ、二つの核が合体して新しい個体を殖やす。

問 1	

問 1	エ

問 1 <結果 1>で、葉脈が網状脈であったことから、アサガオは双子葉類であることが分かる。双子葉類の維管束

は輪のように並び、根は主根と側根からなる。また、おしべとめしべがあり、おしべに花粉が付いていることから、アサガオが有性生殖を行うことが分かる。有性生殖では、精細胞と卵細胞がつくられ、それらの核が合体（受精）することで新しい個体を殖やす。

【過去問 16】

Kさんは、植物が光合成を行う条件について詳しく調べるために、次のような実験を行った。これらの実験とその結果について、あとの各問いに答えなさい。

(神奈川県 2016 年度)

- 〔実験1〕 ① 2つのオオカナダモ a, bを、それぞれ水の入った水そうに入れ、どちらも光が当たらないところに24時間置いた。その後、aとbから1枚ずつ取った葉を脱色し、水洗いした後、ヨウ素液を1滴ずつ加える処理をして、それぞれの細胞のようすを観察した。
- ② ①の後、aは光が当たるところに、bはそのまま光の当たらないところに、どちらも6時間置いた。その後、aとbの葉を1枚ずつ取り、①と同じ処理をして、それぞれの細胞のようすを観察した。

- 〔実験2〕 図1のように、透明なペットボトルを4つ用意し、装置A, B, C, Dとした。装置B, Dは全体をアルミニウムはくで包み、装置A, B, Dには、光の当たらないところに24時間置いたオオカナダモをそれぞれ入れた。さらに、装置A, B, Cには、水に溶けて二酸化炭素を生じる炭酸水素ナトリウムの水溶液を、装置Dには水のみを加えた。すべての装置に光を当てて24時間静かに置き、装置内に酸素の発生が見られるかを確認した。ただし、すべての装置の水温は同じであり、実験中は一定であったとする。

図1

- 〔実験3〕 図2のように、同じ大きさの容器を5つ用意し、装置E, F, G, H, Iとした。装置F, G, H, Iには、同じ植物の葉を同じ重さになるように入れてふたをし、装置Iは暗箱に入れて光が当たらないようにした。光源のみを点灯した暗室内に、それぞれの装置を光源から図2に示す距離に置いて、一定時間放置した。その後、すべての装置内の二酸化炭素濃度を測定した。ただし、実験前のすべての装置内の二酸化炭素濃度は5.5%とした。

図2

問1 植物がデンプンをつくるには光が必要であることを、〔実験1〕で確かめるにはどのような結果が得られればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

- 1 ①ではa, bともに細胞内に青紫色に変化した部分が見られるが, ②ではaのみで見られる。
- 2 ①ではa, bともに細胞内に青紫色に変化した部分が見られないが, ②ではaのみで見られる。
- 3 ①ではa, bともに細胞内に青紫色に変化した部分が見られるが, ②ではbのみで見られる。
- 4 ①ではa, bともに細胞内に青紫色に変化した部分が見られないが, ②ではbのみで見られる。

問2 〔実験2〕では、酸素の発生が装置Aのみで見られた。次の□は、〔実験2〕についてのKさんの考察である。

〔実験2〕は、光合成に必要な要素（植物、光、二酸化炭素）が一つでも不足すると反応が進まないことを確かめる目的で行ったが、このままでは（ X ）ということが確認できていないことに気がついた。そこで、装置B～Dのうち装置（ Y ）について（ Z ）こととし、再度〔実験2〕と同様の実験を行うことにした。その結果、装置Aでは酸素の発生が観察でき、他の装置では装置Aと同程度の酸素の発生が見られないとすれば、この実験の目的は達成できたといえる。

(i) 文中の（ X ）に適する内容を前後の語句につながるように20字以内で書きなさい。

(ii) 文中の（ Y ）に適する記号（B～D）を書き、（ Z ）に最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

1 アルミニウムはくをはずす	2 装置全体をアルミニウムはくで包む
3 オオカナダモを入れる	4 水を炭酸水素ナトリウム水溶液に取りかえる

問3 図3は、〔実験3〕の結果をグラフに表したものである。このグラフから、呼吸によって放出された二酸化炭素の量より少ない量の二酸化炭素を使って光合成を行ったと考えられる装置はどれか。次の1～5の中から一つ選び、その番号を書きなさい。ただし、装置F～Iで植物の呼吸により放出される二酸化炭素の量はいずれも同じであるとし、装置内に呼吸によって放出された二酸化炭素も光合成に使うことができるものとする。

1 装置F	2 装置G	3 装置H
4 装置Fと装置G	5 装置Gと装置H	

図3

問1											
問2	(i)										
		Y					Z				
問2	(ii)										
問3											

問1	2										
問2	(i)	二	酸	化	炭	素	が	不	足	す	る
		と	反	応	が	進	ま	な	い		
	(ii)	Y					Z				
		D					1				
問3	3										

問1 ヨウ素液はデンプンと反応して青紫色に変化する。植物に光が当たっているときだけデンプンができていることが確認できるのは、②のbのみ変色した場合である。

問2 (i)・(ii) オオカナダモが入っていて、光が当たり、炭酸水素ナトリウム水溶液を加えていない実験装置がないと、装置Aとの比較で二酸化炭素の必要性を判断することができない。

問3 装置Fと装置Gでは、二酸化炭素濃度がもとの数値よりも少なくなっているので、呼吸によって放出した量以上の二酸化炭素が使われていることになる。

【過去問 17】

次の表は、植物を分類したものである。あとの問いに答えなさい。

(富山県 2016 年度)

表

植物の種類		植物の例
(X)	被子植物	ササ
	双子葉類	エンドウ
	(Y)	イチョウ
シダ植物		イヌワラビ
コケ植物		エゾスナゴケ

問1 (X), (Y) に適切な名称をそれぞれ書きなさい。

問2 単子葉類の特徴を述べた文として、適切なものはどれか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 葉脈は平行に通り、茎の維管束は輪の形に並ぶ。
- イ 葉脈は平行に通り、茎の維管束は散らばっている。
- ウ 葉脈は網目状に通り、茎の維管束は輪の形に並ぶ。
- エ 葉脈は網目状に通り、茎の維管束は散らばっている。

問3 双子葉類に分類される植物を、次のア～エから2つ選び、記号で答えなさい。

- ア イネ   イ トウモロコシ   ウ アサガオ   エ アブラナ

問4 図はイヌワラビの葉の裏側についていたものようすである。A、Bの名称を書きなさい。

問5 コケ植物は、表中の他の植物とは、からだのつくりが違う点がある。その違いを簡単に書きなさい。

問1	X		Y	
問2				
問3				
問4	A		B	
問5				

問1	X	種子植物	Y	裸子植物
問2	イ			
問3	ウ, エ			
問4	A	胞子のう	B	胞子
問5	葉, 茎, 根の区別がない。 維管束がない。 など			

問1 種子植物には、被子植物(ササ, エンドウ)と裸子植物(イチョウ)がある。

問2 単子葉類の葉脈は平行脈, 茎の維管束はばらばらに散らばっている。

問3 ア, イは単子葉類。

問4 イヌワラビなどのシダ植物は, 葉の裏に胞子のうができ, 胞子のうでつくられた胞子によってなかまをふやす。

問5 コケ植物は根・茎・葉の区別がなく, 維管束をもたない。

【過去問 18】

アブラナやイネなどの 10 種類の植物をいろいろな特徴をもとになかま分けすると、図 1 のように A～E の 5 つのグループに分けることができる。以下の各問に答えなさい。

(石川県 2016 年度)

図 1

問 1 図 1 の ( ) にあてはまる名称を書きなさい。

問 2 これらの植物は、図 1 の A～E のいずれかで、維管束があるものとないもの上下 2 つのグループに分けることができる。その区切りはどこか、符号を書きなさい。

問 3 図 2 の a～d は、双子葉類のアブラナの花を分解して並べたものである。次の (1), (2) に答えなさい。

図 2

(1) a～d を、花の外側からついている順に並べ、その符号を書きなさい。

(2) 双子葉類のアブラナとタンポポは、花の特徴によってそれぞれ別のなかまに分けることができる。このとき、アブラナは何というなかまに分けられるか、書きなさい。

問 5 下の文は、図 4 の植物がどのなかまであるかを、図 1 にそって判断したものである。文中の①, ③には図 4 に見られる植物の特徴を、②には図 1 の ㊸ または ㊹ のいずれかの符号を、④には図 1 の A～E のいずれか 1 つの符号をそれぞれ書き、文を完成させなさい。

この植物は、まず、(①) という特徴によって (②) のなかまに分類できる。さらに、(③) という特徴から (④) のなかまであると判断できる。

図 4

問 1	
問 2	
問 3	(1) → → →
	(2)
問 5	①
	②
	③
	④

問 1	裸子植物	
問 2	エ	
問 3	(1) b → d → c → a	
	(2) 離弁花類	
問 5	① 花がある	
	② ㊸	
	③ 胚珠が子房の中にあり，葉脈が平行脈である	
	④ B	

問 1 図 1 の㊸は種子をつくる種子植物，㊹は種子をつくらない植物である。種子植物のうち，胚珠が子房でおおわれている被子植物に含まれない植物は，胚珠がむき出しになっている裸子植物である。

問 2 ㊸の種子植物には，すべてに維管束がある。㊹の種子をつくらない植物のうち，シダ植物には維管束があるが，コケ植物には維管束がない。

問 3

(1) アブラナの花は，外側からがく (b)，花弁 (d)，おしべ (c)，めしべ (a) の順についている。

(2) 双子葉類は，花弁が 1 つにつながっている合弁花類と，花弁が 1 枚ずつばらばらになっている離弁花類に分けられる。アブラナの花弁は 1 枚ずつばらばらになっているので，離弁花類である。

問 5 図 4 の植物は，めしべをもつ花を咲かせていることから，種子をつくる種子植物㊸であることがわかる。また，胚珠が子房でおおわれていることから被子植物であることがわかり，さらに葉の葉脈が平行脈であることから単子葉類であることがわかる。

【過去問 19】

葉と茎のはたらきを調べるために、次の実験を行った。あとの問いに答えよ。

(福井県 2016 年度)

〔実験1〕 茎の太さや長さ、葉の大きさや枚数がほぼ同じアサガオのつるを4本用意した。図1のように、水が入ったメスシリンダーA～Dにアサガオのつるをさして、油を浮かべ水面をおおった。アサガオのつるは、表1のようにワセリンのぬり方を変えてある。これらを日光の当たる風通しの良いところにおき、4時間後、メスシリンダー内の減った水の量を調べ、その結果を表2にまとめた。ただし、Dは空欄にしてある。また、ワセリンをぬったところからは、水蒸気が空気中に放出されないものとする。

図1

表1

	ワセリンのぬり方
A	すべての葉の表側だけにぬる。
B	すべての葉の裏側だけにぬる。
C	すべての葉の両面にぬる。
D	どこにもぬらない。

表2

	減った水の量[mL]
A	4.4
B	1.6
C	0.5
D	

〔実験2〕 図2のように、三角フラスコに赤インクで着色した水を入れ、根を切ったヒマワリをさし、3時間吸わせた。その後、茎と葉の断面を、双眼実体顕微鏡で観察した。

図2

問1 表2で、メスシリンダーの水が減ったのは、アサガオが吸い上げた水を、水蒸気として空気中へ放出するためである。このはたらきを何というか。

問2 実験1で、メスシリンダーA～Dの減った水の量を用いて、葉の裏側から放出される水蒸気の量を求めることができる組み合わせはどれか。適当なものを次のア～カから2つ選んで、その記号を書け。

- ア AとB   イ AとC   ウ AとD
 エ BとC   オ BとD   カ CとD

問3 実験1で、メスシリンダーDの減った水の量は何mLであると考えられるか。

問4 次のア～エの文は、図3の双眼実体顕微鏡の使い方について述べたものである。双眼実体顕微鏡の使い方の順序として正しいものはどれか。最も適当なものを下の①～⑥から1つ選んで、その番号を書け。

図3

ア 左目だけでのぞきながら、視度調節リングを左右に回して、ピントを合わせる。

イ 粗動ねじをゆるめ、鏡筒を上下させて両目でおよそのピントを合わせる。

ウ 右目だけでのぞきながら、調節ねじでピントを合わせる。

エ 両目の間隔に合うように、鏡筒を調節し、左右の視野が1つに重なって見えるようにする。

- ① イ→エ→ア→ウ   ② エ→イ→ア→ウ   ③ イ→エ→ウ→ア
 ④ エ→イ→ウ→ア   ⑤ イ→ウ→ア→エ   ⑥ エ→ア→ウ→イ

問5 次の図は、実験2で観察した茎と葉の断面の模式図である。赤インクで染まった部分はどこか。適当なものを図のア～エから2つ選んで、その記号を書け。また、その水の通り道の名称を書け。

茎の断面の模式図

葉の断面の模式図

問1				
問2				
問3	mL			
問4				
問5	記号		名称	

問1	蒸散			
問2	イ	オ		
問3	5.5 mL			
問4	④			
問5	記号	ア	ウ	名称 道管

問1 植物は、吸い上げた水を主に葉の気孔から水蒸気として空気中に放出している。このはたらきを蒸散という。
 問2 Aは葉の裏側とつるの表面からの蒸散量を、Cはつるの表面からの蒸散量を示す。よってA-Cで葉の裏側からの蒸散量を求められる。また、Dは葉の表裏とつるの表面からの蒸散量を、Bは葉の表側とつるの表面からの蒸散量を示す。よってD-Bで葉の裏側からの蒸散量を求められる。

問3 $A + B - C$ で求めることができる。 $4.4 \text{ [mL]} + 1.6 \text{ [mL]} - 0.5 \text{ [mL]} = 5.5 \text{ [mL]}$

問4 双眼実体顕微鏡は、鏡筒を動かして視野の調節→粗銅ねじでピントの調節→右目と調節ねじでピントの調節→左目と視度調節リングでピントの調節の順に操作する。

問5 実験2で赤く染まる部分は、ヒマワリの茎の切り口から吸収された水が通る道管の部分である。道管は、茎の部分では維管束の茎の中心寄りを通り、葉の部分では葉脈の葉の表側を通る。

【過去問 20】

各問いに答えなさい。

(長野県 2016 年度)

I 生態系における微生物と植物の役割について調べた。

- 〔実験 1〕
- ① 林の生物を、双眼実体顕微鏡を使って観察した。
  - ② 図 1 のように、同じ三角フラスコ A, B を用意し、同じ質量の林の土を、A にはそのまま、B にはじゅうぶんに焼いて入れた。
  - ③ A, B にうすめたデンプン溶液をそれぞれ同量加え、ゴム栓をして室温で放置した。
  - ④ 5 日後、A, B 中の液を試験管に少量ずつとり、それぞれにヨウ素液を加えて色の変化を調べると、A 中の液は変化しなかったが、B 中の液は青紫色に変化した。

図 1

- 〔実験 2〕
- ① 24 時間光が当たらないようにしておいたイヌワラビを採集した。
  - ② ①の葉をたたき染めし、うすめたヨウ素液にひたしたところ、色は変化しなかった。
  - ③ 同じポリエチレンの袋 C~F を用意した。C, E には大きさのそろった①の葉を同じ枚数入れ、D, F には何も入れなかった。
  - ④ C~F にそれぞれ息をふきこみ、袋の口を閉じ、袋の中の酸素と二酸化炭素の割合を測定した。
  - ⑤ C, D は光がじゅうぶんに当たる場所に置き、E, F は光が当たらない場所に置いた。
  - ⑥ 2 時間後、C~F の酸素と二酸化炭素の割合を測定し、④の結果と比較し、表にまとめた。
  - ⑦ C, E の葉をたたき染めし、うすめたヨウ素液にひたして色の変化を調べ、表にまとめた。

表

	C	D	E	F
酸素の割合	増加した	変化なし	減少した	変化なし
二酸化炭素の割合	減少した	変化なし	増加した	変化なし
色の変化	青紫色		変化なし	

問 1 図 2 の双眼実体顕微鏡を使うとき、最も適切な操作の順になるように、次のア~エを左から並べて、記号を書きなさい。

- ア 左目だけでのぞき、G でピントを合わせる。
- イ H をゆるめ、鏡筒を上下させて両目でおよそのピントを合わせる。
- ウ 右目だけでのぞき、I でピントを合わせる。
- エ 両目の間隔に合うように鏡筒を調節し、左右の視野が重なって、1 つに見えるようにする。

図 2

問4 表のEとFを比較したことからわかることは何か、最も適切なものを次のア～エから1つ選び、記号を書きなさい。

- ア 光合成には、光が関係している。   イ 光合成には、光が関係していない。
 ウ 呼吸には、光が関係している。   エ 呼吸には、光が関係していない。

問5 表で、Cの二酸化炭素の割合が減少した理由を、呼吸と光合成で出入りする二酸化炭素の量のちがいにふれて、簡潔に説明しなさい。

問1	→ → →
問4	
問5	

問1	エ → イ → ウ → ア
問4	エ
問5	例 呼吸で放出される二酸化炭素の量より、光合成で吸収される二酸化炭素の量が多いから。

問1 双眼実体顕微鏡を使うときは、まず両目の間隔に合うように鏡筒を調節し、左右の視野が重なって1つに見えるようにする。次に、Hの粗動ねじをゆるめ、鏡筒を上下させて両目でおよそのピントを合わせる。それから右目だけのぞき、Iの調節ねじ（微動ねじ）でピントを合わせて、左目だけのぞき、Gの視度調節リングを回してピントを合わせる。

問4 Eだけで酸素が減少し、二酸化炭素が増加したことから、Eでは呼吸が行われたと考えられる。つまり、光が当たらなくても植物は呼吸をしていることがわかる。

問5 光がじゅうぶんに当たっている場合、呼吸で放出される二酸化炭素よりも光合成で吸収される二酸化炭素の方が多いため、二酸化炭素は減少する。また、呼吸で吸収される酸素よりも光合成で放出される酸素の方が多いため、酸素は増加する。

【過去問 21】

身近な植物を用いて**実験 1**，**2**を行った。問いに答えなさい。

(岐阜県 2016 年度)

〔**実験 1**〕 水を入れた水槽ⅠとⅡにそれぞれオオカナダモを入れ、水槽Ⅰを光が当たるところに置き、水槽Ⅱを光が当たらないところに置いた。1日後、水槽ⅠとⅡから、それぞれオオカナダモの先端近くの葉をとり出し、プレパラートをつくった。顕微鏡で観察したところ、どちらの葉の細胞の中にも緑色の粒が見られた。

また、その後、水槽ⅠとⅡから、それぞれオオカナダモの先端近くの葉をとり出し、**図 1**のように、熱湯であたためたエタノールの中に入れて、葉の緑色を脱色した。脱色した葉を水洗いし、スライドガラスにのせ、うすめたヨウ素液をたらし、カバーガラスをかけた。顕微鏡で観察したところ、水槽Ⅰからとり出した葉の細胞の中には青紫色の粒が見られたが、水槽Ⅱからとり出した葉の細胞の中には青紫色の粒が見られなかった。

図 1

〔**実験 2**〕 3本の試験管A～Cを用意し、試験管AとBにタンポポの葉を入れ、試験管Cには何も入れなかった。次に、試験管A～Cそれぞれにストローで息をふきこみ、すぐにゴム栓でふたをした。さらに、試験管Bをアルミニウムはくで包み、中に光が当たらないようにした。**図 2**のように、試験管A～Cを光が当たる場所に30分置いた後、それぞれの試験管のゴム栓をはずして石灰水を少し入れ、再びゴム栓でふたをした。それぞれの試験管をよくふったところ、試験管Aに入れた石灰水は変化が見られなかったが、試験管BとCに入れた石灰水は白くにごった。

図 2

問1 **実験 1**で、葉の細胞の中に見られた緑色の粒を何というか。ことばで書きなさい。

問2 エタノールをあたためる場合、**図 1**のようにエタノールを火で直接加熱しないのは、エタノールにどのような性質があるためか。簡潔に説明しなさい。

問3 **実験 1**の結果から、光を当てたオオカナダモの葉の細胞の中に見られた粒に何がふくまれていたことがわかるか。ことばで書きなさい。

問4 次の文中の□の(1)～(3)にあてはまるものを、次のア～キからそれぞれ1つずつ選び、符号で書きなさい。

実験 2で、□(1)はタンポポの葉があるかないかの条件だけを変えて結果を比べる組み合わせであり、

□(2)は光が当たるか当たらないかの条件だけを変えて結果を比べる組み合わせである。これらの組み合わせで結果を比べることにより、タンポポの葉に光を当てると試験管の中の□(3)することがわかる。

ア 試験管AとB   イ 試験管AとC   ウ 試験管BとC   エ 酸素が増加

オ 酸素が減少   カ 二酸化炭素が増加   キ 二酸化炭素が減少

問5 オオカナダモやタンポポなどの生産者である植物が、光エネルギーを利用して無機物から有機物をつくるはたらきを何というか。ことばで書きなさい。

問1					
問2					
問3					
問4	(1)		(2)		(3)
問5					

問1	葉緑体				
問2	火がつきやすい性質があるため。				
問3	デンプン				
問4	(1)	イ	(2)	ア	(3) キ
問5	光合成				

問1 植物の細胞の中に見られる緑色の粒を葉緑体という。葉緑体では光合成が行われる。

問2 エタノールには火がつきやすいという性質があるので、火で直接加熱するのではなく、熱湯に入れてあたためる。

問3 ヨウ素液はデンプンに反応して青紫色を示す。よって、ヨウ素液によって青紫色になった粒にはデンプンがふくまれていることがわかる。

問4 試験管AとCはどちらも光が当たっているが、Aはタンポポの葉が入っているのに対して、Cは葉が入っていない。試験管AとBはどちらもタンポポの葉が入っているが、Aは光が当たっているのに対して、Bはアルミニウムはくで包まれているため光が当たらない。Aに入れた石灰水だけは変化が見られなかったことから、Aでは試験管の中の二酸化炭素がなくなっており、BとCでは試験管の中に二酸化炭素が残っていることがわかる。これらの結果から、タンポポの葉に光を当てると試験管の中の二酸化炭素が減少するとわかる。

問5 植物は光合成によって、水や二酸化炭素からデンプンや酸素をつくり出している。水や二酸化炭素は無機物、デンプンは有機物である。

【過去問 22】

次の問1，問2に答えなさい。

(愛知県 2016 年度 B)

問1 図1は，ある植物の葉の断面を模式的に表したものである。
このうち，根から吸収した水が通る管について説明した文として最も適当なものを，次のアからエまでの中から選んで，そのかな符号を書きなさい。

- ア 根から吸収した水が通る管は図1のaであり，師管という。
- イ 根から吸収した水が通る管は図1のaであり，道管という。
- ウ 根から吸収した水が通る管は図1のbであり，師管という。
- エ 根から吸収した水が通る管は図1のbであり，道管という。

図1

問1	

問1	イ

問1 根から吸収した水が通る管は道管で，葉の部分では葉脈の表側（上側）を通過している。

【過去問 23】

ホウセンカの茎のつくりや花粉のようすについて調べるために、次の〈観察Ⅰ〉・〈観察Ⅱ〉を行った。これについて、下の問1～問3に答えよ。

(京都府 2016 年度)

〈観察Ⅰ〉 右の①図のように、赤色に着色した水を入れた三角フラスコに、花を取り除いたホウセンカをさして1日おき、茎のX部分をうすく輪切りにして、スライドガラスの上にのせる。これに水を1滴落とし、カバーガラスをかけ、顕微鏡を用いて40倍の倍率で観察する。

〈観察Ⅱ〉 新しいスライドガラスにショ糖水溶液(砂糖水)を1滴落とし、その上にホウセンカの花粉をまき、10分間おく。これに酢酸オルセイン溶液を1滴落とし、5分間おいてカバーガラスをかけ、顕微鏡を用いて100倍の倍率で観察する。

①図

ホウセンカ
X
赤色に着色した水

問1 次の文章は、〈観察Ⅰ〉・〈観察Ⅱ〉における顕微鏡の使い方について述べたものである。文章中の ～ に入るものを、 は下の i 群(ア)・(イ)から、 は ii 群(カ)・(キ)から、 は iii 群(サ)・(シ)からそれぞれ1つずつ選べ。

まず、、反射鏡としぼりを用いて視野全体の明るさを調節した後、プレパラートをステージにセットする。ピントを合わせるときには、対物レンズを低倍率のものにして、対物レンズを横から見ながら調節ねじを回して 、その後、接眼レンズをのぞきながら調節ねじを反対に回してピントを合わせる。低倍率の対物レンズでピントを合わせた後に対物レンズを高倍率のものにして観察するが、高倍率になると ので、反射鏡としぼりを用いて調節する。

- i 群 (ア) 接眼レンズをとりつけてから対物レンズをとりつけ
- (イ) 対物レンズをとりつけてから接眼レンズをとりつけ
- ii 群 (カ) 対物レンズとステージを近づけ   (キ) 対物レンズとステージを遠ざけ
- iii 群 (サ) 視野全体が明るくなる   (シ) 視野全体が暗くなる

問2 〈観察Ⅰ〉において、茎の断面の一部が赤く染まっているようすが観察された。観察した茎の断面をスケッチしたものとして最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から1つ選べ。ただし、赤く染まっている部分を黒く塗りつぶして示している。

問1	i 群	ii 群	iii 群
問2			

問1	i 群 ア	ii 群 カ	iii 群 シ
問2	ウ		

問1

ア…対物レンズを先につけると、鏡筒の先から入ったほこりなどが対物レンズの上にたまってしまふ。これを防ぐために、接眼レンズを先にとりつける。

イ…ピントを合わせる前に、まず横から見ながら対物レンズとステージを近づけておく。その後接眼レンズをのぞきながら調節ねじを回して、対物レンズをプレパラートから離しながらピントを合わせる。逆に対物レンズをプレパラートに近づけながらピントを合わせると、対物レンズの先端でプレパラートを割ってしまう危険性がある。

ウ…高倍率になると視野がせまくなり、レンズに入射する光の量が少なくなるため、視野が暗くなる。

問2 赤く染まるのは、茎の切り口から吸収された水が通る道管の部分である。双子葉類であるホウセンカの道管は、輪状に並ぶ維管束の中心よりを通っている。

【過去問 24】

岩石や地層に関する次の問いに答えなさい。

(兵庫県 2016 年度)

問1 火成岩のつくりのちがいを調べるために、次の(a)~(d)の手順で**実験**を行った。

〈実験〉

- (a) 約 80℃の濃いミョウバンの水溶液をつくり、これをペトリ皿A, Bに同量ずつ入れた。
  - (b) (a)のペトリ皿A, Bを、図1のように、約 80℃の湯が入った水そうにつけた。
  - (c) 結晶ができたときに、図2のように、ペトリ皿Bだけを氷水の入った別の水そうに移した。
  - (d) しばらく放置した後、ペトリ皿A, Bにできた結晶(図3)を観察した。
- (3) 岩石の薄片を観察する場合、ルーペの使い方として適切なものを、次のア~エから1つ選んで、その符号を書きなさい。ただし、図中の矢印は、岩石、ルーペ、顔を動かす方向を表している。

問1	(3)	

問1	(3)	ウ

問1 (3) ルーペを目に近づけて持ち、岩石の位置を動かして観察する。

【過去問 25】

植物の体のつくりを調べるために、次の**観察 1**、**観察 2**を行った。あとの各問いに答えなさい。

(鳥取県 2016 年度)

観察 1

ある被子植物を根ごと抜きとり、根と葉を観察し、そのつくりについて班で話し合った。

図 1 は、根と葉のスケッチであり、あとの**会話**は、班で話し合ったようすである。

会話

はるきさん この植物の根は、太い根から細い根が枝分かれしているね。葉を見ると、葉脈の種類は **a 網状脈** だね。

なつこさん ところで葉脈って何だったかしら。

はるきさん 葉脈は、根や茎で見られた維管束が枝分かれしたものだよ。師管と道管で構成されていて、道管は葉の **b 表側** にあると学習したよね。

あきおさん 光合成によって葉でつくられた物質は、**c 道管** を通って植物の体全体へ運ばれて、果実や根などにたくわえられるんだよね。

なつこさん 葉で光合成がおこなわれるとき、光のほかに水と **d 二酸化炭素** が必要だったね。ところで、この植物は何のなかまに分類されるのかな。

ふゆみさん 根のようすや葉脈の種類から考えると、この植物は被子植物の (**A**) に分類できるね。
(**A**) のなかまということは、茎の断面を観察すると、維管束は (**B**) だろうと推測できるよ。

はるきさん 少し気になったんだけど、葉のつき方には、何か規則性がないのかな。

問 1 図 1 の太い根は主根というが、主根から枝分かれした細い根は何というか、答えなさい。

問 2 会話について、次の問いに答えなさい。

(1) 下線部 a ~ d の語の中に、誤りがひとつある。誤っている語を下線部 a ~ d からひとつ選び、記号で答えなさい。また、正しい語に直しなさい。

(2) (A), (B) にあてはまる語句として、最も適切な組み合わせを、次のア～エからひとつ選び、記号で答えなさい。

	(A)	(B)
ア	単子葉類	ばらばらに散らばっている
イ	単子葉類	輪のように並んでいる
ウ	双子葉類	ばらばらに散らばっている
エ	双子葉類	輪のように並んでいる

観察 2

葉のつき方の規則性を調べるために、図 2 のように連続した 8 枚の葉を真上から観察した。茎から葉が出る位置に着目し、根に近い葉から順に①～⑧の番号を記したシールをはって真上から見ると、8 枚の葉（葉①～葉⑧）は、たがいに重なり合わないようについていた。図 3 は、真上から観察したようすを、模式的に表したものである。

図 2

問 3 観察 2 の結果、この植物の 8 枚の葉のつき方には、一定の規則があることがわかった。

葉⑤は、どこについていると考えられるか、図 3 のア～エからひとつ選び、記号で答えなさい。

図 3

問 4 次の文は、この植物の葉のつき方の利点について、説明したものである。文の ( ) にあてはまる、適切な内容を答えなさい。

文

たがいに重なり合わないようにつけることで、植物がより多くの ( ) ため、光合成がさかんに行われ、多くの栄養分をつくり出すことができる。

問 1			
問 2	(1)	記号	
		正しい語	
	(2)		
問 3			
問 4			

問 1	側根	
問 2	(1)	記号 c
		正しい語 師管
	(2)	エ
問 3	イ	
問 4	例 日光を葉で受けとることができる	

問 1 中心の太い根を主根，そこから枝分かれして出ている細い根を側根という。

問 2

(1) 光合成によってつくられた物質は師管を通して体全体に運ばれる。

(2) 主根と側根をもつ被子植物は双子葉類である。双子葉類の茎の断面は，維管束が輪のように並んでいる。

問 3 葉は反時計回りに 2 枚飛ばしてシールがはられているので，葉⑤は葉④から 2 枚飛ばしたイになる。

問 4 葉が重なり合わないことによって，1 枚 1 枚の葉に日光が当たり，光合成がさかんに行われるようになる。

【過去問 26】

次の問いに答えなさい。

(島根県 2016 年度)

問1 植物の蒸散について調べるために、次の実験を行った。図1のような葉の断面構造をもつ植物について、葉の数や大きさ、茎の長さや太さをそろえたものを4本用意し、**処理A～D**を行った。次に、**図2**のように水の入ったメスシリンダーに入れ、メスシリンダーの水面に少量の油を浮かべた後、風通しがよく日当たりのよい場所に置いた。しばらくしてから減った水の量を記録した。**表1**の**ア～エ**の水の減少量は、**処理A～D**を行った植物のいずれかの実験結果を示している。なお、ワセリンをぬったところでは、蒸散が行われないものとする。これについて、下の**1**、**2**に答えなさい。

図1

処理
A すべての葉にワセリンをぬらなかつた。
B すべての葉の裏側だけにワセリンをぬった。
C すべての葉の表側だけにワセリンをぬった。
D すべての葉を取り除き、切り口にワセリンをぬった。

図2

表1

結果	ア	イ	ウ	エ
水の減少量 [mL]	0.1	0.9	4.9	5.7

- 文中の下線部を行う理由を簡単に答えなさい。
- 処理C**を行った植物の実験結果を示しているものとして、最も適切と考えられるものを、**表1**の**ア～エ**から一つ選び、記号で答えなさい。

問1	1	
	2	

問1	1	水面からの水の蒸発を防ぐため。
	2	ウ

問1

- メスシリンダー内の水の表面からも水は蒸発する。
- 気孔は葉の表面よりも裏面のほうが多いので、水の減少量は**処理A**のすべての葉にワセリンをぬらなかつたに次いで多くなる。

【過去問 27】

悠人さんは、ネギの葉を切り取って残った部分を土に植えると再び葉が成長することを知り、姉の奈未さんと一緒にネギの葉の成長の観察をしました。図1は、この観察に用いた、葉を切り取る前のネギを撮影したものです。図2は、悠人さんが、葉を切り取ったネギを土に植え直してからのネギの高さの変化をグラフにして示したものです。下の文章は、図1、図2についての悠人さんと奈未さんの会話の一部です。あとの問いに答えなさい。

(広島県 2016 年度)

図1

図2 [cm]

悠人：ネギの葉を切り取って、3 cm ぐらい土から出るように植え直したんだ。それから観察を始めて、3 日ごとに高さをはかったんだよ。

奈未：図2のグラフから、ネギの葉が最も速く成長する頃には、1日に 高くなっていることや、33日目頃から、ほとんど成長しなくなることが読み取れるわね。

悠人：そうだよ。それで、観察をやめて抜いたんだけど、根も植える前より伸びていたよ。

奈未：ほんとね。今度は私がネギの根の成長の仕組みについて調べてみようかな。

問1 次の(ア)～(エ)の中で、図1中の根の特徴によって、ネギと同じ種類に分類される植物はどれですか。その記号をすべて書きなさい。

- (ア) アブラナ   (イ) イネ   (ウ) エンドウ   (エ) トウモロコシ

問3 下線部について、図3は、奈未さんが、観察に用いたネギの根の先端から2cmの部分撮影したものです。図3のネギの根について、図4はAの部分の細胞の様子を、図5はBの部分の細胞の様子を、それぞれ撮影したものです。これについて、下の(1)~(3)に答えなさい。

図3

図4

図5

(1) 右の図は、ネギの根の細胞の観察で使った顕微鏡を撮影したものです。図中のa・bのうち、倍率を高くして観察するとき用いる対物レンズはどちらですか。その記号を書きなさい。また、倍率を高くすると、観察したときの視野の範囲と明るさは、それぞれどのようなようになりますか。次のア~エの中から適切なものを選び、その記号を書きなさい。

- ア 視野は、広がって明るくなる。
- イ 視野は、広がって暗くなる。
- ウ 視野は、狭くなって明るくなる。
- エ 視野は、狭くなって暗くなる。

問 1		
問 3	(1)	対物 レンズ
		範囲と 明るさ

問 1	(イ), (エ)	
問 3	(1)	対物 レンズ
		範囲と 明るさ

問 1 図 1 より、ネギの根はひげ根であることが分かる。根がひげ根である植物は、被子植物の単子葉類なので、当てはまるものはイネとトウモロコシである。残りのアブラナのエンドウは、被子植物の双子葉類である。

問 3 (1) 顕微鏡の対物レンズは、倍率の高いものほど長い。接眼レンズは、逆に倍率が高いものほど短い。顕微鏡の倍率を高くすると、視野は狭くなり、レンズに入射する光の量が少なくなるため暗くなる。

【過去問 28】

ツツジの花を分解して、部分ごとに観察した。図1は、そのときのスケッチである。下の問1, 問2に答えなさい。

(山口県 2016 年度)

問1 図1のア～エの各部分について、花の外側にあるものから順にア～エの記号で答えなさい。

問2 ツツジの花において、受粉すると成長して果実になる部分はどこか。図1のA～Dから1つ選び、記号で答えなさい。また、その部分の名称を書きなさい。

問1	( ) → ( ) → ( ) → ( )	
問2	記号	名称

問1	(ウ) → (ア) → (イ) → (エ)	
問2	記号	名称
	D	子房

問1 ツツジの花は、外側から、がく(ウ)→花弁(ア)→おしべ(イ)→めしべ(エ)の順についている。

問2 受粉すると、めしべの根もとの子房(D)の部分が成長して果実になる。

【過去問 29】

次の問いに答えなさい。

(香川県 2016 年度)

問2 次の(1), (2)の問いに答えよ。

- (1) 右の図 I は、太郎さんが学校の敷地でゼニゴケを採取して、ルーペを用いてからだのつくりを観察したときのスケッチである。これに関して、次の a～c の問いに答えよ。

- a 右の図 II は、太郎さんが観察に用いたルーペを示したものである。次の㉗～㉑のうち、ルーペを用いて、手にとったゼニゴケを観察するときの方法について述べたものとして、最も適当なものを一つ選んで、その記号を書け。

- ㉗ 手にとったゼニゴケにできるだけルーペを近づけ、顔を前後に動かす
- ㉘ 手にとったゼニゴケにできるだけルーペを近づけたまま、ルーペとゼニゴケをいっしょに前後に動かす
- ㉙ 手にとったゼニゴケと顔は動かさずに、ルーペのみを動かす
- ㉑ ルーペをできるだけ目に近づけ、手にとったゼニゴケを前後に動かす
- b ゼニゴケは、子孫をふやすための胞子を胞子のうでつくる。図 I 中に P～S で示した部分のうち、胞子のうはどこか。最も適当なものを一つ選んで、その記号を書け。
- c 次のア～エのうち、ゼニゴケの特徴を述べたものとして、最も適当なものを一つ選んで、その記号を書け。
- ア 雄株に胞子のうができ、胞子でふえる
- イ 葉緑体をもっておらず、光合成をおこなわない
- ウ からだを地面や岩に固定するための仮根をもっている
- エ 花弁がたがいにくっついた合弁花をつける

(2) 下の図Ⅲは、太郎さんが、タンポポ、イネ、マツ、イヌワラビ、ゼニゴケを、なかまをふやす方法やからだのつくりの特徴をもとになかま分けをしたものである。あとの表のア～カのうち、図Ⅲ中の観点X～Zの組み合わせとして、最も適当なものを一つ選んで、その記号を書け。

図Ⅱ

	観点X	観点Y	観点Z
ア	胚珠が子房の中にあるか, むきだしになっているか	維管束があるか, ないか	葉脈が網目状か, 平行か
イ	胚珠が子房の中にあるか, むきだしになっているか	葉脈が網目状か, 平行か	維管束があるか, ないか
ウ	維管束があるか, ないか	葉脈が網目状か, 平行か	胚珠が子房の中にあるか, むきだしになっているか
エ	維管束があるか, ないか	胚珠が子房の中にあるか, むきだしになっているか	葉脈が網目状か, 平行か
オ	葉脈が網目状か, 平行か	維管束があるか, ないか	胚珠が子房の中にあるか, むきだしになっているか
カ	葉脈が網目状か, 平行か	胚珠が子房の中にあるか, むきだしになっているか	維管束があるか, ないか

問2	(1)	a	
		b	
		c	
	(2)		

問2	(1)	a	㊦
		b	P
		c	ウ
	(2)	イ	

問2

- (1) a 観察するものを動かせる場合は、ルーペは目に近づけたまま動かさず、観察するものを前後に動かしてピントを合わせる。
 b ゼニゴケの胞子のうは、傘のようになった部分の裏面にできる。
 c ゼニゴケの胞子のうは雌株にできる。また、光合成をおこない、花は咲かない。
- (2) 観点Xは被子植物と裸子植物を分けるもの、観点Yは双子葉類と単子葉類を分けるもの、観点Zはシダ植物とコケ植物を分けるものである。

【過去問 30】

血液の流れと植物の仲間に関する次の問いに答えなさい。

(愛媛県 2016 年度)

問2 ゼニゴケ、イヌワラビ、マツ、ユリ、アブラナを、特徴A～Dをもとに分類したところ、図3のようになった。

(1) ゼニゴケやイヌワラビは、種子をつくらず、 のうの中でつくられる でふえる。Xに当てはまる適当な言葉を書け。

(2) 次のア～エのうち、ゼニゴケについて述べたものとして、最も適当なものを一つ選び、その記号を書け。

- ア 体に根、茎、葉の区別がある。
- イ 必要な水分などを体の表面から吸収する。
- ウ 葉緑体を持たず、光合成を行わない。
- エ ひげ根を使って体を地面に固定している。

(3) 次の文の①、②の { } の中から、それぞれ適当なものを一つずつ選び、その記号を書け。

マツとユリの花のうち、雌花と雄花があるのは① {ア マツ イ ユリ} であり、その雄花には、② {ウ 胚珠 エ 花粉のう} がある。

(4) 次のア～エのうち、図3のYに当てはまる特徴として、最も適当なものを一つ選び、その記号を書け。

- ア 子葉は1枚である。
- イ 主根と側根を持つ。
- ウ 茎の維管束が散らばっている。
- エ 葉脈は平行脈である。

(5) 図4は、アブラナの花を分解し、部分ごとに分けたものである。図4のア～エのうち、受精が行われる部分として、適当なものを一つ選び、その記号を書け。

図3

図4

(6) アブラナを上から見ると、図5のように、葉がたがいに重なり合わないようについていることが分かる。このような葉のつき方には、栄養分をつくる上でどのような利点があるか。解答欄の書き出しに続けて簡単に書け。

図5

問 2	(1)		
	(2)		
	(3)	①	②
	(4)		
	(5)		
	(6)	どの葉にも	

問 2	(1)	胞子			
	(2)	イ			
	(3)	①	ア	②	エ
	(4)	イ			
	(5)	ウ			
	(6)	どの葉にも		多くの光が当たるようになる。	

問 2

- (1) コケ植物やシダ植物は、種子をつくらずに胞子のうでつくられた胞子でなかまをふやす。
- (2) ゼニゴケには根、茎、葉の区別はなく、葉緑体を持ち、光合成を行う。根がないので必要な水分は体の表面から吸収する。根のように見えるものは仮根で、体を地面に固定するはたらきをする。
- (3) 裸子植物のマツには雄花と雌花があり、雄花に花粉のうが、雌花に胚珠がある。
- (4) アブラナは双子葉類、ユリは単子葉類である。双子葉類の根は主根と側根からなり、単子葉類の根はひげ根である。
- (5) 受精が行われるのは、めしべの下部の子房の中にある胚珠の部分である。図 4 で、めしべはウである。
- (6) 葉がたがいに重なり合わないようになっていると、葉に日光が当たる面積が大きくなる。そのため、光合成を効率よく行うことができる。

【過去問 31】

ともこさんは、身近な生物を調べるために、次の観察Ⅰ～Ⅲを行った。このことについて、下の問1～問5に答えなさい。

(高知県 2016 年度 A)

観察Ⅰ 校庭にあるツツジの葉のようすを、ルーペを用いて観察した。

観察Ⅱ 校庭にあるツツジの花を一つとり、そのつくりを、観察器具を用いて観察した。

観察Ⅲ 池の水を採取し、スライドガラスに1滴とり、カバーガラスをかけ、プレパラートをつくった。これを顕微鏡で観察した。

問1 観察Ⅰでは、図のようなルーペを用いて観察した。手に持って動かせるものを観察するときのルーペの使い方として正しいものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書け。

- ア ルーペを目に近づけ、観察するものを前後に動かして、よく見える位置で観察する。
- イ ルーペを観察するものに近づけ、顔を前後に動かして、よく見える位置で観察する。
- ウ ルーペと目、ルーペと観察するものの距離をそれぞれ20cmほどに保ち観察する。
- エ 観察するものを目から20cmほど離し、ルーペを前後に動かして、よく見える位置で観察する。

問2 次の文は、観察Ⅱを行うときに用いた下線部の観察器具について、使い方の手順を述べたものである。このとき用いた観察器具の名称を書け。

- ① 観察したいものが見やすくなるように、ステージの黒い面か白い面かを選ぶ。
- ② 左右の接眼レンズの間隔を、自分の目の間隔に合うように調節し、左右の視野が重なって一つに見えるようにする。
- ③ 鏡筒を上下させて、右目でピントを合わせる。
- ④ 視度調節リングを回して、左目でピントを合わせる。

問3 観察Ⅲでは、まずプレパラート全体を観察するために、顕微鏡の視野が最も広くなるように操作した。このとき用いた接眼レンズと対物レンズの組み合わせとして正しいものを、下のア～エから一つ選び、その記号を書け。

- ア 接眼レンズ—A   対物レンズ—C   イ 接眼レンズ—A   対物レンズ—D
- ウ 接眼レンズ—B   対物レンズ—C   エ 接眼レンズ—B   対物レンズ—D

問4 観察Ⅲで用いた顕微鏡について、ピントの合わせ方を示した文として正しいものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書け。

- ア 接眼レンズをのぞきながら、プレパラートと対物レンズを徐々に遠ざける。次に、顕微鏡を横から見ながら、プレパラートと対物レンズを近づけ、ピントを合わせる。
- イ 接眼レンズをのぞきながら、プレパラートと対物レンズを徐々に近づける。次に、顕微鏡を横から見ながら、プレパラートと対物レンズを遠ざけ、ピントを合わせる。
- ウ 顕微鏡を横から見ながら、プレパラートと対物レンズを遠ざける。次に、接眼レンズをのぞきながら、プレパラートと対物レンズを徐々に近づけ、ピントを合わせる。
- エ 顕微鏡を横から見ながら、プレパラートと対物レンズを近づける。次に、接眼レンズをのぞきながら、プレパラートと対物レンズを徐々に遠ざけ、ピントを合わせる。

問5 観察Ⅲではミカヅキモが見えた。このミカヅキモについてさらに詳しく観察するために、接眼レンズの倍率を15倍、対物レンズの倍率を20倍にした。このときの顕微鏡の倍率は何倍か。

問1	
問2	
問3	
問4	
問5	倍

問1	ア
問2	双眼実体顕微鏡
問3	ウ
問4	エ
問5	300 倍

問1 ルーペは目に近づけて使う。観察するものが手に持って動かせる場合は、観察するものを動かしてよく見える位置で観察する。観察するものが動かせない場合は、ルーペを目に近づけたまま顔を動かして、よく見える位置で観察する。

問2 ものを立体的に観察したいときは双眼実体顕微鏡を使う。

問3 倍率が低いほど、顕微鏡の視野は広くなる。対物レンズは短いもののほうが倍率は低い。

問4 ピントを合わせるときは、まずプレパラートと対物レンズを近づける。このとき、顕微鏡を横から見て、プレパラートと対物レンズがぶつからないように注意する。次に接眼レンズをのぞき、プレパラートと対物レンズを遠ざけながらピントを合わせる。

問5 $15 \text{ [倍]} \times 20 \text{ [倍]} = 300 \text{ [倍]}$

問2 胚珠を包んでいる、めしべの根もとのふくらんだ部分を、子房という。

問3 おしべのやくでつくられた花粉が、めしべの先端の柱頭につくことを受粉という。

【過去問 33】

次の問1, 問2に答えなさい。

(佐賀県 2016 年度 一般)

問1 図1は、アジサイの葉のスケッチ、図2は、ツユクサの葉のスケッチである。また、図3は、ある植物の葉の断面の模式図である。(1)~(3)の各問いに答えなさい。

- (1) 図1で見られるような葉脈を何というか、書きなさい。
- (2) 図2で見られるような葉脈の葉をもつ植物は、どのような特徴をもつか。次の①~③の特徴について、それぞれの選択肢ア, イの中から最も適当なものを一つずつ選び、記号を書きなさい。
- ① 子葉の特徴
- ア 子葉は1枚である。
  - イ 子葉は2枚である。
- ② 茎の維管束の特徴
- ア 茎の維管束はばらばらに分布している。
  - イ 茎の維管束は輪のように並んでいる。
- ③ 根の特徴
- ア 根は主根と側根からなる。
  - イ 根はひげ根である。
- (3) 図3の○で囲んだ部分では、細長い二つの細胞が向かい合い、穴を開いたり閉じたりしている。この穴を何というか、書きなさい。

問2 植物の体から水蒸気が放出される現象について調べるために、アジサイを用いて【実験】を行った。(1)~(5)の各問いに答えなさい。

【実験】

- ① ほぼ同じ大きさの葉で、枚数がそろっている枝を4本用意した。
- ② そのまま何もしないものをA, すべての葉の表側にワセリンをぬったものをB, すべての葉の裏側にワセリンをぬったものをCとした。さらに、葉をすべて取り除き、葉が枝についていた部分にワセリンをぬったものをDとした。ただし、ワセリンは水や水蒸気をまったく通さないものとする。
- ③ 水を入れた4本の目もりつき試験管a~dを用意して、枝A~Dを図4のようにさした後、すべての試験管の水面に静かに油を注ぎ、直後に水位を測定した。その後、4時間後に再び水位を測定した。表は、その結果をまとめたものである。

- (1) 植物の体から水蒸気が放出される現象を何というか、書きなさい。
- (2) 【実験】の③の下線部は、どのようなことを防ぐために行ったものか、書きなさい。
- (3) 【実験】について、試験管 b と試験管 d を比較することでわかることとして最も適当なものを、次のア～エの中から一つ選び、記号を書きなさい。
- ア 葉の表裏両側から放出されたと考えられる水蒸気の量
 イ 葉の表側から放出されたと考えられる水蒸気の量
 ウ 葉の裏側から放出されたと考えられる水蒸気の量
 エ 枝から放出されたと考えられる水蒸気の量
- (4) (3)でわかることは、比較する試験管の組み合わせをかえてもわかる。その試験管を、a～dの中から二つ選び、記号を書きなさい。
- (5) 【実験】の結果から、次のア～ウの各部分から放出される水蒸気の量を比較し、多いものから順に並べ、記号を書きなさい。
- ア 葉の表側   イ 葉の裏側   ウ 枝

問1	(1)	
	(2)	① ② ③
	(3)	
問2	(1)	
	(2)	を防ぐため。
	(3)	
	(4)	( ) と ( )
	(5)	( ) > ( ) > ( )

問 1	(1)	網状脈					
	(2)	①	ア	②	ア	③	イ
	(3)	気孔					
問 2	(1)	蒸散					
	(2)	試験管内の水が、水面から蒸発することを防ぐため。					
	(3)	ウ					
	(4)	(a) と (c)					
	(5)	(イ) > (ア) > (ウ)					

問 1

- (1) 図 1 のような網の目のように枝分かれる葉脈を網状脈，図 2 のようなまっすぐに通る葉脈を平行脈という。
- (2) 図 2 のような平行脈の葉をもつ植物を単子葉類という。単子葉類の子葉は 1 枚で，茎の部分の維管束はばらばらに散らばって分布している。根は茎の下から多数のひげ根がのびている。
- (3) 細長い 2 つの孔辺細胞が向かい合い，すき間をつくっている部分を気孔という。気孔は開いたり閉じたりして，酸素，二酸化炭素，水蒸気などの気体が入り出している。

問 2

- (1) 植物は体内の水分を水蒸気として放出することによって，根から水や水に溶けた養分を吸収する。このはたらきを蒸散という。
- (2) 試験管の水面に油を注ぐと，水面からの水の蒸発をおさえることができる。これによって，植物の体から放出される水の量をより正確に測定することができる。
- (3) 試験管 b のアジサイは葉の表側にワセリンがぬられているため，減少した分の水は葉の裏側と枝から放出されたと考えられる。試験管 d のアジサイは葉がなく枝だけなので，減少した分の水は枝から放出されたと考えられる。試験管 b の水の減少量から試験管 d の水の減少量を引くと，葉の裏側からの水の放出量が求められる。
- (4) 試験管 a のアジサイはワセリンがぬられていないため，減少した分の水は葉の表側，裏側と枝から放出されたと考えられる。試験管 c のアジサイは葉の裏側にワセリンがぬられているため，減少した分の水は葉の表側と枝から放出されたと考えられる。試験管 a の水の減少量から試験管 c の水の減少量を引くと，(3)と同様に葉の裏側からの水の放出量が求められる。
- (5) 葉の表側から放出された水蒸気の量は，「試験管 c の水の減少量－試験管 d の水の減少量」で求められる。 $(20.0 - 18.7) - (20.0 - 19.9) = 1.2$ [mL]
 葉の裏側から放出された水蒸気の量は，「試験管 b の水の減少量－試験管 d の水の減少量」で求められる。 $(20.0 - 17.7) - (20.0 - 19.9) = 2.2$ [mL]
 枝から放出された水蒸気の量は，「試験管 d の水の減少量」である。 $20.0 - 19.9 = 0.1$ [mL]
 よって水の放出量が多い順に，葉の裏側，葉の表側，枝となる。

【過去問 34】

次の問いに答えなさい。

(佐賀県 2016 年度 特色)

問2 図4は植物のなかま分けを表したものである。(1), (2)の問いに答えなさい。

図4

(1) 図4において、種子をつくる植物を被子植物と裸子植物に分けたXと、種子をつくらない植物をシダ植物とコケ植物に分けたYでは、それぞれどのような特徴に注目してなかま分けをしているか。最も適当なものを、次のア～オの中からそれぞれ一つ選び、記号を書きなさい。

- ア 葉脈のようす
- イ 種子の大きさや形
- ウ 根・茎・葉の区別があるかないか
- エ 花卉のようす
- オ 胚珠のようす

(2) サクラは、どのなかまに入るか。図4のA～Fの中から一つ選び、記号を書きなさい。

問2	(1)	X		Y	
	(2)				

問2	(1)	X	オ	Y	ウ
	(2)	D			

問2

- (1) 被子植物の胚珠は子房につつまれているが、裸子植物の胚珠はむき出しになっている。シダ植物には根・茎・葉の区別があるが、コケ植物にはその区別がない。
- (2) サクラは種子をつくり、胚珠が子房につつまれている被子植物で、子葉が2枚ある双子葉類である。花びらはばらばらに離れており、離弁花類に分類される。

【過去問 35】

メダカを用いて【観察】を行った。次の問1～問8に答えなさい。

(佐賀県 2016 年度 特色)

【観察】

- ① 写真1のように、チャック付きのポリエチレンの袋に、メダカを水とともに入れ、袋から水を追い出すようにしてチャックを閉めた。
- ② 図のような顕微鏡を使って、メダカの尾びれの部分を倍率 150 倍で観察したところ、十数本の毛細血管とその中を流れるたくさんの粒が見えた。
- ③ メダカはそのまま動かさずに、図の b を回して顕微鏡の倍率を 600 倍にして観察したところ、写真2のように見えた。

写真1

図

写真2

問2 図の a, b の部分の名称をそれぞれ書きなさい。

問3 顕微鏡の操作を説明した次のア～カを正しい順番に並べ、2番目と5番目になるものをそれぞれ一つ選び、記号を書きなさい。

- ア 対物レンズの先端を横から見ながら、調節ねじを回し、対物レンズをできるだけプレパラートに近づける。
- イ 対物レンズをとりつける。
- ウ a をのぞきながら、調節ねじを回し、対物レンズを遠ざける。
- エ a をとりつける。
- オ 視野全体が明るく見えるように、反射鏡を調節する。
- カ プレパラートをステージにのせ、クリップでしっかりとめる。

問2	a			
	b			
問3	2番目		5番目	

問2	a	接眼レンズ		
	b	レボルバー		
問3	2番目	イ	5番目	ア

問2 観察するとき目を近づけてのぞきこむレンズを接眼レンズという。また、対物レンズを変えるときに回す部分をレボルバーという。

問3 顕微鏡を使うときは、まず接眼レンズをとりつけてから、対物レンズをとりつける。次に視野全体が明るく見えるように反射鏡を調節してから、プレパラートをステージにのせ、クリップでしっかりとめる。そして対物レンズの先端を横から見ながら、調節ねじを回して、対物レンズをプレパラートに近づけていく。このとき、対物レンズとプレパラートがぶつからないように注意する。対物レンズをプレパラートにできるだけ近づけたら、接眼レンズをのぞき、対物レンズをプレパラートから遠ざけながらピントを合わせる。

【過去問 36】

次の I, II の問いに答えなさい。

(長崎県 2016 年度)

I 植物や動物の細胞のつくりを調べるために**観察 1**を行った。

【観察 1】 オオカナダモの葉と、ヒトのほおの内側を綿棒で軽くこすり取ったものを、それぞれ別のスライドガラスにのせ、水を1滴たらしてプレパラートをつくり、**図 1**に示す顕微鏡で観察した。**図 2**はオオカナダモの葉の細胞を、**図 3**はヒトのほおの内側の細胞をスケッチしたものである。

図 1

図 2

問 1 図 1 に示す顕微鏡で観察するとき、次のア～エを正しい手順に並べよ。

- ア 対物レンズとプレパラートを横から見ながら調節ねじを回し、対物レンズとプレパラートの距離を近づける。
- イ 接眼レンズをのぞきながら、反射鏡を動かして、視野全体が明るくなるようにする。
- ウ ステージにプレパラートをのせ、クリップでとめる。
- エ 接眼レンズをのぞきながら調節ねじを回し、ピントを合わせる。

II 植物の体を調べるために**観察 2**を行った。

【観察 2】 シダ植物のイヌワラビを観察し、**図 4**のようにスケッチした。

問 4 シダ植物の体には、葉、茎、根の区別がある。**図 4**の A～D について、葉と茎を示しているものの組み合わせとして、最も適当なものは、次のどれか。

図 4

	葉	茎
ア	A	B
イ	A	BとC
ウ	AとB	C
エ	AとB	CとD

問 5 シダ植物の子孫の残し方と、被子植物や裸子植物の子孫の残し方の違いをまとめた次の文の (③), (④) に適する語句を入れ、文を完成せよ。

シダ植物は、**図 4**の A の部分にできた (③) が発芽し成長して、子孫を残す。一方、被子植物や裸子植物は、花がついた後にできた (④) が発芽し成長して、子孫を残す。

問1	→ → →	
問4		
問5	③	
	④	

問1	イ → ウ → ア → エ	
問4	ウ	
問5	③	孢子
	④	種子

- 問1 まず接眼レンズをのぞきながら、視野が明るくなるように反射鏡を調節する。次にステージにプレパラートをのせて固定し、横から見ながら対物レンズとプレパラートを近づける。そして接眼レンズをのぞき、対物レンズとプレパラートを遠ざけるように調節ねじを回しながら、ピントを合わせる。
- 問4 イヌワラビのようなシダ植物の場合、AとBの部分全体が葉で、茎は地下茎として土の中を通っているCの部分である。
- 問5 イヌワラビのようなシダ植物では、葉の裏側に孢子のうがあり、その中に孢子が入っている。この孢子が発芽し成長して、シダ植物は子孫を残す。これに対し、種子植物は種子によって子孫を残す。

【過去問 37】

次の各問いに答えなさい。

(熊本県 2016 年度)

問1 ^{はるみ}晴美さんは、熊本県の伝統野菜であるスイゼンジナの葉を観察した。1図は、観察に用いたスイゼンジナを写したものであり、2図は、葉をスケッチしたものである。

(1) 2図の葉脈のようすから、スイゼンジナは①(ア 双子葉類 イ 単子葉類)であることがわかる。スイゼンジナの葉脈と同じ特徴をもつものは、②(ア ユリ イ タンポポ)である。①、②の( )の中からそれぞれ正しいものを一つずつ選び、記号で答えなさい。

1図

2図

次に晴美さんは、スイゼンジナの蒸散量を調べる実験を行い、次のように記録をまとめた。

スイゼンジナの蒸散量を調べる実験

〔実験日〕

8月11日

〔目的〕

スイゼンジナの葉や茎からの蒸散量について調べる。

〔方法〕

- I 葉の大きさや枚数、茎の太さがほぼ同じものを4本用意し、水中で茎を切って長さをそろえ、それぞれをA、B、C、Dとする。
- II Aはすべての葉の表に、Bはすべての葉の裏に、それぞれワセリンをぬる。Cは葉をすべて切り取った後、その切り口にワセリンをぬる。Dは何もぬらず、そのままにしておく。
- III 3図のように、水を入れた三角フラスコにA～Dをさし、それぞれに油をそそいで水面をおおう。
- IV 全体の質量をそれぞれ電子てんびんで測定し、A～Dを明るく風通しのよい所に置く。6時間後に、ふたたび質量を測定し、水の減少量を求める。

3 図

[結 果]

4 表のとおり。

4 表

	A	B	C	D
水の減少量 [g]	2.8	0.9	0.2	3.5

[考 察]

㉔スイゼンジナの葉は、表よりも裏からの蒸散がさかんであると考えられる。

(2) 下線部㉑について、三角フラスコの水面を油でおおうのは何のためか、書きなさい。

(3) 晴美さんが下線部㉒のように考えたのは、① (ア AとB イ BとC ウ CとD) の水の減少量を比較して、葉の表よりも裏からの蒸散量が多いと判断したからである。これは、蒸散における水蒸気の出口となる ㉓ という小さい穴の数が、葉の表よりも裏に多いことが理由であると考えられる。①の( )の中から正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。また、㉓ に適当な語を入れなさい。

(4) 4 表から、この実験において、葉の裏からの蒸散量は、葉および茎全体からの蒸散量のおよそ何%か。小数第1位を四捨五入したとき最も近い値を、次のア～オから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 67%

イ 70%

ウ 74%

エ 80%

オ 85%

問 1	(1)	①		②	
	(2)				
	(3)	①		②	
	(4)				

問 1	(1)	①	ア	②	イ
	(2)	水面から水が蒸発するのを防ぐため。			
	(3)	①	ア	②	気孔
	(4)	ウ			

問 1

- (1) 双子葉類の葉脈は網目状になっている。ユリは単子葉類，タンポポは双子葉類である。
- (2) 水面から水が蒸発してしまうと，水の減少量が蒸散によるものなのか，蒸発によるものなのかわからなくなってしまう。水面を油でおおうことで，水面から水が蒸発するのを防ぐことができる。
- (3) **A**は葉の裏と茎で蒸散が行われており，**B**は葉の表と茎で蒸散が行われている。よって，**A**のほうが**B**よりも水の減少量が多かったことから，葉では表よりも裏からの蒸散がさかんであることがわかる。これは，気孔が葉の表より裏に多いためである。
- (4) 茎からの蒸散量は**C**の0.2 g，葉および茎全体からの蒸散量は**D**の3.5 gである。よって，葉の裏からの蒸散量は， $2.8 \text{ [g]} - 0.2 \text{ [g]} = 2.6 \text{ [g]}$ となる。これは葉および茎全体からの蒸散量のうち， $\frac{2.6 \text{ [g]}}{3.5 \text{ [g]}} \times 100 = 74.2 \dots \text{ [%]}$ より，およそ74%である。

【過去問 38】

花子さんは、校庭に生えているタンポポを使って、光合成について調べることにした。次の問1，問2に答えなさい。

(宮崎県 2016 年度)

問1 花子さんは、タンポポを観察して、右のような観察カードをつくった。次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

〔観察カード〕(一部)

●生物名 タンポポ
 ●生活(生育)場所
 校庭の南側，日当たりがよく，
 かわいている所。
 ●スケッチ

根 a 太い根から
 細い根が枝
 分かれてし
 ている。
 花
 白い綿毛
 縦に細いす
 じがあつた。

(1) 理科で観察を行うときのスケッチのしかたとして適切なものはどれか。次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

- ア ^{りんかく} 輪郭の線を重ねがきする。
- イ 影をつけて立体的にする。
- ウ 細い線と小さな点ではっきりとかく。
- エ ぬりつぶして色のちがいを表す。

(2) タンポポの根は、太い根から a のような細い根が枝分かれしていた。a を何といいますか。

(3) タンポポの花は、5つの花弁が1つにくっついている花であることがわかった。根や花のつくりをもとになかま分けするとき、タンポポと同じなかまに入る植物はどれか。次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

- ア ユリ   イ ツツジ   ウ アブラナ   エ イヌワラビ

問2 花子さんは、光合成と二酸化炭素の関係を調べるために、次のような実験計画書をつくって、先生に提出した。下の文は、そのときの先生と花子さんの会話である。下の(1)，(2)の問いに答えなさい。

〔実験計画書〕

〔実験の目的〕
 植物が光合成を行うとき、二酸化炭素をとり入れているか調べる。

〔予想〕
 植物は光合成を行うとき、二酸化炭素をとり入れているだろう。

〔方法〕

- ① 図のように、2本の試験管X，Yを用意し，それぞれにタンポポの葉を入れる。
- ② 2本の試験管にストローで息をふきこんでゴム栓をする。
- ③ 試験管Yには，光が当たらないように，アルミニウムはくを巻く。
- ④ 2本の試験管を，日光がよく当たる場所に30分間置いた後，それぞれの試験管に石灰水を少し入れて，ゴム栓をしてよく振り，石灰水の様子を調べる。

先生： 花子さんの予想が正しければ、試験管XとYはそれぞれどのような結果になると思いますか。
 花子： 試験管Xでは石灰水は a，試験管Yでは石灰水は b と思います。
 先生： そうですね。でも、花子さん、この試験管XとYの結果のちがいは、光によるものです。試験管Xの結果が、植物のはたらきによるものであることを明らかにする必要があるので、試験管Zを用意しましょう。試験管Zは、どのような条件にすればよいと思いますか。
 花子： c という条件にすればよいと思います。
 先生： その通りです。それでは、**実験計画書**にそのことも書き加えて、実験をしてみましょう。

- (1) a，b に適切な内容を入れなさい。
 (2) c には、先生と花子さんの会話の下線部を明らかにするための条件が入る。次の条件1～3から、それぞれ適切な内容を1つずつ選び、記号で答えなさい。

〔条件1〕

葉を入れるかどうか
ア 葉を入れる
イ 葉を入れない

〔条件2〕

息をふきこむかどうか
ウ 息をふきこむ
エ 息をふきこまない

〔条件3〕

光を当てるかどうか
オ 光を当てる
カ 光を当てない

問1	(1)		
	(2)		
	(3)		
問2	(1)	a	
		b	
	(2)	条件1	
		条件2	
		条件3	

問1	(1)	ウ		
	(2)	側根		
	(3)	イ		
問2	(1)	a	例 変化しない	
		b	白くにごる	
	(2)	条件1	イ	
		条件2	ウ	
		条件3	オ	

問1

- (1) スケッチをするときは、細い線と小さな点で正確にかく。影をつけたり、線を重ねたりしない。
- (2) 太い根を主根、主根から出ている細い根を側根という。
- (3) タンポポは双子葉類の離弁花である。ユリは単子葉類、アブラナは双子葉類の合弁花、イヌワラビはシダ植物である。

問2

- (1) 試験管Xではタンポポの葉の光合成により、二酸化炭素が使われてしまうので石灰水は変化しない。試験管Yではタンポポの葉による光合成は起こらないので、二酸化炭素は残ったままなので、石灰水は白くにごる。
- (2) 植物のはたらきによるものであることを明らかにするので、植物のあるなし以外の条件は同じにして実験をする。これを、対照実験という。

【過去問 39】

次の問いに答えなさい。答えを選ぶ問いについては記号で答えなさい。

(鹿児島県 2016 年度)

問1 ふ入りの葉の一部をアルミニウムはくでおおって一晩置き、翌日、アルミニウムはくでおおったまま、じゅうぶんに光を当てた。この葉をつみとり、やわらかくなるまで熱湯にひたした。その後、あたためたエタノールの中に葉を入れて、水洗いした後うすめたヨウ素液にひたした。

図1は、つみとった葉のようすを示しており、ヨウ素液にひたすとA～DのうちAの部分だけが青紫色を示した。

1 この実験で、葉に下線部の操作をしたのは何のためか。

- ア 表面を消毒するため。 イ 緑色を脱色するため。
- ウ 光合成をしやすくするため。 エ 細胞をはなれやすくするため。

2 ふ入りの葉を一晩置いたのはなぜか。その理由を書け。

3 下の文中の , にあてはまるものとして、正しいものは図1のB～Dのどれか。

光合成には光が必要であることを調べるためには、葉のAと の部分についてヨウ素液との反応を比較すればよい。また、光合成が葉の緑色の部分だけで行われることを調べるためには、葉のAと の部分についてヨウ素液との反応を比較すればよい。

4 図2は、ヨウ素液にひたす前のAの部分の細胞を模式的に示したものである。葉をヨウ素液にひたした結果、青紫色を示した部分をすべてぬりつぶせ。

問 1	1			
	2			
	3	X		Y
	4			

問 1	1	イ			
	2	葉にあるデンプンをなくすため。			
	3	X	C	Y	B
	4				

問 1

- 1 あたためたエタノールに葉をひたすと、葉に含まれる緑色の色素がエタノールにとけ出す。この操作によって、ヨウ素液による色の変化を観察しやすくなる。
- 2 葉に光を当てずに一日置くと、その間は光合成が行われず新しいデンプンはつくられない。またすでに葉にあったデンプンは、移動して植物のからだの各部へ送られる。このことにより、葉にデンプンがない状態で実験を開始することができる。
- 3 光合成に光が必要であることは、葉緑体があり光が当たっている部分 (A) と、葉緑体があり光が当たっていない部分 (C) を比較するとわかる。また光合成が葉緑体がある部分だけで行われることは、葉緑体があり光が当たっている部分 (A) と、葉緑体がなく光が当たっている部分 (B) を比較するとわかる。
- 4 光合成でデンプンがつけられるのは、細胞中の葉緑体という小さな粒の部分である。図 2 では、5 つある小さな粒をすべてぬりつぶす。

【過去問 40】

ある池の生物を調査したところ、さまざまな生物を観察することができた。次の問いに答えなさい。

図 1

(沖縄県 2016 年度)

〈観察 I〉

池の水を採集し顕微鏡で観察したところ、右の図 1 のようにゾウリムシを見つけることができた。このときの顕微鏡の接眼レンズは 10 倍、対物レンズは 10 倍であった。

問 1 対物レンズだけを 40 倍にかえて観察した。このとき顕微鏡をのぞいて見えるようすとして、もっとも適当なものを次のア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。

問 1	

問 1	ウ

問 1 顕微鏡の倍率は、10 [倍] × 10 [倍] = 100 [倍] から 10 [倍] × 40 [倍] = 400 [倍] に上がる。よって、ゾウリムシの大きさは、図 1 と比べて約 4 倍の大きさに見える。