【過去問 1】

次の問いに答えなさい。

(北海道 2015 年度)

問 5 ある金属の体積と質量を測定したところ、体積が 8 cm^3 、質量が 72 g であった。この金属の密度は何 g/cm^3 か、書きなさい。

問 5	g/cm^3
-----	-----------------

問 5	9 g/cm^3
-----	-------------------

問 5 $\frac{72 [\text{g}]}{8 [\text{cm}^3]} = 9 [\text{g/cm}^3]$

【過去問 2】

次の問いに答えなさい。

(北海道 2015 年度)

酸化銀とマグネシウムを用いて、次の実験を行った。

実験 1 図 1 のように、酸化銀 2.9 g を加熱し、発生した気体を集めた。気体が発生しなくなってから、①ガラス管を水そうから取り出し、加熱をやめた。試験管の中を調べたところ、酸化銀は完全に分解されており、白色(灰色)の銀が残っていた。この銀の質量を測定したところ、2.7 g であった。

実験 2 図 2 のようにマグネシウムの粉末 0.3 g をステンレス皿にうすく広げ 1 回目の加熱をしたところ、②粉末が激しく熱や光を出しながら酸化されて白色になるようすが観察された。冷えてから質量を測定したところ、粉末の質量は 0.4 g に増加していた。その後、ステンレス皿の中の粉末をよくかき混ぜてから加熱し、質量を測定する操作を何回かくり返した。図 3 は、加熱した回数と加熱後の粉末の質量との関係をグラフに表したものである。なお、加熱後の粉末の質量は 4 回目から 0.5 g で変化しなかった。

問 1 図 1 のようにして気体を集める方法を何というか、書きなさい。また、発生した気体をこの方法で集めることができるのは、この気体がどのような性質を持っているからか、書きなさい。

問2 次の文は、下線部②のように操作をする理由について説明したものである。説明が完成するように、
 に当てはまる文を書きなさい。

ガラス管を水の中に入れてそのまま加熱をやめると、 ため、試験管が割れることがあるから。

問1	方法	
	性質	
問2		

問1	方法	水上置換(法)
	性質	例 水にとけにくい
問2	例	水が試験管に逆流する

問1 水にとけにくい気体は、水上置換(法)で集めることができる。

問2 加熱をやめると試験管内の気圧が小さくなり、水そうの水が逆流してしまう。

【過去問 3】

次の問いに答えなさい。

(青森県 2015 年度)

問3 物質の性質について、次のア、イに答えなさい。

ア 次の1～4の中で、物質が燃えたときに二酸化炭素が発生しないものはどれか。適切なものを一つ選び、その番号を書きなさい。

- 1 ロウ 2 砂糖 3 水素 4 ポリエチレンテレフタレート

イ 図1は、試験管Aに食塩の飽和水溶液と水を、試験管Bになたね油とエタノールを、2つの層ができるように入れ、それぞれ上の層の液体の中に□、☒、■で示す密度の異なる3種類のプラスチックを入れて、どれが浮いてどれが沈むかについて調べた結果を模式的に表したものである。下の表は、試験管に入れた液体と密度を示したものである。また、図2は、試験管Cに水とエタノールを、2つの層ができるように入れたようすを模式的に表したものである。

試験管Cの上の層の液体の中に3種類のプラスチックを入れて、どれが浮いてどれが沈むかを調べるとどのようになるか。図1にならって□、☒、■の記号をかき入れなさい。

図1

試験管A

試験管B

試験管に入れた液体	密度 (g/cm ³)
エタノール	0.79
なたね油	0.92
水	1.00
食塩の飽和水溶液	1.20

図2

試験管C

問3	ア	
	イ	<div style="text-align: center;"> <p>試験管C</p> </div>

問3	ア	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">試験管C</p>
	イ	

問3 ア 水素が燃えると水ができる。

イ 試験管 A より、□と☒は水に沈み、■は水に浮く。また、試験管 B より、すべてのプラスチックがエタノールとなたね油に沈むので、試験管 C の水の底には□と☒が、水とエタノールの層の間には■が存在することになる。

【過去問 4】

次の問いに答えなさい。

(岩手県 2015 年度)

問5 次のア～エのうち、ろ過の正しい操作を示している図はどれですか。一つ選び、その記号を書きなさい。

問5	
----	--

問5	ア
----	---

問5 ろ過では、ろうとの足の長いほうをビーカーの壁につける。また、ガラス棒の先端はろ紙につけ、液体をガラス棒に伝わせるようにする。

【過去問 5】

次の問いに答えなさい。

(宮城県 2015 年度)

問4 私たちの身のまわりには、プラスチックを利用した製品が数多くあります。

図4に示されたペットボトルもその1つで、ボトルはポリエチレンテレフタレート、キャップはポリプロピレンというプラスチックでできています。次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

図4

(1) ポリエチレンテレフタレートやポリプロピレンの原料として、最も適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 石油 イ ミョウバン ウ 鉄鉱石 エ 石灰石

(2) ポリエチレンテレフタレートとポリプロピレンに共通する性質として、最も適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア たたくとのとびてうすく広がる。 イ 磁石に引きつけられる。
ウ 電気をよく通す。 エ 燃やすと二酸化炭素が発生する。

(3) 同じ質量のポリエチレンテレフタレートとポリプロピレンの体積の比を、最も簡単な整数の比で表しなさい。ただし、ポリエチレンテレフタレートの密度を 1.40 g/cm^3 、ポリプロピレンの密度を 0.90 g/cm^3 とします。

問4	(1)	
	(2)	
	(3)	$\left[\begin{array}{c} \text{ポリエチレンテレフタレートの体積} \end{array} \right] : \left[\begin{array}{c} \text{ポリプロピレンの体積} \end{array} \right] = \quad : \quad$

問4	(1)	ア
	(2)	エ
	(3)	$\left[\begin{array}{c} \text{ポリエチレンテレフタレートの体積} \end{array} \right] : \left[\begin{array}{c} \text{ポリプロピレンの体積} \end{array} \right] = 9 : 14$

問4 (1) プラスチックは石油などを原料にしてつくられている。

(2) ペットボトルもキャップも石油からできているので、燃やすと二酸化炭素が発生する。

ア、ウは金属の性質、イは鉄など一部の金属の性質。

(3) 密度 $[\text{g/cm}^3] = \frac{\text{質量} [\text{g}]}{\text{体積} [\text{cm}^3]}$ なので、密度と質量は比例の関係、密度と体積は反比例の関係にある。

密度の比が $14:9$ ならば、体積の比は $9:14$ となる。

【過去問 6】

うすい硫酸にうすい水酸化バリウム水溶液を加えたときの変化を調べた実験について、あとの問いに答えなさい。

(宮城県 2015 年度)

〔実験〕

- ① 5つのビーカーA, B, C, D, Eに, うすい硫酸を同じ試薬びんから 50cm³ずつはかりとった。
- ② ビーカーA~Eに, うすい水酸化バリウム水溶液を同じ試薬びんからこまごめピペットで, Aには 10cm³, Bには 20cm³, Cには 30cm³, Dには 40cm³, Eには 50cm³加え, 十分に反応させると, ビーカーA~Eのそれぞれで硫酸バリウムの白色沈殿が生じた。
- ③ ビーカーA~Eのそれぞれの液をよくかき混ぜ, 硫酸バリウムがビーカーに残らないようにろ過した。次に, それぞれのろ紙に残った硫酸バリウムをよく乾燥させ, 硫酸バリウムだけの質量を測定した。
- ④ ビーカーA~Eについて, 加えた水酸化バリウム水溶液の体積と生じた硫酸バリウムの質量との関係をグラフにまとめたところ, 図のようになった。

図

問1 ろ過のしかたを表した図として, 最も適切なものを, 次のア~エから1つ選び, 記号で答えなさい。

問1	
----	--

問1	イ
----	---

問1 ろ過の注意点には, ろうとのあしのとがっているほうをビーカーの壁につけておくこと, 液はガラス棒に伝わせながら少しずつ注ぐことなどがある。

【過去問 7】

温度による物質の変化のようすを調べるために、エタノールを用いて実験を行った。次の問1, 問2に答えなさい。
(秋田県 2015 年度)

問1 図1のように、ポリエチレンのふくろに液体のエタノールを少量入れて密閉し、熱い湯をかけたところ、図2のようにふくらんだ。

- ① 温度によって物質の状態が、固体、液体、気体のように変わることを何というか、書きなさい。
- ② 図1, 図2のふくろの中のエタノールをそれぞれP, Qとするとき、PとQの質量、PとQの密度のそれぞれの関係を正しく表しているものは次のどれか、1つずつ選んで記号を書きなさい。ただし、Qは気体の状態とする。
ア PがQより大きい イ PとQは等しい ウ PがQより小さい

問2 図3のように、水とエタノールの混合物を枝つきフラスコに入れて熱し、熱し始めてから1分ごとに温度を測定した結果を図4に示した。また、出てきた液体を3本の試験管にほぼ同じ体積ずつ分けて集め、集めた順に液体A, B, Cとして、それぞれのおいさを調べた。次に、液体A~Cそれぞれにひたしたろ紙を蒸発皿に移してマッチで火をつけ、そのときの様子を調べた。表は、調べた結果を示したものである。

- ① ビーカーの中の水は、試験管に液体を集めるために、どのような役割をはたしているか、書きなさい。
- ② 沸騰が始まったのは、熱し始めてから約何分後か、次から1つ選んで記号を書きなさい。

ア 約4分後 イ 約7分後 ウ 約10分後 エ 約13分後

③ 液体A~Cのうち、エタノールを最も多くふくむものはどれか、記号を書きなさい。また、水とエタノールでは、どちらの沸点が低いか、物質名を書きなさい。

④ 図3のように、沸点のちがいを利用して、液体の混合物を分ける方法を何というか、次から1つ選んで記号を書きなさい。

ア ろ過 イ 還元 ウ 蒸留 エ 燃焼

表

液体	におい	火をつけたときの様子
A	ある	よく燃えた
B	少しある	少し燃えた
C	ない	燃えなかった

問 1	①		
	②	質量	
密度			
問 2	①		
	②		
	③	記号	
		物質名	
④			

問 1	①	状態変化	
	②	質量	イ
密度		ア	
問 2	①	例 出てきた気体を冷やして液体にする役割	
	②	ア	
	③	記号	A
		物質名	エタノール
④	ウ		

問 1 ① 温度によって物質の状態が変わる変化を状態変化という。

② 状態が変わっても質量は変わらないが、体積が大きくなると密度が小さくなる。

問 2 ① 枝つきフラスコから気体が出てくるので、その気体を液体にもどすために水で冷やす。

② 状態変化するときはまわりから熱をうばうので、温度の上がり方がゆるやかになる。

③ エタノールは火をつけると燃える。はじめに沸騰する物質は水より沸点の低いエタノールである。

④ 沸点の違いを利用して、混合物を分ける方法を蒸留という。

【過去問 8】

慎也さんは、身のまわりのプラスチック製品A～Eがどの種類のプラスチックでできているかを判断するため、次の①～④の手順で実験を行った。図1は、メスシリンダーを用いてプラスチック片の体積をはかる様子を表した模式図である。表1は、実験結果であり、表2は、プラスチックの種類ごとの密度をまとめたものである。あとの問いに答えなさい。なお、1 mL = 1 cm³である。

(山形県 2015 年度)

【実験】

- ① プラスチック製品Aから、プラスチック片をつくった。
- ② Aのプラスチック片の質量を、電子てんびんではかった。
- ③ 100mLのメスシリンダーに水を50.0mL入れ、図1のように、Aのプラスチック片を針金で水中に押しこみ、体積をはかった。ただし、針金の体積は考えないものとする。
- ④ プラスチック製品B～Eについて、それぞれ①～③を同様に行った。

問1 ③で、Aのプラスチック片を入れたとき、メスシリンダーの液面を真横から水平に見ると、図2のようであった。表1の にあてはまる数値を書きなさい。

表1

プラスチック製品	プラスチック片の質量 [g]	プラスチック片の体積 [cm ³]
A	5.8	<input type="text" value="a"/>
B	5.4	3.9
C	5.5	6.1
D	6.5	7.0
E	6.7	4.8

問2 次は、プラスチックの特徴と区別の方法について、慎也さんがまとめたものである。 , にあてはまるものの組み合わせとして最も適切なものを、あとのア～エから一つ選び、記号で答えなさい。また、 にあてはまる言葉を書きなさい。

プラスチックには共通点がある。それは、 であることや、じょうぶで軽い、さびない、加工しやすいなどの性質をもつことである。一方、プラスチックには種類ごとそれぞれ固有の性質があり、性質に合わせて多様な用途に利用されている。例えば、ポリエチレンテレフタレートは や磁気テープなどに、ポリエチレンはレジ袋や容器などに利用されている。ポリエチレンテレフタレートとポリエチレンを区別する方法の一つには、その密度の違いを利用して、水に を調べるという方法がある。

ア b 有機物	c ペットボトル
イ b 有機物	c 水道管のパイプ
ウ b 無機物	c ペットボトル
エ b 無機物	c 水道管のパイプ

問3 表1のB～Eのうち、ポリエチレンテレフタレートはどれか。表2をもとに、表1のB～Eからすべて選び、記号で答えなさい。

表2

プラスチックの種類	密度 [g/cm ³]
ポリエチレン	0.92～0.97
ポリプロピレン	0.90～0.91
ポリスチレン	1.05～1.07
ポリエチレンテレフタレート	1.38～1.40

問1		
問2	記号	
	d	
問3		

問1	5.5 ※「5.4」や「5.6」でもよい	
問2	記号	ア
	d	例 浮くかどうか
問3	B, E ※すべてできて正答	

問1 メスシリンダーはへこんだ面(メニスカス)を真横から水平に見て、目盛りの $\frac{1}{10}$ までを目分量で読みとる。メスシリンダーの値が55.5mLなので、プラスチック片の体積は、 $55.5 [\text{cm}^3] - 50 [\text{cm}^3] = 5.5 [\text{cm}^3]$

問2 プラスチックは燃やすと二酸化炭素や水が発生するので有機物である。ポリエチレンテレフタレートは PET と表記し、ペットボトルに利用されている。表2より、ポリエチレンの密度は水の密度より小さいので水に浮くが、ポリエチレンテレフタレートの密度は水の密度より大きいので、水に沈む。

問3 それぞれの密度を計算する。

$$\text{A} \cdots \frac{5.8 [\text{g}]}{5.5 [\text{cm}^3]} = 1.05 [\text{g}/\text{cm}^3] \quad \text{B} \cdots \frac{5.4 [\text{g}]}{3.9 [\text{cm}^3]} = 1.38 \cdots [\text{g}/\text{cm}^3]$$

$$\text{C} \cdots \frac{5.5 [\text{g}]}{6.1 [\text{cm}^3]} = 0.90 \cdots [\text{g}/\text{cm}^3] \quad \text{D} \cdots \frac{6.5 [\text{g}]}{7.0 [\text{cm}^3]} = 0.92 \cdots [\text{g}/\text{cm}^3]$$

$$\text{E} \cdots \frac{6.7 [\text{g}]}{4.8 [\text{cm}^3]} = 1.39 \cdots [\text{g}/\text{cm}^3]$$

【過去問 9】

次の問いに答えなさい。

(福島県 2015 年度)

問3 図は、飲料水などのプラスチック容器についている識別マークである。このマークが示すプラスチックの種類は何か。次のア～エの中から1つ選びなさい。

- ア ポリエチレンテレフタレート
- イ ポリ塩化ビニル
- ウ ポリエチレン
- エ ポリプロピレン

問4 図は、銅の棒をアルコールランプで熱したときの模式図である。次の文の□にあてはまることばは何か。下のア～ウの中から最も適当なものを1つ選びなさい。

銅の棒の中央をアルコールランプで熱すると、棒の両端もあたたかくなる。これは、銅の中を熱が移動したためである。このような熱の伝わり方を□という。

- ア 対流
- イ 伝導
- ウ 放射

問3	
問4	

問3	ア
問4	イ

問3 PETは Poly(ポリ)Ethylene(エチレン)Terephthalate(テレフタレート)の略である。

問4 対流は、加熱された液体や気体が移動することで伝わる伝わり方。放射は光源や熱源からの光による伝わり方。

【過去問 10】

次の実験について、問いに答えなさい。

(福島県 2015 年度)

実験 1

図 1 のように、塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を、試験管に入れて加熱した。このときに発生した気体のアンモニアを乾いた丸底フラスコに集めた。

図 1

実験 2

実験 1 のアンモニアが入った丸底フラスコを用いて、図 2 のような装置を組み立てた。次に、スポイトで丸底フラスコの中に水を入れた。

図 2

問 1 実験 1 で、図 1 のように発生した気体を集める方法を何法というか。書きなさい。

問 3 実験 2 を行ったとき、フェノールフタレイン溶液を加えた水が、丸底フラスコの中にふき上がった。次の①、②の問いに答えなさい。

① ふき上がった水は何色になるか。次のア～エの中から適当なものを 1 つ選びなさい。

- ア 赤色 イ 黄色 ウ 緑色 エ 青色

② 丸底フラスコの中に水がふき上がった理由を説明するとどのようになるか。圧力ということばを用いて、「アンモニアが」という書き出しに続けて書きなさい。

問 1	法	
問 3	①	アンモニアが
	②	

問 1	上方置換 法	
問 3	①	ア
	②	アンモニアが 水に溶けて、丸底フラスコ内の圧力が大気圧より低くなったから。

問1 アンモニアは水に非常によくとけ、空気よりも軽いので、上方置換法で集める。

問3 ① アンモニアは水にとけるとアルカリ性を示すので、フェノールフタレイン溶液が赤くなる。

② 丸底フラスコ内のアンモニアが水にとけると、丸底フラスコ内の気圧が下がり、水が吸い上げられる。

【過去問 11】

次の問いに答えなさい。

(茨城県 2015 年度)

問4 次の文中の **あ** , **い** に当てはまる語を書きなさい。

身のまわりにあるいろいろな製品は、石油などを原料としてつくられているものが多い。例えばペットボトルは、本体がポリエチレンテレフタレート（PET）からできている。また、弁当箱には軽くて丈夫なポリプロピレン（PP）が使われている。これらの物質を **あ** とよぶ。

金属は燃えても二酸化炭素を発生しないが、**あ** は燃えると二酸化炭素を発生するため、**あ** はどれも **い** である。

問6 図は、純粋な水からつくった氷を一様に加熱したときの時間と温度の関係を模式的に表したものである。固体の氷を加熱すると液体の水になり、さらに加熱すると気体の水蒸気になる。液体の水が存在するのは図のア～オのどれか、すべて選んで、その記号を書きなさい。

問4	あ	
	い	
問6		

問4	あ	プラスチック ※合成樹脂でも可
	い	有機物
問6	イ, ウ, エ ※すべて正答の場合に点を与える	

問4 ペットボトルなどを総称してプラスチックという。プラスチックは燃やすと二酸化炭素が発生する有機物である。

問6 イは氷がとけ始めてから終わるまでの間なので、氷と水が両方存在している状態。ウは水だけが存在している状態。エは水が沸騰し始めてから終わるまでの間なので、水と水蒸気が両方存在している状態。よって、イ, ウ, エ。

【過去問 12】

次の問いに答えなさい。

(栃木県 2015 年度)

問3 次のうち、状態変化はどれか。

- ア やかんに水を入れて加熱したら、水が水蒸気になった。
- イ 携帯用カイロを袋から出したら、カイロが温かくなった。
- ウ 線香に火をつけたら、線香が燃えて二酸化炭素が発生した。
- エ 温かい紅茶に砂糖を入れたら、砂糖が溶けて見えなくなった。

問6 水に溶けにくい気体を発生させて集めるとき、最も適している集め方を何というか。

問3	
問6	

問3	ア
問6	水上置換(法)

問3 状態変化とは、温度によって物質の状態が変わる変化をいう。アは温度を上げることで液体の水から気体の水蒸気になり、冷やせば水蒸気から水にもどるので、状態変化である。

問6 水に溶けにくい気体を集めるには、水上置換(法)が適している。

【過去問 13】

次の問いに答えなさい。

(群馬県 2015 年度)

問6 密度が 1.1g/cm^3 の食塩水がある。この食塩水 200cm^3 の質量はいくらか、書きなさい。

問6	
----	--

問6	220 g
----	-------

問6 $200 [\text{cm}^3] \times 1.1 [\text{g/cm}^3] = 220 [\text{g}]$

【過去問 14】

次の問いに答えなさい。

(埼玉県 2015 年度)

問4 右の図の実験装置は、アンモニアの性質を調べる実験を行うためのものです。アンモニアを集めた丸底フラスコの中にスポイトで水を入れると、丸底フラスコの中にビーカーの水が噴き上がります。このように水が噴き上がるのは、アンモニアのどのような性質によるものですか。次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

- ア 強い刺激臭がある。
- イ 空気より軽い。
- ウ 水に溶けやすい。
- エ ものを燃やすはたらきがある。

問4	
----	--

問4	ウ
----	---

問4 アンモニアの、非常に水に溶けやすい性質を利用する。エは酸素の性質。

【過去問 15】

銅を加熱したときの質量の変化を調べる実験と、酸化銅と炭素の粉末を混ぜて加熱したときの反応を調べる実験を行いました。問いに答えなさい。

(埼玉県 2015 年度)

実験 1

- (1) 電子てんびんでステンレス皿の質量をはかった。
- (2) 電子てんびんで銅の粉末 0.4 g をはかりとった。
- (3) 図 1 のように、はかりとった銅の粉末をすべてステンレス皿にのせてうすく広げ、粉末の表面の色が変化するまで加熱した。
- (4) ステンレス皿が十分に冷えてから、電子てんびんで全体の質量をはかった。その後、加熱した粉末をよくかき混ぜ、再び加熱した。
- (5) (4) の操作を質量の変化がなくなるまで繰り返した。
- (6) その後、ステンレス皿の質量を引いて、加熱後の物質の質量を求めた。
- (7) 銅の粉末の質量を 0.8 g, 1.2 g, 1.6 g, 2.0 g と変えて、それぞれ (3) ~ (6) の手順で実験を行った。

<結果>

- 1 銅を加熱すると、銅は黒色の物質に変化した。
- 2 実験の結果をもとに、加熱前の銅の質量と、加熱後の物質の質量の関係をグラフに表したところ、図 2 のようになった。

実験 2

- (1) 班ごとに電子てんびんで酸化銅の粉末 8.0 g をはかりとり、乳鉢に入れた。
- (2) 十分に乾燥させた炭素の粉末を、班ごとに質量を決めて電子てんびんではかりとり、(1)の乳鉢に加え、よく混ぜ合わせた。それぞれの班で使用した炭素の粉末の質量は、次の表のとおりである。

表

	1班	2班	3班
炭素の質量 [g]	0.3	0.6	0.9

- (3) (2)でよく混ぜ合わせた粉末を試験管Aにすべて入れ、**図3**のように加熱したところ、気体が発生した。
- (4) 気体の発生が止まった後、石灰水の入った試験管Bからガラス管を抜き、加熱するのをやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。
- (5) 試験管Aが十分に冷えてから、試験管Aの中に残った加熱後の固体の物質を薬包紙にすべて取り出し、電子てんびんでその物質の質量をはかった。
- (6) (5)で薬包紙に取り出した物質を薬さじの裏で強くこすり、金属光沢がみられるかどうかを調べた。

図3

<結果>

- (3)では、すべての班の試験管Bの石灰水が白く濁った。
- (5)で、2班の試験管Aから取り出した物質は赤茶色をしており、その物質の質量をはかったところ6.4gであった。
- (6)では、すべての班で金属光沢がみられた。

調べてわかったこと

- 実験1でできた黒色の物質は酸化銅であった。
- 実験2で、2班の試験管A内では酸化銅と炭素の粉末がすべて反応し、気体のほかには赤茶色の物質のみができた。この赤茶色の物質は銅であった。

問1 **図4**は、ガスバーナーに点火したときの炎のようすを示したものです。 **図4**

このときの炎は空気の量が不足していたため、炎は赤色でした。この炎を、空気を入れて青色の安定した炎にするための操作として正しいものを、次の**ア**～**エ**の中から一つ選び、その記号を書きなさい。

- ア** ねじ**b**を①の方向にまわす。
イ ねじ**b**を②の方向にまわす。
ウ ねじ**b**を押さえて、ねじ**a**を①の方向にまわす。
エ ねじ**b**を押さえて、ねじ**a**を②の方向にまわす。

問2 「みがくと金属光沢がみられる」という銅の性質は、金属に共通する性質です。金属に共通する性質でないものを、次の**ア**～**エ**の中から一つ選び、その記号を書きなさい。

- ア** 電気をよく通す。 **イ** 磁石に引きつけられる。
ウ 熱をよく伝える。 **エ** たたくとうすく広がる。

問 1	
問 2	

問 1	ウ
問 2	イ

問 1 空気調節ねじはねじ a で、反時計回りに回すと開く。

問 2 金属の共通の性質には、「電気をよく通す」「熱をよく伝える」「たたくとうすく広がる」「引っ張るとのびる」などがあるが、磁石に引きつけられる性質は、鉄など一部の金属だけの性質である。

【過去問 16】

塩酸と亜鉛を反応させたとき発生する水素の体積を調べるため、次の**実験**を行いました。これに関して、あとの問いに答えなさい。なお、一定量の亜鉛に対して、反応する塩酸の量やそのとき発生する水素の体積には限界があり、反応した塩酸の量と発生する水素の体積は比例します。

(千葉県 2015 年度 後期)

実験 ① 図のような装置を用いて、亜鉛 0.30 g が入った試験管にうすい塩酸 2.0cm³を加えた。このとき発生した水素をメスシリンダーを用いて集め、その体積を測定した。

② 次に、亜鉛 0.30 g が入った別の試験管を 5 本用意し、①で用いた塩酸と同じ濃度の塩酸を用いて実験を行った。それぞれの試験管に加える塩酸の体積を 4.0cm³, 6.0cm³, 8.0cm³, 10.0cm³, 12.0cm³ とし、①と同様にして、発生した水素の体積を測定した。表は、その結果をまとめたものである。

表

加えた塩酸の体積 [cm ³]	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
発生した水素の体積 [cm ³]	0	30.0	60.0	90.0	105.0	105.0	105.0

問1 **実験**で、図のように水上置換法で気体を集めることができるのは、気体のどのような性質を利用したのか。その説明として最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

- ア 空気より密度が大きい
- イ 空気より密度が小さい
- ウ 水に溶けやすい
- エ 水に溶けにくい

問1

問1

エ

問1 水上置換法は、水に溶けにくい気体を集めるのに適している。

【過去問 17】

物質が水に溶けるようすを観察したり、液体の混合物にふくまれている物質を分離したりするため、次の実験 1, 2 を行いました。これに関して、あとの問 1～問 4 に答えなさい。

(千葉県 2015 年度 前期)

実験 1 水の入ったビーカーをガスバーナーで加熱した。ガスバーナーに火をつけたとき、a オレンジ色の小さな炎だったので、調節ねじを回して青白い大きな炎に変えた。

しばらくして、ビーカーの中に硫酸銅の結晶を加え、ガラス棒でかき混ぜて結晶をすべて溶かしたところ、b 全体が青色の透明な水溶液になった。

図 1 は、加熱時のガスバーナーのようすである。

実験 2 ① 図 2 の装置の枝つきフラスコに赤ワインを入れ、ガスバーナーで加熱した。しばらくすると、沸とうが始まり、氷水の入ったビーカーの中の試験管に液体が生じた。

② ①で生じた液体を約 3mL 集めた。加熱を続けながら、続けて別に用意した 2 本の試験管にも生じた液体をそれぞれ約 3mL ずつ集めた。集めた順にそれらの試験管を試験管 X, Y, Z とした。

次に、それぞれの試験管の中の液体について、においを調べた。表は、その結果をまとめたものである。

また、試験管 X の液体を指先に少しつけ、手の甲にこすりつけると、冷たい感じがした。

図 2

表

試験管 X	アルコールのにおいがした。
試験管 Y	アルコールのにおいがしたが、試験管 X よりは弱かった。
試験管 Z	アルコールのにおいがしたが、試験管 Y よりさらに弱かった。

問1 次の文は、実験1の下線部aの操作について述べたものである。文中の **A** ~ **D** にあてはまることばの組み合わせとして最も適当なものを、あとのア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

ガスバーナーの **A** を回して **B** の量を多くし、その後 **C** を回して **D** の量を調節する。

	A	B	C	D
ア	上のねじ	空気	下のねじ	ガス
イ	上のねじ	ガス	下のねじ	空気
ウ	下のねじ	空気	上のねじ	ガス
エ	下のねじ	ガス	上のねじ	空気

問2 実験1の下線部bの水溶液のようすを表した模式図として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。ただし、硫酸銅の粒子を●として表すものとする。

問3 実験2の②で、試験管Xに集めた液体の説明として最も適当なものを、次のア~エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

- ア 1種類の物質からできている液体である。
- イ マッチの火を近づけると燃える液体である。
- ウ 赤色の液体である。
- エ 密度が 1.0 g/cm^3 の液体である。

問4 実験2において、集めた液体のにおいが、試験管X, Y, Zの順に次第に変化していったのはなぜか。「沸点」「蒸発」ということばを用いて、その理由を簡潔に書きなさい。

問1	
問2	
問3	
問4	

問 1	エ
問 2	イ
問 3	イ
問 4	はじめは、水より沸点の低いアルコールが多く蒸発するが、しだいに蒸発する水の割合が増えていくため。

問 1 ガスバーナーの下のねじがガス調節ねじ，上のねじが空気調節ねじである。炎の大きさを調節するにはガス調節ねじを，炎の色を調節するには空気調節ねじを使う。はじめにガス調節ねじで炎の大きさを調節し，空気調節ねじで炎の色を調節する。

問 2 水溶液では，水に溶けている粒子が水溶液中にまんべんなく広がっている。

問 3・問 4 液体の混合物を蒸発させて沸点の低い液体をとり出す方法を，蒸留という。ワインはアルコールと水の混合物で，蒸留を行うとはじめは沸点の低いアルコールが多く生じるので，試験管 X にはアルコールが多く含まれている。その後，しだいに沸点の高い水が多く生じるので，試験管 Y，Z の順に，アルコールのにおいが弱くなっていく。

【過去問 18】

塩酸に炭酸水素ナトリウムを加えると、反応して二酸化炭素が発生する。塩酸と炭酸水素ナトリウムが反応するときの質量の関係を調べるため、次の実験を行いました。これに関して、あとの問いに答えなさい。

(千葉県 2015 年度 前期)

- 実験** ① ビーカーに塩酸を入れ、**図1**のように、ビーカーをふくむ全体の質量をはかったところ、100.00 gであった。
- ② あらかじめ薬包紙の質量を引いてから、**図2**のように、炭酸水素ナトリウムを1.00 gはかった。
- ③ **図3**のように、①の塩酸が入ったビーカーに、②ではかった炭酸水素ナトリウム1.00 gをすべて加え、よく振り混ぜた。十分に時間が経過した後、ビーカーをふくむ全体の質量を測定した。**図4**は、このときの様子である。
- ④ この後、炭酸水素ナトリウムを1.00 gばかり、③のビーカーにすべて加え、よく振り混ぜた。十分に時間が経過した後、ビーカーをふくむ全体の質量を測定した。
- 同様の操作を合計で7回くり返し行い、その回ごとにビーカーをふくむ全体の質量を測定した。

図1 図2

図3 図4

表は、加えた炭酸水素ナトリウムの質量の合計とビーカーをふくむ全体の質量の関係をまとめたものであり、**図5**は、その関係を表したグラフである。

図5から、加えた炭酸水素ナトリウムの質量の合計が4.00 gのところではグラフの傾きが変わることがわかった。

表

炭酸水素ナトリウムを加えた回数	①のビーカー	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目
加えた炭酸水素ナトリウムの質量の合計 [g]	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
ビーカーをふくむ全体の質量 [g]	100.00	100.48	100.95	101.43	101.90	102.90	103.90	104.90

図5

問2 実験では二酸化炭素が発生する。二酸化炭素について述べた文として最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、その符号を書きなさい。

- ア 空気中に約 21%含まれる。
- イ 有機物の燃焼で生じる。
- ウ ものを燃やすはたらきがある。
- エ 卵が腐ったような特有のにおいをもつ。

問2	
----	--

問2	イ
----	---

問2 ア, ウは酸素, エは硫化水素の性質である。

【過去問 19】

次の問いに答えよ。

(東京都 2015 年度)

問2 図2のような装置を用いて、混合物を分離する実験を行った。加熱をする際に、ガスバーナーの炎を適切な大きさの青色の炎にする操作の手順と、加熱をやめる前に確認することを組み合わせたものとして適切なのは、次の表のア～エのうちではどれか。

図2

	適切な大きさの青色の炎にする操作の手順	加熱をやめる前に確認すること
ア	ガス調節ねじを緩めて炎の大きさを調節した後、ガス調節ねじを押さえて空気調節ねじを緩め、青色の炎にする。	ガラス管が、たまった液の中に入っていることを確認する。
イ	ガス調節ねじを押さえて空気調節ねじを緩め、青色の炎にした後、ガス調節ねじを緩めて炎の大きさを調節する。	ガラス管が、たまった液の中に入っていることを確認する。
ウ	ガス調節ねじを緩めて炎の大きさを調節した後、ガス調節ねじを押さえて空気調節ねじを緩め、青色の炎にする。	ガラス管が、たまった液の中に入っていないことを確認する。
エ	ガス調節ねじを押さえて空気調節ねじを緩め、青色の炎にした後、ガス調節ねじを緩めて炎の大きさを調節する。	ガラス管が、たまった液の中に入っていないことを確認する。

問2	
----	--

問2	ウ
----	---

問2 ガスバーナーはガス調節ねじで炎の大きさを調節し、その後空気調節ねじで炎の色を調節する。空気調節ねじはガス調節ねじを押さえながら緩める。加熱をやめるときに、ガラス管が、たまった液の中に入っていると、液がガラス管を逆流することがあるので、入っていないことを確認する。

【過去問 20】

生徒が、スポーツに関わることについて科学的に探究しようと考え、自由研究に取り組んだ。生徒が書いたレポートの一部を読み、次の問いに答えよ。

(東京都 2015 年度)

<p><レポート1>砲丸投げの砲丸について</p> <p>陸上競技の砲丸投げでは、公式大会で使用する砲丸の大きさや質量が規定されている。一般男子用の砲丸の質量は7.26kgで、主に鉄で作られている。直径は11cmから13cmまでの間で様々な大きさがあり、競技者が持ちやすいものを選べるようになっている。質量が同じで、大きさを変えるために、製造工程で様々な工夫がされている。ある公式大会で使用された砲丸は図1や図2のような構造をしていることが分かった。また、鉄の密度を調べると7.9 g/cm³であることが分かった。</p>	<div style="margin-bottom: 20px;"> <p>図1</p> <p>直径11cm 体積700cm³</p> <p>鉄とは異なる密度の物質A</p> </div> <div> <p>図2</p> <p>直径13cm 体積1100cm³</p> <p>鉄とは異なる密度の物質B</p> </div>
--	---

問1 <レポート1>から、砲丸に使われている物質Aと物質Bの密度について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 物質Aの密度は鉄より大きく、物質Bの密度は鉄より小さい。
- イ 物質Aの密度は鉄より小さく、物質Bの密度は鉄より大きい。
- ウ 物質Aの密度は鉄より小さく、物質Bの密度は物質Aより小さい。
- エ 物質Aの密度は鉄より大きく、物質Bの密度は物質Aより大きい。

問1	
----	--

問1	ア
----	---

問1 それぞれすべて鉄でできているとすると、図1の砲丸の質量は $700 [\text{cm}^3] \times 7.9 [\text{g}/\text{cm}^3] = 5530 [\text{g}] = 5.53 [\text{kg}]$ 図2の砲丸の質量は $1100 [\text{cm}^3] \times 7.9 [\text{g}/\text{cm}^3] = 8690 [\text{g}] = 8.69 [\text{kg}]$ 実際の砲丸の質量は7.26kgなので、図1の砲丸の物質Aは鉄よりも重く、図2の砲丸の物質Bは鉄よりも軽い必要がある。

【過去問 21】

次の各問いに答えなさい。

(神奈川県 2015 年度)

問1 白い粉末状の砂糖と食塩がある。これらを用いて、次の1～4の操作をそれぞれ行ったとき、明らかに異なる結果となるものはどれか。一つ選び、その番号を書きなさい。

- 1 粉末のにおいをかぐ。
- 2 粉末を加熱する。
- 3 粉末に磁石を近づける。
- 4 粉末を水に溶かし、さらにBTB溶液を加える。

問2 次のa～dの組み合わせで固体を液体に入れたとき、固体が液体に浮かぶと考えられるものはどれか。最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。ただし、実験は20℃で行い、ポリスチレン、水銀、エタノールの20℃における状態と密度は右の表に示したとおりとする。

表 20℃における物質の状態と密度

物質	状態	密度 [g/cm ³]
ポリスチレン	固体	1.05
水銀	液体	13.6
エタノール	液体	0.79

	固体	液体
a	質量13.6g, 体積5cm ³ の金属	水銀
b	ポリスチレン	エタノール
c	質量13.6g, 体積5cm ³ の金属	質量60g, 体積50cm ³ の食塩水
d	ポリスチレン	質量60g, 体積50cm ³ の食塩水

- 1 a, d 2 b, d 3 b, c 4 a, c

問1	
問2	

問1	2
問2	1

問1 砂糖は有機物なので、加熱するとこげる。無機物の食塩は加熱しても変化しない。

問2 固体を液体に入れたとき、固体が液体に浮かぶのは、固体の密度が液体よりも小さいときである。

質量13.6g, 体積5cm³の金属の密度は $13.6 \text{ [g]} \div 5 \text{ [cm}^3\text{]} = 2.72 \text{ [g/cm}^3\text{]}$, 質量60g, 体積50cm³の食塩水の密度は $60 \text{ [g]} \div 50 \text{ [cm}^3\text{]} = 1.2 \text{ [g/cm}^3\text{]}$ よって、金属は水銀に浮き、ポリスチレンは食塩水に浮く。

【過去問 22】

太郎さんは、身のまわりの物質を区別したり分けたりする実験を行った。下の表は、固体や液体の物質の密度を示したものである。あとの問いに答えなさい。

(富山県 2015 年度)

表 図1

固体の密度 [g/cm ³]		液体の密度 [g/cm ³]	
アルミニウム	2.70	水	1.00
鉄	7.87	エタノール	0.79
銅	8.96	菜種油	0.91~0.92
銀	10.50	過酸化水素	1.44
金	19.32	水銀	13.55

〈実験1〉 ①ある物質Ⅰでできた金属球の質量を測定したところ、116.5 gであった。体積を調べるため、100cm³のメスシリンダーに30.0cm³の水を入れ、金属球を細い糸で結び、沈めたところ、図1のようになった。この金属球を図2のように、②ある液体Ⅱに入れると、金属球が浮いた。

図2

問1 下線部①について、物質Ⅰは何か、表の中から最も適切なものを選び、物質名を書きなさい。

問2 下線部②について、液体Ⅱは何か、表の中から最も適切なものを選び、物質名を書きなさい。また、その液体を選んだ理由を簡単に書きなさい。

〈実験2〉 図3のように、③エタノール 10.0cm³に水を加えて、質量を45.0 gにした混合物を枝つきフラスコに入れ、④蒸留する。

問3 下線部③について、エタノールを溶質、水を溶媒としたときの、質量パーセント濃度は何%か。小数第2位を四捨五入して小数第1位まで求めなさい。

問4 下線部④について、太郎さんは実験前に、図3の装置は、安全に実験をする上で、枝つきフラスコに入れなければならないものがあることに気がついた。それは何か、名称を書きなさい。

図3

問5 下線部④について、適切な装置にしたあと蒸留した。蒸留中の蒸気の温度変化を表したグラフとして適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

問1	物質I	
問2	液体II	
	理由	
問3	%	
問4		
問5		

問1	物質I	銅
問2	液体II	水銀
	理由	物質Iより密度が大きいから など
問3	17.6 %	
問4	沸騰石	
問5	イ	

問1 物体Iは質量116.5 g、体積は $43.0 \text{ [cm}^3] - 30.0 \text{ [cm}^3] = 13.0 \text{ [cm}^3]$ なので、

密度は、 $\frac{116.5 \text{ [g]}}{13.0 \text{ [cm}^3]} = 8.96 \text{ [g/cm}^3]$ より、これは銅である。

問2 物質Iより密度が大きい液体ならば銅は浮く。よって、水銀が当てはまる。

問3 エタノールの密度が 0.79 g/cm^3 なので、エタノール 10.0 cm^3 の質量は 7.9 g になる。

よって、質量パーセント濃度は、 $\frac{7.9 \text{ [g]}}{45.0 \text{ [g]}} \times 100 = 17.55\cdots \text{ [%]}$

問4 加熱する場合は突沸を防ぐため沸騰石を入れる。

問5 エタノールと水の混合物なので、先にエタノールが気体となって出てくる。

【過去問 23】

以下の問いに答えなさい。

(石川県 2015 年度)

問3 物質の状態変化について、次の(1)、(2)に答えなさい。

- (1) 氷などの固体がとけて液体になるときの温度を何というか、書きなさい。
- (2) ビーカーに入れた固体のロウを加熱して液体にし、その後冷やして再び固体にした。そのビーカーを観察したところ、断面が図4のようになった。また、ロウの質量は、固まる前と固まった後では同じであった。液体のロウが固体になるとき、ロウの密度はどのように変化したか、そう判断した理由とあわせて書きなさい。

問3	(1)	
	(2)	

問3	(1)	融点
	(2)	質量が変わらず体積が小さくなったので、密度は大きくなった。

- 問3 (1) 固体がとけて液体になる温度を融点といい、液体が気体になる温度を沸点という。
- (2) 中央部分がへこんだことから、体積は小さくなっている。物体の密度は、質量が同じで体積が小さくなると大きくなる。

【過去問 24】

Aさんは、温度による溶解度の変化を実際に確かめようと思い、次の実験を行った。あとの問いに答えよ。

(福井県 2015 年度)

40℃の水 100 g に、硝酸カリウムをかき混ぜながら加えていったところ、ある量をこえると硝酸カリウムはそれ以上溶けなくなった。そこで溶け残った硝酸カリウムをろ過し、①40℃の硝酸カリウム飽和水溶液を得た。次に、この硝酸カリウム飽和水溶液を温め、80℃に保ちながら硝酸カリウムを 36 g 追加するとすべて溶けた。そこで、さらに硝酸カリウムを加えようとしたが、誤って塩化ナトリウムを 36 g 加えて溶かしてしまい、②硝酸カリウムと塩化ナトリウムが混じった 80℃の水溶液となった。

図1は、硝酸カリウムと塩化ナトリウムの溶解度曲線である。

なお、実験中、水はろ過などの操作や蒸発で失われないものとし、混合水溶液中においても、それぞれの物質の溶解度は図1のとおりとする。

図1

問1 下線の部分①の硝酸カリウム飽和水溶液の質量パーセント濃度は何%か。答えは小数第1位を四捨五入して整数で答えよ。

問2 下線の部分②の混合水溶液から硝酸カリウムの結晶のみをできるだけ多く取り出したい。この混合水溶液を何℃まで冷却すればよいか。また、このとき得られる硝酸カリウムの結晶は何gか。整数で答えよ。

問5 図2は、Aさんが行ったろ過のようすを表したものであるが、適切でないところが1か所ある。どのようにすればよいか。簡潔に書け。

図2

問1		%
問2		℃
		g
問5		

問 1	39 %
問 2	30 °C
	54 g
問 5	ろうとの足をビーカーの壁につける。

問 1 40°Cの水に硝酸カリウムは64 g 溶ける。よって、 $\frac{64 \text{ [g]}}{100 \text{ [g]} + 64 \text{ [g]}} \times 100 = 39.0 \dots \text{ [%]}$

問 2 塩化ナトリウムが 100 g の水に 36 g 溶けるのは、水温が 30°C のときである。すなわち、この温度より低くなると塩化ナトリウムが出てくるため、硝酸カリウムのみを取り出したい場合は、塩化ナトリウムが出てくる 30°C 以上にする必要がある。30°C では、硝酸カリウムは 46 g 溶けるので、出てくる硝酸カリウムの質量は、 $64 \text{ [g]} + 36 \text{ [g]} - 46 \text{ [g]} = 54 \text{ [g]}$

問 5 ろ過では、ろうとの足の長いほうをビーカーの壁につけ、ガラス棒はろ紙につけて溶液をガラス棒に伝わらせて流す必要がある。

【過去問 25】

うすい過酸化水素水、アンモニア水、炭酸水のいずれかであることがわかっている三つの水溶液 A, B, C がある。これらの水溶液を用意して、次の実験を行った。問1～問4に答えなさい。

(山梨県 2015 年度)

〔実験1〕 A, B, Cを別々の試験管に少量ずつとり、それぞれに緑色のBTB溶液を少量加えたところ、Aは緑色、Bは黄色、Cは青色になった。

〔実験2〕 次に、Aを二酸化マンガンが入った別の試験管に少量加えた。しばらくしてから、この試験管に、火のついた線香を入れたところ、線香が激しく燃えた。

〔実験3〕 次に、Bを沸騰石が入った別の試験管に少量とった。図1のように、Bの入った試験管を弱火で加熱し、出てきた気体を石灰水に通したところ、石灰水が白くにごった。

〔実験4〕 次に、Cを沸騰石が入った別の試験管に少量とった。図2のように、Cの入った試験管を弱火で加熱し、出てきた気体を試験管Xに集めた。しばらくしてから、試験管Xの口に水でぬらしたリトマス紙を近づけたところ、リトマス紙の色が変化した。

〔実験5〕 〔実験4〕の試験管Xにゴム栓でふたをし、これを図3のように、水の入った水そうに逆さまに立て、ゴム栓をはずしたところ、試験管Xの中に水が勢いよく入った。

図1

図2

図3

問1 〔実験2〕で、線香を激しく燃やした気体と、〔実験3〕で、石灰水を白くにごらせた気体の名称をそれぞれ書きなさい。

問2 次の□は、〔実験4〕について述べた文である。①、②には当てはまるものを、それぞれア、イから一つずつ選び、その記号を書きなさい。また、□③には当てはまる語句を書きなさい。

〔実験4〕では、① [ア 青 イ 赤] 色リトマス紙が、② [ア 青 イ 赤] 色に変化した。また、図2のような気体の集め方を□③という。

問3 〔実験5〕で、水が試験管Xの中に勢いよく入った理由を、試験管Xの中の気体の名称とその性質にふれて簡単に書きなさい。

問4 図4は、実験で使用したガスバーナーを模式的に表したものであり、R、Sはねじを回す向きを示している。次の□は、ガスバーナーの操作について述べた文である。①、②には当てはまるものを、それぞれP、Qから一つずつ選び、その記号を書きなさい。また、③には当てはまるものを、R、Sから一つ選び、その記号を書きなさい。

図4

ガスバーナーのガスの量を変えずに、空気の量だけを多くするには、ねじ①を押さえ、ねじ②だけを③の向きに回せばよい。

問1	線香を激しく燃やした気体			
	石灰水を白くにごらせた気体			
問2	①		②	
	③			
問3	理由			
問4	①		②	
			③	

問1	線香を激しく燃やした気体 酸素			
	石灰水を白くにごらせた気体 二酸化炭素			
問2	①	イ	②	ア
	③	上方置換		
問3	理由	例 アンモニアが水に非常にとけやすい ため。		
問4	①	Q	②	P
			③	R

問1 酸素分子は酸素原子2個からなる。二酸化炭素分子は炭素原子に酸素原子が左右に1個ずつ結合した形で表す。

問2 Cの気体はアンモニアで、水溶液はアルカリ性である。図2の気体の集め方を上方置換という。

問3 アンモニアは、水に非常にとけやすい。

問4 ねじPは空気調節ねじ、ねじQはガス調節ねじである。Rは開く方向、Sは閉じる方向である。

【過去問 26】

各問いに答えなさい。

(長野県 2015 年度)

I 粉末状の、鉄、ポリエチレン、食塩の混合物から、次の手順でそれぞれの物質を取り出した。

混合物をビーカーに入れ、じゅうぶんな量の水を加えてよくかき混ぜた。ビーカーの a 固体と液体の混合物をろ紙を使って固体と液体に分け、分けた液体から水を蒸発させて **あ** を取り出した。分けた固体を水の入ったビーカーに入れ、水にうく固体の **い** と、しずむ固体の **う** をそれぞれ分けて取り出した。

問1 下線部 a の方法を何というか、書きなさい。

問2 **あ** ~ **う** に当てはまる適切な物質名を、次のア~ウから1つずつ選び、記号を書きなさい。

ア 鉄 イ ポリエチレン ウ 食塩

問3 ポリエチレンの 25cm^3 の質量は、 23.5g だった。密度が $0.79\text{g}/\text{cm}^3$ のエタノールにポリエチレンを入れた。ポリエチレンの密度が何 g/cm^3 かを小数第2位まで示し、エタノールの密度と比較して、ポリエチレンがうくかしずむかを簡潔に説明しなさい。

問1		
問2	あ	
	い	
	う	
問3		

問1	ろ過	
問2	あ	ウ
	い	イ
	う	ア
問3	例 ポリエチレンは、密度が $0.94\text{g}/\text{cm}^3$ で、エタノールの密度よりも大きいので、しずむ。	

問1 ろ紙を用いて固体と液体の混合物を固体と液体に分離する操作をろ過という。

問2 3つの物質のうち、食塩だけが水にとける。ポリエチレンは水にうくが、鉄は水にしずむ。

問3 ポリエチレンの密度は $\frac{23.5 [\text{g}]}{25 [\text{cm}^3]} = 0.94 [\text{g}/\text{cm}^3]$ で、エタノールの密度よりも大きいので、しずむ。

【過去問 27】

鉄の化学変化を調べるために実験 1～3 を行った。問いに答えなさい。

(岐阜県 2015 年度)

〔実験 1〕 鉄粉 7.0 g と硫黄の粉末 4.0 g をよく混ぜ合わせ、アルミニウムはくでつくった筒にかたくつめた。筒の両端をねじって閉じたものを、図 1 のようにガスバーナーで熱し、赤くなったら砂皿の上に置いた。筒は熱を出しながら激しく反応し、黒い物質 A になった。

〔実験 2〕 水をはったバットの上に、燃焼さじでつくった台を置いた。その台の上にスチールウール 0.6 g を置き、火をつけ、酸素をじゅうぶんに入れた集気びんを図 2 のようにかぶせた。スチールウールは熱や光を出しながら激しく反応し、黒い物質 B になった。このとき、集気びんの中の水面は上昇した。

〔実験 3〕 スチールウール、黒い物質 A、黒い物質 B を、少量ずつ別々の試験管にとり、それぞれの試験管にうすい塩酸を加えた。表は、その結果をまとめたものである。

	うすい塩酸との反応
スチールウール	無臭の気体が発生した。
黒い物質 A	腐卵臭のある気体が発生した。
黒い物質 B	気体は発生しなかった。

問 1 次のア～オは、図 3 のようなガスバーナーの使い方について説明したものである。正しい操作の順に並べ、符号で書きなさい。

- ア マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて、点火する。
- イ ガス調節ねじをさらに開いて、炎を適当な大きさに調節する。
- ウ ガスの元栓を開き、その後、コックを開く。
- エ 上下 2 つのねじがしまっていることを確かめる。
- オ ガス調節ねじをおさえて、空気調節ねじを少しずつ開いて、青色の安定した炎にする。

問 1	→	→	→	→
-----	---	---	---	---

問 1	エ → ウ → ア → イ → オ
-----	-------------------

問 1 ガスバーナーは、最初に上下の 2 つのねじがしまっていることを確かめてから使う。

【過去問 28】

太郎さん、花子さん、正夫さん、美保さんの4人は、理科の自由研究に取り組んだ。問いについて、それぞれの問いに答えなさい。

(岐阜県 2015 年度)

問4 美保さんは、混合物を分離する実験を行った。

図3のように、水 15cm³ とエタノール 5 cm³ の混合物を弱火で熱したところ、先に、エタノールを多くふくんだ液体が試験管に出てきた。

- (1) 液体を熱して沸騰させて出てくる気体を、冷やして再び液体にして集める方法を何というか。ことばで書きなさい。
- (2) 水とエタノールの混合物を弱火で熱したとき、熱した時間と混合物の温度との関係を表したグラフとして最も適切なものを、次のア～エから1つ選び、符号で書きなさい。なお、熱し始めてから14分後、枝つきフラスコ内には液体が残っていた。

図3

問4	(1)	
	(2)	

問4	(1)	蒸留
	(2)	ウ

問4 (1) 加熱して出てくる気体を、冷やして再び液体にして集める方法を蒸留という。

(2) 純粋な物質では、沸騰するとき温度が一定となるが、混合物では一定にならない。また、水の沸点が 100°C なので、温度が 100°C をこえることはない。

【過去問 29】

次の問いに答えなさい。

(愛知県 2015 年度 A)

問2 図は、ある物質Aの溶解度曲線である。

今、水 200 g を入れたビーカーに、物質A 90 g を入れ、ビーカーの中の水溶液の温度を 60℃ に保ってよくかき混ぜたところ、物質Aはすべて溶けた。

次に、ビーカーの中の水溶液を 20℃ までゆっくり冷やしたところ、物質Aの一部が結晶として出てきた。このとき、結晶として出てきた物質Aは何gか。最も適当なものを、次のアからオまでのの中から選んで、そのかな符号を書きなさい。

図

ア 32 g

イ 44 g

ウ 56 g

エ 66 g

オ 78 g

問2

問2

エ

問2 水 100 g で考えると、図より、60℃では約 55 g、20℃では約 12 g とけるので、水 200 g では、60℃では 55 [g] $\times 2 = 110$ [g]、20℃では 12 [g] $\times 2 = 24$ [g] とける。物質Aを 90 g 入れたので、20℃で結晶として出てくる物質Aは、90 [g] $- 24$ [g] = 66 [g]

【過去問 30】

次の実験について、あとの各問いに答えなさい。

(三重県 2015 年度)

〈実験〉 図1の固体A～Cは、亜鉛、鉄、チタンのいずれかであり、色や手ざわりが似ている。図2の白い粉末X～Zは、砂糖、食塩、炭酸水素ナトリウムのいずれかであり、見ためや手ざわりで物質を区別できないように粒がすりつぶされている。固体A～Cの物質、粉末X～Zの物質をそれぞれ区別するために、次の①～③の実験を行った。

図1

固体A

固体B

固体C

図2

粉末X

粉末Y

粉末Z

- ① 固体A～Cの密度を求めるために、それぞれの質量と体積をはかった。表1は、質量と体積をはかった結果をまとめたものである。

表1

	固体A	固体B	固体C
質量 [g]	47.22	64.17	81.72
体積 [cm ³]	6.0	9.0	18.0

- ② 粉末X～Zを、図3のように、それぞれ2.0gずつ^{ねんしょう}燃焼さじの上にのせて加熱したところ、粉末Yだけが^{ほのお}炎を出して燃えたので、図4のように、石灰水の入った集気びんに入れてふたをすると、集気びんの内側が^{すいてき}水滴でくもった。炎が消えたらとり出し、ふたをしてから集気びんをよく^ふ振ったところ、石灰水が変化したことから、二酸化炭素が発生したことがわかった。

図3

図4

③ ②で燃えなかった、粉末Xと粉末Zについて、図5のように、加熱前の粉末とよく冷やした加熱後の粉末を0.5gずつ、それぞれ水5cm³にとかし、水へのとけ方を調べた。表2は、それらの結果をまとめたものである。

表2

	加熱前の粉末X	粉末Xの加熱後の粉末	加熱前の粉末Z	粉末Zの加熱後の粉末
水へのとけ方	とけ残った	すべてとけた	すべてとけた	すべてとけた

問1 亜鉛、鉄、チタンは、すべて金属である。金属に共通した性質として、誤っているものはどれか、次のア～エから1つ選び、その記号を書きなさい。

- ア 磁石に引きつけられる。イ 電気をよく通す。
 ウ みがくと特有の光沢がでる。エ 熱をよく伝える。

問2 ①について、次の(a)、(b)の各問いに答えなさい。

(a) 固体の体積は、メスシリンダーを用いてどのようにはかればよいか、その方法を「固体」、「メスシリンダー」という2つの言葉を使って、簡単に書きなさい。

(b) 表3は、亜鉛、鉄、チタンの密度を表している。固体A～Cは、それぞれどの物質と考えられるか、最も適当な組み合わせを次のア～カから1つ選び、その記号を書きなさい。

表3

	亜鉛	鉄	チタン
密度 [g/cm ³]	7.13	7.87	4.54

- ア A—亜鉛 B—鉄 C—チタン イ A—亜鉛 B—チタン C—鉄
 ウ A—鉄 B—亜鉛 C—チタン エ A—鉄 B—チタン C—亜鉛
 オ A—チタン B—亜鉛 C—鉄 カ A—チタン B—鉄 C—亜鉛

問3 ②について、次の(a)、(b)の各問いに答えなさい。

(a) 二酸化炭素が発生したことがわかったのは、石灰水がどのように変化したからか、簡単に書きなさい。

(b) 粉末Yのように、炎を出して燃えて、水や二酸化炭素が発生する物質を何というか、その名称を書きなさい。

問4 ③について、加熱前の粉末Xと粉末Xの加熱後の粉末を比べると、水へのとけ方にちがいがみられることから、粉末Xが加熱によって別の物質に変化したことがわかる。粉末Xの加熱後の粉末は何か、その名称を書きなさい。

問5 ②と③の結果から、粉末X～Zは、それぞれどの物質と考えられるか、最も適当な組み合わせを次のア～カから1つ選び、その記号を書きなさい。

- ア X—砂糖 Y—食塩 Z—炭酸水素ナトリウム
 イ X—砂糖 Y—炭酸水素ナトリウム Z—食塩
 ウ X—食塩 Y—砂糖 Z—炭酸水素ナトリウム
 エ X—食塩 Y—炭酸水素ナトリウム Z—砂糖
 オ X—炭酸水素ナトリウム Y—砂糖 Z—食塩
 カ X—炭酸水素ナトリウム Y—食塩 Z—砂糖

問1	
問2	(a)
	(b)
問3	(a)
	(b)
問4	
問5	

問1	ア	
問2	(a)	固体を水の入ったメスシリンダーに入れる前と入れた後の液面の差を読みとる。
	(b)	ウ
問3	(a)	白くにごったから。
	(b)	有機物
問4	炭酸ナトリウム	
問5	オ	

問1 磁石に引きつけられるのは、鉄など一部の金属だけに見られる性質である。

問2 (a) メスシリンダーに水を入れて、物体を入れる前後の液面の差を読み取ればよい。

(b) 固体Aの密度は、 $\frac{47.22 \text{ [g]}}{6.0 \text{ [cm}^3\text{]}}=7.87 \text{ [g/cm}^3\text{]}$ なので鉄。同様に、固体Bの密度は 7.13 g/cm^3

なので亜鉛。固体Cの密度は 4.54 g/cm^3 なのでチタン。

問3 (a) 二酸化炭素は石灰水を白くにごらせる。

(b) 炎を出して燃焼した結果、水と二酸化炭素が発生する物質を、有機物という。

問4 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水が生じる。

問5 粉末Xは、問4から炭酸水素ナトリウム。粉末Yは有機物なので砂糖である。

【過去問 31】

太郎さんと花子さんは、理科の授業で先生が準備した4種類の白い粉末状の物質を区別する実験を行いました。後の問1から問5に答えなさい。

(滋賀県 2015 年度)

先生

4種類の白い粉末状の物質AからDを準備しました。物質は、食塩、砂糖、小麦粉、炭酸ナトリウムのいずれかです。今まで学習したことをいかして、4種類の白い粉末状の物質を区別してみましょう。

太郎さん

使用できる実験器具や薬品などは、図や表に書いてあるね。a危険な薬品もあるから、実験をするときは、注意しなければいけないね。

花子さん

どのようにして調べたらわかるのかな。

太郎さん

どれも同じような白い粉末状だから、見た目では区別できないね。

花子さん

加熱すれば、有機物と無機物に区別できるのではないかな。

太郎さん

水に入れたときのようすや、b水溶液が電流を通すかを調べることもできるね。

実験に使用できる実験器具や薬品など

表	図														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品など</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>食塩</td></tr> <tr><td>砂糖</td></tr> <tr><td>小麦粉</td></tr> <tr><td>炭酸ナトリウム</td></tr> <tr><td>石灰水</td></tr> <tr><td>うすい塩酸</td></tr> <tr><td>うすい水酸化ナトリウム水溶液</td></tr> <tr><td>フェノールフタレイン溶液</td></tr> <tr><td>ベネジクト溶液</td></tr> <tr><td>純粋な水</td></tr> <tr><td>マッチ</td></tr> <tr><td>保護めがね</td></tr> <tr><td>導線</td></tr> </tbody> </table>	薬品など	食塩	砂糖	小麦粉	炭酸ナトリウム	石灰水	うすい塩酸	うすい水酸化ナトリウム水溶液	フェノールフタレイン溶液	ベネジクト溶液	純粋な水	マッチ	保護めがね	導線	<p>ガスバーナー メスシリンダー 試験管 集気びん 三脚と金あみ</p> <p>薬さじ ビーカー 燃焼さじ ガラス棒 ガラス板</p> <p>電源装置 ステンレス皿 電流計 電極</p>
薬品など															
食塩															
砂糖															
小麦粉															
炭酸ナトリウム															
石灰水															
うすい塩酸															
うすい水酸化ナトリウム水溶液															
フェノールフタレイン溶液															
ベネジクト溶液															
純粋な水															
マッチ															
保護めがね															
導線															

問1 下線部 aについて、実験を安全に行うために注意しなければならないことを、具体的な理由とともに1つ書きなさい。

問2 太郎さんが下線部 bのように実験を計画したのは、水に溶けると電流を通す物質と通さない物質があると考えたからです。水に溶けたとき、電流を通す物質を何といいますか。書きなさい。

実験プリント

次は、太郎さんと花子さんが実験を行った結果をまとめたプリントの一部です。

白い粉末状の物質を区別しよう

〔目的〕 白い粉末状の物質AからDが、食塩、砂糖、小麦粉、炭酸ナトリウムのどれであるかを調べる。

〔方法〕

- ① 物質AからDを、それぞれステンレス皿にのせてガスバーナーで加熱し、物質のようすを調べた。
- ② 物質AからDを、それぞれ水に入れ、水への溶けやすさを調べた。また、それぞれの水溶液が電流を通すかを調べた。

〔結果〕

調べる方法	物質A	物質B	物質C	物質D
加熱したときのようす	こげて黒くなった	こげて黒くなった	変化なし	変化なし
水に入れたときのようす	溶けて透明になった	白くにごった	溶けて透明になった	溶けて透明になった
電流を通すかどうか	電流を通さなかった	電流を通さなかった	電流を通した	電流を通した

太郎さんと花子さんは、実験の結果について、話し合いました。

考察1

太郎さん：実験の結果から、物質A、Bは有機物、物質C、Dは無機物だということがわかったね。有機物は炭素を含む物質だから加熱するとこげて黒くなったんだね。

花子さん：でも、黒くなっただけで、炭素を含むと判断していいのかな。

太郎さん：c物質AとBが炭素を含むことを実験で確かめるには、どのような実験をすればよいだろう。

問3 考察1の下線部cについて、どのような実験を行えばよいですか。図と表の実験器具や薬品などを使い、次の条件1から条件3にしたがって書きなさい。

条件1 「それぞれの物質を」という書き出しに続けて書くこと。

条件2 図の実験器具の名称を3種類以上使って書くこと。

条件3 60字以上、120字以内で書くこと。(書き出しの字数を含みます。)

考察2

花子さん：d実験の結果から、物質Aが砂糖で物質Bが小麦粉とわかるよ。

太郎さん：そうだね。でも物質CとDはまだ区別できないね。どんな実験をすれば区別できるかな。

花子さん：eいろいろな方法があると思うな。

問4 考察2の下線部dについて、実験の結果から物質Aが砂糖、物質Bが小麦粉とわかったのはなぜですか。理由を書きなさい。

問5 考察2の下線部 e の1つとして, それぞれの水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えて区別する方法を考えました。その実験の結果について正しく説明しているのはどれですか。下のアからエまでの中から1つ選びなさい。

- ア 食塩水は中性なので赤色になり, 炭酸ナトリウム水溶液はアルカリ性なので変化しない。
- イ 炭酸ナトリウム水溶液は中性なので赤色になり, 食塩水はアルカリ性なので変化しない。
- ウ 食塩水はアルカリ性なので赤色になり, 炭酸ナトリウム水溶液は中性なので変化しない。
- エ 炭酸ナトリウム水溶液はアルカリ性なので赤色になり, 食塩水は中性なので変化しない。

問1	
問2	
問3	それぞれの物質を
問4	
問5	

問1	例 毒性のある物質もあるので, 味を調べることはしないようにする。
問2	電解質
問3	それぞれの物質を 燃焼さじにのせガスバーナーで加熱する。火がついたら石灰水を入れた集気びんに入れ, ガラス板でふたをする。火が消えたら燃焼さじを取り出し, 集気びんにふたをしてよく振り, 石灰水が白くにごるかどうかを調べる。 (108 字)
問4	例 Aは水に溶けたことと, 有機物であることから砂糖とわかり, Bは水に入れると白くにごることから小麦粉とわかるから。
問5	エ

問1 有毒な物質であるおそれがあるので, 固体や液体の味を調べたり, 気体のにおいを直接かいだりしてはいけません。

問2 水に溶けたとき, その水溶液が電流を通す物質を電解質, 通さない物質を非電解質という。

2.物質のすがた(気体・水溶液・状態変化ほか)2015 年度

- 問3 物質が炭素を含むことを確かめるには、加熱して燃焼したあとに二酸化炭素が発生しているかを調べればよい。
- 問4 **〔結果〕**のうち、「水に入れたときのようす」から判断する。小麦粉は水に溶けにくいので白くにごるが、砂糖は水に溶けて透明になる。
- 問5 フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色になる。炭酸ナトリウム水溶液はアルカリ性。

【過去問 32】

再結晶によって物質X・Yの混合物から純粋な物質を得るために、次の〈実験〉を行った。これについて、下の問1・問2に答えよ。ただし、〈実験〉において、水の蒸発は考えないものとし、物質X・Yを同じ水にとかしても、それぞれの物質の、100gの水にとける質量と水溶液の温度の関係は変化しないものとする。

(京都府 2015 年度)

〈実験〉 ビーカーに水 100 g を入れ、その水に物質 X 10 g と物質 Y 70 g の混合物を加えてかき混ぜながら加熱し、混合物をすべてとかして 50℃ の水溶液をつくる。その後、この水溶液をゆっくりと 10℃ まで冷やす。この冷やした水溶液をろ過し、水溶液から出てきた結晶とろ液に分ける。

問1 物質X・Yそれぞれの、100gの水にとける質量と水溶液の温度の関係を表した右のグラフから考えて、〈実験〉で水溶液を50℃から10℃に冷やしたとき、水溶液から出てくる結晶について述べたものとして、最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から1つ選べ。

- (ア) およそ 7 g の物質 X の結晶が水溶液から出てくる。
- (イ) およそ 17 g の物質 X の結晶が水溶液から出てくる。
- (ウ) およそ 49 g の物質 Y の結晶が水溶液から出てくる。
- (エ) およそ 65 g の物質 Y の結晶が水溶液から出てくる。

問2 この〈実験〉での、ろ液に含まれる物質について述べたものとして、最も適当なものを、次の i 群(ア)～(エ)から1つ選べ。また、ろ過の基本操作を模式的に表したものとして、最も適当なものを、下の ii 群(カ)～(ケ)から1つ選べ。

- i 群 (ア) 物質Xも物質Yも含まれない。 (イ) 物質Xのみ含まれる。
 (ウ) 物質Yのみ含まれる。 (エ) 物質Xと物質Yが含まれる。

- ii 群 (カ) (キ) (ク) (ケ)

問1			
問2	i 群		ii 群

問1	ウ		
問2	i 群	エ	ii 群
			ク

問1 物質Xは10 g, 物質Yは70 g とけている。10℃における溶解度は, グラフより, 物質Xはおよそ17 g, 物質Yはおよそ21 g である。よって物質Xは結晶が出てこない。物質Yはおよそ $70 \text{ [g]} - 21 \text{ [g]} = 49 \text{ [g]}$ の結晶が出てくる。

問2 問1より, 物質Xはおよそ10 g, 物質Yはおよそ21 g がろ液に含まれている。また, ろ過の基本操作として注意する点は, 液はガラス棒を伝わせて注ぐことと, ろうとのあしをビーカーの内壁につけることである。

【過去問 33】

右図は、液体中に入れたガラス球の浮き沈みによって、おおよその気温が分かる「温度計」である。Wさんは、この「温度計」に興味をもち、ガラス球の浮き沈みに関係する力である浮力と、この「温度計」について調べ、**実験**を行った。さらに、この「温度計」のしくみを具体的に考察した。あとの問いに答えなさい。なお、この問題では、大気圧の大きさは常に一定であるとする。

(大阪府 2015 年度)

【Wさんが調べたこと】

a. 浮力について

液体中に入れた物体にはたらく浮力の大きさは、物体の体積によって決まり、物体の重さにはよらない。図 I のように、直方体の形をした物体を上面と下面が水平になるようにして液体中に入れた場合、物体の上面には図 I 中に ① で示された矢印の向きに液体から力がはたらき、物体の下面には図 I 中に ② で示された矢印の向きに液体から力がはたらく。これらの力の合力が浮力となる。

図 I 中の物体の上面と下面のそれぞれに液体からはたらく力の大きさは、大気圧と液体による圧力、面の面積を用いて次の式で求められる。

$$\text{力の大きさ [N]} = (\text{大気圧} + \text{液体による圧力}) [\text{Pa}] \times \text{面の面積} [\text{m}^2]$$

また、ある深さでの液体による圧力は、その深さより上にある液体の重さが大きいほど大きくなる。そのため、図 I 中の液体による圧力は液体の密度が一定であれば液面からの深さに比例し、深さと圧力の関係は、図 II のように表される。

以上のことから、図 I 中の物体の下面にはたらく力の大きさは、上面にはたらく力の大きさより大きくなり、浮力が発生することが分かる。

b. 「温度計」について

- この「温度計」は、ガラスでできた円筒形の容器の中に液体が入れられ、その液体中に、それぞれ異なる温度が記されたいくつかのガラス球が入れられている。
- 部屋に置かれている「温度計」の中の液体の温度は、部屋の気温と等しくなっていると考えてよい。これは、部屋の空気と「温度計」が接触しており、③接触によって温度の高い部分から温度の低い部分へと熱が移動するためである。
- 容器の中の液体はその温度が上昇すると、体積が増加する。一方、温度の変化によるガラス球の体積の変化は、無視できるくらい小さい。
- いずれのガラス球も、液体の温度がガラス球に記された温度と等しくなったときに、重力と浮力が釣り合うように、体積や重さが調整されている。

問2 Wさんが調べたことの中の下線部③に書かれているような熱の伝わり方は何と呼ばれているか。

問2	
----	--

問2	伝導
----	----

問2 接触による熱の伝わり方を伝導という。

【過去問 34】

液体の性質に関する次の問いに答えなさい。

(兵庫県 2015 年度)

問1 エタノール、水、食用油の性質を調べるために、次の(a)~(e)の手順で実験を行った。ただし、それぞれの液体の温度は20℃とする。

〈実験1〉

- (a) 電子てんびんにのせたメスシリンダーで、エタノール 20.0 g をはかりとる。
 (b) エタノール 20.0 g の体積をメスシリンダーの目盛から読みとる。
 (c) 水、食用油についても、それぞれ(a), (b)の手順で同様に行う。
 (d) エタノールに水を加え、しばらく放置し、観察する。
 (e) 別にはかりとったエタノールと食用油、水と食用油についても、それぞれ(d)と同じ操作を行う。

- (1) 表1は、手順(b), (c)の結果をまとめたものである。エタノールの密度は何 g/cm³か、四捨五入して小数第2位まで求めなさい。

表1

液体の種類	エタノール	水	食用油
液体 20.0 g の体積 [cm ³]	25.4	20.0	21.8

- (2) 手順(d), (e)において、エタノールと水は混ざり合ったが、水と食用油、エタノールと食用油はそれぞれ混ざり合わずに2層に分かれた。エタノール、水、食用油、それぞれ 20.0 g を1つの 100mL のビーカーに静かに入れ、これらを3層に分けたいとき、どの順に液体を注げばよいか、適切なものを、次のア~カから2つ選んで、その符号を書きなさい。ただし、器具は使用しないものとする。

- ア 水、エタノール、食用油の順に注ぐ。 イ 水、食用油、エタノールの順に注ぐ。
 ウ エタノール、食用油、水の順に注ぐ。 エ エタノール、水、食用油の順に注ぐ。
 オ 食用油、水、エタノールの順に注ぐ。 カ 食用油、エタノール、水の順に注ぐ。

問2 物質が水にとけるようすを調べるために、次の(a)~(f)の手順で実験を行った。表2は100 gの水にとける物質の質量の限度と水の温度の関係を表したものである。

〈実験2〉

- (a) ビーカーA, B, C, Dにそれぞれ80℃の水 200 g を入れ、Aには塩化ナトリウム、Bには硝酸カリウム、Cにはミョウバン、Dには砂糖をそれぞれ75.0 g とかす。
 (b) ビーカーA, B, C, Dの水溶液をゆっくり20℃まで冷やす。

表2

物質	水の温度[℃]			
	20	40	60	80
塩化ナトリウム [g]	35.8	36.3	37.1	38.0
硝酸カリウム [g]	31.6	63.9	109.2	168.8
ミョウバン [g]	11.4	23.8	57.4	321.6
砂糖 [g]	203.9	238.1	287.3	362.1

- (c) 結晶が出てきたビーカーは、水溶液をろ過し、結晶をとり出す。
 (d) とり出した結晶を乾燥させ、質量をはかる。
 (e) とり出した結晶を葉さじで少量とり、スライドガラスの上のせ、ルーペや顕微鏡で観察する。
 (f) 冷やしても結晶が出てこないビーカーは、ガラス棒で水溶液を1滴スライドガラスにとり、水を蒸発させ、ルーペや顕微鏡で観察する。

(1) ろ過の方法として適切なものを、次のア～カから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(2) 手順(d)において、ビーカーA～Dのうち、出てきた結晶の質量が最も大きいビーカーはどれか、A～Dから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(3) 手順(c), (d)において、ビーカーBについて調べた。

- ① 出てきた結晶の質量は何gか、小数第1位まで求めなさい。
- ② このときの水溶液の質量パーセント濃度は何%か、四捨五入して小数第1位まで求めなさい。

図

(4) 手順(e), (f)において、図のような結晶が見られたビーカーはどれか、A～Dから1つ選んで、その符号を書きなさい。

(5) 実験2について説明した文として適切なものを、次のア～エから1つ選んで、その符号を書きなさい。

ア ビーカーAとDの結晶をとり出すとき、どちらの水溶液も、加熱して水を蒸発させる方法より、冷やす方法のほうが適している。

イ ビーカーBとCの結晶を観察したとき、ビーカーBの結晶は青色、ビーカーCの結晶は無色であり、形だけでなく色でも区別できる。

ウ ビーカーBとDの水溶液を20℃まで冷やしたときの質量パーセント濃度は、ビーカーDのほうが大きい。

エ ビーカーBとCの水溶液を20℃まで冷やす途中の40℃の段階では、どちらの水溶液からも結晶は出てこない。

問 1	(1)	g/cm ³		
	(2)			
問 2	(1)			
	(2)			
	(3)	①	g	
		②	%	
	(4)			
(5)				

問 1	(1)	0.79 g/cm ³		
	(2)	イ, オ		
問 2	(1)	カ		
	(2)	C		
	(3)	①	11.8 g	
		②	24.0 %	
	(4)	B		
(5)	ウ			

問 1 (1) $\frac{20 \text{ [g]}}{25.6 \text{ [cm}^3\text{]}}=0.787... \text{ [g/cm}^3\text{]}$

(2) 水の密度は 1.0 g/cm³, 食用油の密度は約 0.92 g/cm³ である。3層に分けるには、密度の大きいものから順に注げばよい。または、食用油、水の順に注ぐと、密度の大きい水が下層に、食用油が上層になるので、最後に注いだエタノールが最上層になる。

問 2 (1) 液体はガラス棒に沿って流し込む。また、ろうとのあしの長いほうをビーカーの壁につける。

(2) 20℃での溶解度が最も小さいミョウバンをろ過すると、最も大きな質量の結晶が得られる。

(3) ① 80℃の水 200 g に、硝酸カリウムは 168.8 [g] × 2 = 337.6 [g] までとくすことできるので、硝酸カリウム 75.0 g はすべてとける。この水溶液を 20℃まで冷やすと、31.6 [g] × 2 = 63.2 [g] しかとけなくなるので、出てきた結晶の質量は、75.0 [g] - 63.2 [g] = 11.8 [g]

② $\frac{63.2 \text{ [g]}}{63.2 \text{ [g]} + 200 \text{ [g]}} \times 100 = 24.01... \text{ [%]}$

(4) 図のような針状、または柱状に見えるのは、硝酸カリウムの結晶である。

(5) 80℃ではどの水溶液も 75.0 g ずつ溶質がとけているので、20℃での溶解度が大きいものほど質量パーセント濃度が大きい。

【過去問 35】

うすい塩酸を使って、次の2つの実験を行った。下の問いに答えなさい。

(和歌山県 2015 年度)

実験 I

- (i) 図1のように、三角フラスコに石灰石とうすい塩酸を加えて気体を発生させ、はじめに出てきた気体を試験管2本分捨てた。
- (ii) その後、発生している気体を試験管に集め、水中でゴム栓をしてとり出した。
- (iii) (ii)の試験管のゴム栓をとってから石灰水を加え、再びゴム栓をして、よく振ると白くにごった。

図1

実験 II

- (i) うすい水酸化ナトリウム水溶液 10cm³ をビーカーに入れた。
- (ii) 図2のように、こまごめピペットを使ってうすい塩酸 1 cm³ を加えた。よくかき混ぜた後、pHメーターでその水溶液のpHを調べた。
- (iii) (ii)の操作をくり返し、加えたうすい塩酸の体積の合計が 10cm³ になったとき、pHの値は 7.0 になり水溶液は中性になった。

図2

問1 実験Iについて、次の(1)～(3)に答えなさい。

- (1) 図1のような気体の集め方を何というか、書きなさい。
- (2) はじめに出てきた気体を捨てたのはなぜか、その理由を簡潔に書きなさい。
- (3) (iii)の結果より、発生した気体は何か、その名称を書きなさい。

問2 実験IIについて、次の(1)～(3)に答えなさい。

- (1) こまごめピペットの正しい使い方を示したものを、次のア～エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

問 1	(1)	
	(2)	
	(3)	
問 2	(1)	

問 1	(1)	水上置換
	(2)	はじめに出てくる気体には、三角フラスコの中にあつた空気が多く混ざっているから。
	(3)	二酸化炭素
問 2	(1)	エ

問 1 (1) 水を用いて気体を集める方法を、水上置換という。

(2) 実験開始前、三角フラスコの中は空気で満たされているので、はじめに出てきた気体は空気である。

(3) 石灰水を白くにごらせる気体は二酸化炭素である。

問 2 (1) こまごめピペットは、片手だけでガラス部とゴム球の両方をにぎるようにして持つ。

【過去問 36】

次の問いに答えなさい。

(島根県 2015 年度)

問2 図1のように、物質は温度により姿を変える。これについて、下の1, 2に答えなさい。

- 1 図1のように、温度により物質の姿が変わることを何というか、その名称を漢字で答えなさい。
- 2 次の文は、水が氷に変化するときの、体積と密度について説明したものである。文中の①, ②にあてはまる語の組み合わせとして最も適当なものを、下のア～エから一つ選んで記号で答えなさい。

水が氷に変化するとき、体積が (①) になるので、密度は (②) なる。

	①	②
ア	小さく	小さく
イ	小さく	大きく
ウ	大きく	小さく
エ	大きく	大きく

問2	1	
	2	

問2	1	状態変化
	2	ウ

問2 1 温度により物質の姿が変わることを、状態変化という。

2 水が氷に変化するとき、質量は変化しないが体積は大きくなる。質量は同じで体積が大きくなると、密度は小さくなる。

【過去問 37】

次の問いに答えなさい。

(広島県 2015 年度)

- 問1 塩化ナトリウム4 gが入った試験管A,硝酸カリウム4 gが入った試験管Bがあります。試験管A・Bに、次のⅠ～Ⅲの操作をしました。表は、その結果を示したものです。これについて、あとの(1)～(3)に答えなさい。

【操作】

- Ⅰ 試験管A・Bにそれぞれ水5 cm³を加え、よく振り混ぜて、全部溶けるかどうかを調べる。
 Ⅱ Ⅰの操作をした試験管A・Bを約60℃の湯に入れて加熱し、しばらくおいてから試験管A・Bを取り出し、よく振り混ぜて、全部溶けるかどうかを調べる。
 Ⅲ Ⅱの操作をした試験管A・Bを水に入れて冷やし、中の様子を調べる。

【結果】

	操作Ⅰ	操作Ⅱ	操作Ⅲ
試験管A	全部は溶けなかった	加熱する前とほとんど変わらなかった	冷やす前とほとんど変わらなかった
試験管B	全部は溶けなかった	全部溶けた	固体が出てきた

- (1) 次の文章は、塩化ナトリウムや硝酸カリウムが水に溶けた液体について述べたものです。文章中の

①・②にあてはまる語をそれぞれ書きなさい。

この液体で、塩化ナトリウムや硝酸カリウムのように、水に溶けている物質を①という。また、水のように、①を溶かしている液体を②という。

- (3) 右の図は、塩化ナトリウムと硝酸カリウムの溶解度曲線を示したものです。次の①・②に答えなさい。

① 試験管Aの中の、操作Ⅰで溶け残った塩化ナトリウムの量が、操作Ⅱの後にも操作Ⅲの後もほとんど変わらなかったのはなぜですか。その理由を、「溶解度」の語を用いて簡潔に書きなさい。

② 操作Ⅲで、試験管Bの中の液体の温度が20℃になったとき、試験管Bの中に出てきた硝酸カリウムの固体の質量は何gだと考えられますか。次のア～エの中から適切なものを選び、その記号を書きなさい。

- ア 1.6 g イ 1.8 g
 ウ 2.4 g エ 3.9 g

問 1	(1)	①	
		②	
	(3)	①	
		②	

問 1	(1)	①	溶質
		②	溶媒
	(3)	①	塩化ナトリウムの溶解度が、温度によってほとんど変化しないため。
		②	ウ

問 1 (1) 水溶液において、水に溶けている物質を溶質、溶質を溶かしている液体を溶媒という。

(3) ① 塩化ナトリウムの溶解度は、水の温度にかかわらずほぼ一定である。

② 溶解度曲線より、硝酸カリウムは 100 g の水には 60℃で 108 g まで溶け、20℃では 32 g まで溶ける。

したがって、硝酸カリウムは、60℃の水 5 g には、 $108 \text{ [g]} \times \frac{5 \text{ [g]}}{100 \text{ [g]}} = 5.4 \text{ [g]}$ まで、

20℃の水 5 g には、 $32 \text{ [g]} \times \frac{5 \text{ [g]}}{100 \text{ [g]}} = 1.6 \text{ [g]}$ 溶ける。よって、 $4 \text{ [g]} - 1.6 \text{ [g]} = 2.4 \text{ [g]}$

が出てくる。

【過去問 38】

図1は、ミョウバン、硝酸カリウム、塩化ナトリウムについて、水の温度と溶解度の関係を表したグラフである。次の問1、問2に答えなさい。

(山口県 2015 年度)

問1 3つのビーカーに60℃の水を100gずつ用意し、次のA～Cの物質をそれぞれ溶かして飽和水溶液をつくった。これらの水溶液の温度を10℃まで下げたとき、ふたたび固体として得られる物質の質量が多い順に、A～Cの記号で答えなさい。

- A ミョウバン B 硝酸カリウム C 塩化ナトリウム

問2 水に一度溶かした物質を、溶解度の差を利用して、ふたたび固体としてとり出す操作を何というか。書きなさい。

問1	() → () → ()
問2	

問1	(B) → (A) → (C)
問2	再結晶

問1 60℃でのグラフの値と10℃でのグラフの値の差が大きいほど、ふたたび固体として出てくる物質の質量が多い。最も大きいのが硝酸カリウムで、ミョウバン、塩化ナトリウムの順になる。
 問2 水に溶かした物質を、溶解度の差を利用して、ふたたび固体としてとり出す操作を再結晶という。

【過去問 39】

次の問いに答えなさい。

(徳島県 2015 年度)

問4 図4は、温度を変化させたときの物質のようすを粒子のモデルで表したものである。このように、物質が温度によって固体、液体、気体とすがたを変えることを何というか、書きなさい。

問4	
----	--

問4	状態変化
----	------

問4 温度によって物質の状態が変わることを、状態変化という。

【過去問 40】

次の問いに答えなさい。

(香川県 2015 年度)

問1 水の状態変化やエネルギーの移り変わりについて調べるために、次の実験Ⅰ～Ⅲをした。これに関して、あとの(1)～(6)の問いに答えよ。

実験Ⅰ 右の図Ⅰのように、同じ質量の水と氷の体積の違いを調べる実験をした。はじめに、 100cm^3 用のメスシリンダーに食用油 50.0cm^3 をはかりとった。次に、氷を静かに入れて食用油の中に沈め、質量をはかり、氷がとける前の食用油の液面の高さのめもりを読むと 68.0cm^3 であった。

しばらく放置し、氷がすべてとけた後の食用油の液面の高さのめもりを読むと 66.5cm^3 であった。さらに、メスシリンダーの外側の水滴をよくふきとってから、再び質量をはかったところ、質量の変化はなかった。

(1) メスシリンダーのめもりを正しく読みとるために気をつけなければならないことは、メスシリンダーを安定した水平な台の上で使用することのほかにもいくつかある。それは何か。その一つを、簡単に書け。

(2) 実験Ⅰの結果から、同じ質量の水と氷の体積を比べたとき、氷の体積は水の体積の何倍になると考えられるか。小数第2位を四捨五入して、小数第1位まで答えよ。

実験Ⅱ 右の図Ⅱのような装置を組み立て、フラスコを加熱して水を沸騰させると、水蒸気がガラス管の先端から吹き出して、羽根車を回転させ、おもりがもち上がった。

(3) 次の文は、実験Ⅱにおける水の状態変化とエネルギーの移り変わりについて述べようとしたものである。文中の2つの〔 〕内にあてはまる言葉を、㉠、㉡から一つ、㉢～㉤から一つ、それぞれ選んで、その記号を書け。

水は水蒸気になるときに体積がいちじるしく〔㉠ 大きく ㉡ 小さく〕なる。

(4) 次の㉢～㉤のうち、物質の状態変化の例として誤っているものを2つ選んで、その記号を書け。

- ㉢ 鉄のかたまりを溶鉱炉内で熱すると、明るく光る高温の液体になった
- ㉣ ビーカーに入れておいたドライアイスが小さくなった
- ㉤ ケーキの生地に炭酸水素ナトリウムを加えて加熱するとふくらんだ
- ㉥ 皮膚につけた消毒用エタノールが、すぐに乾いて見えなくなった
- ㉦ 温めたミョウバンの飽和水溶液を室温まで冷やすと、固体のミョウバンが出てきた

問 1	(1)	
	(2)	倍
	(3)	
	(4)	と

問 1	(1)	例 液面を真横から水平に見るようにする。 液面の中央の平らな部分のメモリを読む。 最小メモリの $\frac{1}{10}$ まで目分量で読み取る。 などから一つ
	(2)	1.1 倍
	(3)	㊦
	(4)	㊵ と ㊴

問 1 (1) 液面を真横から水平に見るようにする, などがある。

(2) 氷の体積は $68.0 \text{ [cm}^3] - 50.0 \text{ [cm}^3] = 18.0 \text{ [cm}^3]$, 水の体積は $66.5 \text{ [cm}^3] - 50.0 \text{ [cm}^3] = 16.5 \text{ [cm}^3]$
だから, $\frac{18.0}{16.5} = 1.09\cdots$ [倍] より, 1.1 倍となる。

(3) 液体から気体へ状態が変わると体積はいちじるしく大きくなる。

(4) ㊵のケーキの生地がふくらむのは, 炭酸水素ナトリウムの熱分解(化学変化)によって起こることであり,
㊴の溶解度は温度によって決まっている。

【過去問 41】

次の問いに答えなさい。

(愛媛県 2015 年度)

問2 太郎さんのクラスでは、次のア～エの4種類の物質に関する実験1・2を行った。

ア 硝酸カリウム イ ミョウバン ウ 塩化ナトリウム エ ホウ酸

[実験1] 先生は、4種類の物質から選んだ物質Aを各班に配った。各班では異なる質量の物質Aをそれぞれ100gの水に入れ、水の温度を変えながら溶け方を調べた。

[実験2] 4種類の物質をそれぞれ100gの水に溶かして、70℃に保ちながら、飽和水溶液をつくった。この4種類の水溶液の温度を40℃まで下げると、4種類の水溶液全てから、それぞれの物質が結晶として出てきた。

表1は、実験1の結果をまとめたものである。また、図1は100gの水に溶ける物質の質量と温度との関係を表したものである。

- (1) 物質Aは何か。ア～エから適当なものを一つ選び、その記号を書け。
- (2) 下線部において、結晶として出てきた四つの物質を、出てきた物質の質量の大きい順に、ア～エの記号で左から書け。

表1

水の温度 物質A の質量	20℃	30℃	40℃
20 g	○	○	○
30 g	○	○	○
40 g	×	○	○
50 g	×	×	○
60 g	×	×	○

表中の○の記号は、その条件において物質が全て溶けたことを示す。×の記号は、その条件において物質の一部が溶け残ったことを示す。

図1

問2	(1)	
	(2) 質量の大きい順	

問2	(1)	ア
	(2) 質量の大きい順	イ, ア, エ, ウ

問2 (1) 表1と図1より、20℃で30gは溶けるが40gは溶けず、30℃で40gは溶けるが50gは溶けない物質Aは、硝酸カリウムである。

(2) 70℃と40℃での溶ける質量の差の大きいものから選ぶと、ミョウバン、硝酸カリウム、ホウ酸、塩化ナトリウムとなる。

【過去問 42】

次の問いに答えなさい。

(高知県 2015 年度 A)

問2 金属の性質を調べるために、アルミニウム、鉄、銅のいずれかでできた3種類の針金A、B、Cを使って、次の実験Ⅰ～Ⅲを行った。表はこの実験の結果をまとめたものである。このことについて、下の(1)～(3)の問いに答えよ。

実験Ⅰ 針金の表面を紙やすりでみがき、光をあてて、みがいた部分のようすを観察した。

実験Ⅱ 針金を磁石に近づけ、引きつけられるかどうかを調べた。

実験Ⅲ 電子天びんを使って、針金A、B、Cをそれぞれ15.0gずつはかりとった。次に、その針金A、B、Cをそれぞれ水の入ったメスシリンダーに完全に浸し、水面の位置の変化から針金A、B、Cの体積を測定した。

	実験Ⅰ	実験Ⅱ	実験Ⅲ	
			質量 [g]	体積 [cm ³]
針金A	銀色に輝いた	引きつけられた	15.0	2.0
針金B	赤色に輝いた	引きつけられなかった	15.0	1.6
針金C	銀色に輝いた	引きつけられなかった	15.0	5.5

- (1) 実験Ⅰで観察されたように、金属には、みがくと光を受けたときに輝くという共通の性質がある。この輝きを何というか、書け。
- (2) 実験の結果から、アルミニウムでできている針金はどれか、その記号を書け。
- (3) 針金A、B、Cを密度の小さいものから順に並べ、その記号を書け。

問2	(1)	
	(2)	
	(3)	

問2	(1)	金属光沢
	(2)	C
	(3)	C < A < B

- 問2 (1) 金属をみがくと、光を受けたときに輝くようになる。この輝きを金属光沢という。
- (2) アルミニウムは、みがくと銀色に輝く。また、磁石には引きつけられない。赤色に輝くのは銅である。
- (3) 質量が同じであれば、体積が大きいほど密度が小さい。よって、密度が小さい順に並べると、針金C、針金A、針金Bとなる。

【過去問 43】

まささんは、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜ合わせ、その混合溶液の性質を調べる次の実験を行った。
このことについて、下の問いに答えなさい。

(高知県 2015 年度 A)

実験 1%水酸化ナトリウム水溶液 50cm³に緑色のBTB溶液を数滴加えると、①水溶液の色が変化した。

次に、その水溶液に、ガラス棒をかき混ぜながら、こまごめピペットを用いて1%塩酸を少量ずつ加えていくと、やがて②水溶液の色が緑色になった。

問1 この実験で下線部①に「水溶液の色が変化した」とあるが、何色に変化したか。最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書け。

- ア 赤色 イ 青色 ウ 黄色 エ 紫色

問2 実験の操作において、こまごめピペットの持ち方として正しいものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書け。

問1	
問2	

問1	イ
問2	ア

問1 BTB溶液はアルカリ性では青色になる。

問2 ピペットの先は下に向けたままで、手の小指と薬指とでガラス部分をしっかりと持つ。

【過去問 44】

ろうそくに用いられているろうの性質を調べるために【実験1】、【実験2】を行った。問いに答えなさい。

(佐賀県 2015 年度 一般)

【実験1】

ろうの固体をビーカーに入れ、ガスバーナーで加熱して液体にした。その後、このビーカーを放置したところ、図1のようにろうが固体となり、ビーカーの中央に大きなくぼみができる。

図1

問1 ろうが液体から固体に変化したとき、質量と密度はそれぞれどう変化したか。最も適当なものを、それぞれ次のア～ウの中から一つ選び、記号を書きなさい。

- ア 大きくなった イ 変化しなかった ウ 小さくなった

問2 図2は、液体中のろうを構成している粒子のようすを、粒子のモデルを使って模式的に表したものである。ろうが液体から固体になるとき、ろうを構成する粒子のようすはどのように変化したか。最も適当なものを、下のア～エの中から一つ選び、記号を書きなさい。

図2 (液体のとき)

○は粒子を、→は粒子の運動のようすを表している。

<p>ア</p> <p>粒子の数が減少した。</p>	<p>イ</p> <p>粒子はその場にとどまるようになった。</p>	<p>ウ</p> <p>粒子の大きさが小さくなった。</p>	<p>エ</p> <p>すべての粒子が下に移動するように運動した。</p>
----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

【実験2】

図3のように、石灰水を入れた集気瓶にろうそくを立て、火をつけてふたをした。①しばらくすると火は消えた。その後、ふたを開けてろうそくを取り出し、再びふたをして集気瓶を振ったところ、

②石灰水が白く濁った。

次に、図4のように、ろうそくに火をつけ、その上に乾いたビーカーをかざしたところ、ビーカーの内側に液体が付着した。塩化コバルト紙にその液体をつけると、塩化コバルト紙の色が(a)から(b)に変化した。

図3

図4

問3 【実験2】の下線部①で、火が消えたのはなぜか。その理由を書きなさい。

問4 【実験2】の下線部②について、石灰水が白く濁ったものを数日間放置するとどうなるか。最も適当なものを、次のア～エの中から一つ選び、記号を書きなさい。

- ア 白い濁りは下方へ移動する。
- イ 白い濁りは上方へ移動する。
- ウ 白い濁りは中央へ移動する。
- エ 全体が白く濁ったまま変化しない。

問5 【実験2】の(a), (b)にあてはまる色として最も適当なものを、それぞれ次のア～オの中から一つ選び、記号を書きなさい。

- ア 白色 イ 赤色 ウ 緑色 エ 青色 オ 黄色

問7 次の文は、【実験1】、【実験2】で起こったろうの変化について述べたものである。文中の(①)～(④)にあてはまる語句の組み合わせとして最も適当なものを、下のア～エの中から一つ選び、記号を書きなさい。

【実験1】でろうが液体から固体になった変化は(①)変化であり、(②)が変わる。一方、【実験2】でろうが燃焼した変化は(③)変化であり、(④)が変わる。

	①	②	③	④
ア	化学	分子の集まり方	状態	原子の結びつく相手や結びつき方
イ	化学	原子の結びつく相手や結びつき方	状態	分子の集まり方
ウ	状態	分子の集まり方	化学	原子の結びつく相手や結びつき方
エ	状態	原子の結びつく相手や結びつき方	化学	分子の集まり方

問1	質量		密度	
問2				
問3				
問4				
問5	a		b	
問7				

問1	質量	イ	密度	ア
問2	イ			
問3	集気瓶の中の酸素が消費されたから。			
問4	ア			
問5	a	エ	b	イ
問7	ウ			

問1 状態変化では質量は変わらない。ただし、状態によって体積が変わるので密度が変わる。ろうの場合、液体から固体になるとき体積は小さくなるので、密度は大きくなる。

問2 固体の場合の粒子はほとんど動かなくなる。

問3 集気瓶のふたをしめたことで、容器内の酸素がなくなり火が消える。

問4 石灰水が白くにごるのは、水にとけない炭酸カルシウムができるからで、しばらく放置すると沈殿する。

問5 塩化コバルト紙は、水に反応して青色から赤色に変化する。

問7 ろうが液体から固体になるのは状態変化。ろうを燃やして二酸化炭素と水になるのは化学変化である。状態変化は分子の集まり方のちがいであり、化学変化は原子の結びつく相手や結びつき方が違っている。

【過去問 45】

次の問いに答えなさい。

(佐賀県 2015 年度 特色)

問2 表2は、3種類の気体A～Cの性質について示したものである。これらの気体を集める方法の組み合わせとして最も適当なものを、下のア～エの中から一つ選び、記号を書きなさい。ただし、空気(20℃のとき)1Lの質量を1.2gとする。

表2

気体	A	B	C
密度 [g/L] (20℃のとき)	0.08	3.00	0.72
水に対する溶けやすさ	溶けにくい	溶けやすい	非常に溶けやすい

	A	B	C
ア	水上置換法	下方置換法	上方置換法
イ	水上置換法	上方置換法	下方置換法
ウ	上方置換法	下方置換法	下方置換法
エ	上方置換法	上方置換法	上方置換法

問2	
----	--

問2	ア
----	---

問2 水に溶けにくいものは、水上置換法で集める。水にとけやすい気体については、空気より重いものは下方置換法で、空気より軽いものは上方置換法で集める。

【過去問 46】

次の I の問いに答えなさい。

(長崎県 2015 年度)

I 金属は①たたくと広がる性質や引っ張るとのびる性質など共通した性質をもつが、同じ温度であれば密度は金属の種類によってちがう値を示す。図1の純粋な白金、銀、鉛、鉄の固まりについて体積と質量を20℃で測定すると、図2の結果が得られた。

図1

図2

問1 下線部①以外で金属に共通する特徴的な性質を1つ答えよ。

問2 図3の金属Mは、純粋な白金、銀、鉛、鉄のいずれかでできた固まりである。その質量と体積を20℃で測定すると、質量が23.62 g、体積が3.0 cm³であった。この金属Mは次のどれか。

図3

ア 白金 イ 銀 ウ 鉛 エ 鉄

問1	
問2	

問1	金属光沢がある。 など
問2	エ

問1 金属に特徴的な性質として、展性・延性・電気伝導性・熱伝導性・金属光沢があげられる。

問2 金属Mの密度は、 $\frac{23.62 \text{ [g]}}{3.0 \text{ [cm}^3\text{]}} = 7.87 \dots \text{ [g/cm}^3\text{]}$ 同様にしてそれぞれの金属の密度を求めると、

白金は21.5 g/cm³、銀は10.5 g/cm³、鉛は11.5 g/cm³、鉄は7.9 g/cm³で、金属Mは鉄とわかる。

【過去問 47】

裕太君たちは、**図 I**のように、ホットケーキの材料に重そう(炭酸水素ナトリウム)が入っていることを知り、興味をもった。次の文は、**図 I**の材料で、ホットケーキをつくった裕太君たちの会話である。後の問いに答えなさい。

(宮崎県 2015 年度)

裕太： 焼きあがったホットケーキは、ふっくらとふくらんでいるね。断面を見ると、小さな穴がたくさんあいているよ。

千秋： 穴をつくるもとになっている物質は、重そうだと思うよ。重そうは炭酸水素ナトリウムの別名で、これを入れないと、ふくらまないからね。

理奈： 炭酸水素ナトリウムを加熱したときに、何か、気体が発生して穴があいたのかな。

裕太： 化学式を調べれば、発生する気体を予想できるかな。

千秋： 予想をたててから、実験(実験 I)をして調べようよ。

理奈： 気体が発生する以外に、変化が起こるかどうか調べようね。

図 I

ホットケーキの材料

小麦粉 卵
砂糖 牛乳
重そう

問 1 炭酸水素ナトリウムの化学式を調べたところ、 NaHCO_3 であることがわかった。裕太君たちは、化学式をもとに、発生する気体を次のように予想して**実験 I**を行った。下の(1)～(3)の問いに答えなさい。

〔裕太君たちの予想〕

裕太： Hがふくまれているから、水素が発生すると思う。

千秋： Oがふくまれているから、酸素が発生すると思う。

理奈： CとOがふくまれているから、発生するのは二酸化炭素だと思う。

〔実験 I〕

- ① 炭酸水素ナトリウム 3.0 g を乾いた試験管に入れ、**図 II**のような装置を組み立てて加熱した。
- ② はじめに出てくる気体を試験管 1 本分捨ててから、発生した気体を 3 本の試験管に集め、ゴム栓をした。
- ③ 気体が発生しなくなるまで加熱した後、ガラス管を水そうからぬいてから、加熱をやめた。
- ④ 気体を集めた 1 本目の試験管に、**図 III**のように火のついた線香を入れた。
- ⑤ 2 本目の試験管に、**図 IV**のように火のついたマッチを近づけた。
- ⑥ 3 本目の試験管に石灰水を入れ、ふたたびゴム栓をしてよく振った。
- ⑦ 加熱後の試験管のようすを観察した。

図 II

炭酸水素
ナトリウム 3.0g

図 III 図 IV

(1) 実験Ⅰの①で、ガスバーナーに火をつけたとき、炎が図Ⅴのようになった。 図Ⅴ

ガスの量は変えずに、適正な青い炎に調節するにはどうしたらよいか。次のア～エから適切なものを1つ選び、記号で答えなさい。

- ア Aを押さえて、Bをa方向に動かし、空気の量をふやす。
- イ Aを押さえて、Bをb方向に動かし、空気の量を減らす。
- ウ Bを押さえて、Aをa方向に動かし、空気の量をふやす。
- エ Bを押さえて、Aをb方向に動かし、空気の量を減らす。

(3) 実験Ⅰの⑦で、加熱した試験管の口には液体がついていた。そこで、図 図Ⅵ

Ⅵのように、裕太君がある試験紙を使って調べた結果、その液体は、水であることがわかった。裕太君が使った試験紙は何か、答えなさい。

問2 裕太君たちは、実験Ⅰの後、加熱後の試験管に残った白い物質と、もとの炭酸水素ナトリウムの性質のちがいを調べるために、実験Ⅱを行い、結果を表Ⅰにまとめた。また、後の文は、実験Ⅱを終えた裕太君たちの会話である。後の(1)、(2)の問いに答えなさい。

[実験Ⅱ]

- ① 2本の試験管A、Bに水を5.0cm³ずつとり、Aには炭酸水素ナトリウムを、Bには加熱後の白い物質をそれぞれ1.0gずつ入れて、よく振り混ぜ、とけ方のちがいを調べた。
- ② 図Ⅶのように、それぞれの試験管にフェノールフタレイン溶液を1、2滴加え、色の変化を調べた。

表Ⅰ

	試験管A	試験管B
水へのとけ方	少しとけた。	よくとけた。
フェノールフタレイン溶液との反応	うすい赤色になった。	濃い赤色になった。

裕太： 炭酸水素ナトリウムと加熱後の白い物質では、とけ方がちがっていたね。

千秋： フェノールフタレイン溶液との反応から、加熱後の白い物質の水溶液は、炭酸水素ナトリウム水溶液より強い 性を示すことがわかったよ。

理奈： 先生、この物質は何という物質ですか。

先生： 炭酸ナトリウムという物質ですよ。

(1) 下線部における炭酸水素ナトリウムのように、溶液中にとけている物質を何といいますか。

問4 物質によって水へのとけ方が異なることに興味をもった裕太君は、次に、水にとける物質の質量と温度との関係について調べるために、硝酸カリウムを用いて、次のような**実験Ⅲ**を行った。表Ⅲをもとに、下の(1)、(2)の問いに答えなさい。ただし、水の密度は、 1.0 g/cm^3 とする。

〔実験Ⅲ〕

- ① ビーカーに 10°C の水を 50.0 cm^3 とり、硝酸カリウムを 25.0 g 入れて、ゆっくりかき混ぜながら加熱し、水溶液の温度を 40°C まで上げて、とける量がふえるかどうかを調べた。
- ② ①の水溶液の温度を 60°C まで上げ、さらに硝酸カリウムを加えて、飽和水溶液をつくった。
- ③ 図Ⅷのように、②のビーカーを水で冷やして、中のようすを観察した。

図Ⅷ

表Ⅲ 100 gの水にとける硝酸カリウムの質量

水の温度 $[\text{C}]$	0	20	40	60
質量 $[\text{g}]$	13.3	31.6	63.9	109.2

(1) **実験Ⅲ**の①において、 40°C のときの水溶液の質量パーセント濃度を求めなさい。ただし、答えは、小数第2位を四捨五入して求めなさい。

(2) **実験Ⅲ**の③において、水溶液の温度を 60°C から 20°C まで下げたとき、何gの硝酸カリウムの結晶をとり出すことができるか、求めなさい。

問1	(1)	
	(3)	
問2	(1)	
問4	(1)	%
	(2)	g

問1	(1)	ウ
	(3)	塩化コバルト紙
問2	(1)	溶質
問4	(1)	33.3 %
	(2)	38.8 g

問1 (1) 炎の色がオレンジ色になっているときは、空気が不足しているので、ガス調節ねじ(B)を押さえて空気調節ねじ(A)をa方向に動かし、空気の量をふやして青色の炎にする。

(3) 水の有無を調べる試験紙は塩化コバルト紙で、水につけると青色から赤色になる。

問2 (1) 溶液中にとけている物質を溶質といい、溶質をとかしている液体を溶媒という。

問4 (1) 表Ⅲより、 40°C の水100gに硝酸カリウムは63.9gまで溶ける。水の密度は 1.0 g/cm^3 なので、 50 cm^3 の水の質量は50gである。50gの水には、硝酸カリウムは $63.9 \times \frac{50 [\text{g}]}{100 [\text{g}]} = 31.95 [\text{g}]$ までとけるので、25.0

gはすべてとける。したがって、 $\frac{25.0 \text{ [g]}}{25 \text{ [g]} + 50 \text{ [g]}} \times 100 = 33.3 \dots \text{ [%]}$

(2) 60°Cの水 50 gを用いてつくった硝酸カリウムの飽和水溶液には、 $109.2 \text{ [g]} \times \frac{50 \text{ [g]}}{100 \text{ [g]}} = 54.6 \text{ [g]}$ の硝酸カリウムがとけている。20°Cの水 50 gには $31.6 \text{ [g]} \times \frac{50 \text{ [g]}}{100 \text{ [g]}} = 15.8 \text{ [g]}$ しかとけないので、結晶として出てくる硝酸カリウムの質量は、 $54.6 \text{ [g]} - 15.8 \text{ [g]} = 38.8 \text{ [g]}$

【過去問 48】

次の問いに答えなさい。答えを選ぶ問いについては記号で答えなさい。

(鹿児島県 2015 年度)

問5 図は、火をつけた直後のガスバーナーのようすである。ガスバーナーの炎を、ガスの量は変えずに空気の量を多くして適正な青い炎にするためには、どのようにすればよいか。

図

- ア 調節ねじ a をおさえて、調節ねじ b を X の方向に回す。
- イ 調節ねじ a をおさえて、調節ねじ b を Y の方向に回す。
- ウ 調節ねじ b をおさえて、調節ねじ a を X の方向に回す。
- エ 調節ねじ b をおさえて、調節ねじ a を Y の方向に回す。

問5	
----	--

問5	エ
----	---

問5 空気の量を多くするには、ガス調節ねじ(調節ねじ b)をおさえながら、空気調節ねじ(調節ねじ a)を Y の方向に回す。

【過去問 49】

次の問1, 問2に答えなさい。答えを選ぶ問いについては記号で答えなさい。

(鹿児島県 2015 年度)

問1 図1のように、石灰石にうすい塩酸を加え二酸化炭素を発生させ、ペットボトルを集めた。

二酸化炭素の量がペットボトルの半分ぐらいになったところでふたをし、水そうからとり出した。とり出したペットボトルを激しく振ると図2のようにつぶれた。

2 図1のような気体の集め方を何というか。

3 図2のペットボトルから水を取り、ビーカーに入れた石灰水に加えると、石灰水は白くにごった。次に、図1の水そうから水を取り、別のビーカーに入れた石灰水に加えると、石灰水は白くにごらなかった。

- (1) ペットボトルからとった水を加えた石灰水が白くにごったのはなぜか。
- (2) 水そうからとった水を石灰水に加えたのはなぜか。

問2 ある濃度のうすい塩酸と、ある濃度のうすい水酸化ナトリウム水溶液を使って、次の実験を行った。

実験1 うすい塩酸 20cm^3 をビーカーにとり、BTB溶液を数滴加えた。次に、図1のように、うすい水酸化ナトリウム水溶液をこまごめピペットで少しずつ加えていったところ、 30cm^3 を加えたところで水溶液が中性になった。さらに、その水溶液にうすい水酸化ナトリウム水溶液 30cm^3 を加えた。

実験2 うすい塩酸 20cm^3 をビーカーにとり、うすい水酸化ナトリウム水溶液 30cm^3 を加え、 50cm^3 の水溶液Aを得た。次に、水溶液Aの水を完全に蒸発させたところ、白い物質が 1.4g 得られた。

1 うすい塩酸にBTB溶液を加えたときの色は何色か。

4 水溶液Aの質量パーセント濃度は何%か。小数第1位まで答えよ。ただし、水溶液Aの密度を $1.02\text{g}/\text{cm}^3$ とする。また、解答は答えだけでなく、考え方や計算過程も書くこと。

図2

問 1	2		
	3	(1)	
		(2)	
問 2	1		
	4	答 _____ %	

問 1	2	水上置換法	
	3	(1)	ペットボトルの水に二酸化炭素が溶けているため。
		(2)	水そうの水には、石灰水を白くにごらせる物質がふくまれていないことを証明するため。
問 2	1	黄色	
	4	水溶液Aの質量は、 $50 \times 1.02 = 51$ [g] よって $1.4 \div 51 \times 100 = 2.74\dots$ 答 <u>2.7</u> %	

問 1 2 水中で気体を集める方法を、水上置換法という。

3 (1) 白くにごったのは、ペットボトルの中に二酸化炭素がとけ込んだためである。

(2) 水そうからとった水を石灰水に加えて白くにごらなければ、水そうの水には石灰水を白くにごらせる物質が入っていないことを確認することができる。

問 2 1 酸性の水溶液にBTB溶液を入れると、水溶液は黄色になる。

4 水溶液Aの質量は、 $50 \text{ [cm}^3\text{]} \times 1.02 \text{ [g/cm}^3\text{]} = 51 \text{ [g]}$ この中に白い物質が1.4gあったので、質量パーセント濃度は、 $\frac{1.4 \text{ [g]}}{51 \text{ [g]}} \times 100 = 2.7 \text{ [%]}$

【過去問 50】

酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせると水溶液の性質はどうなるのか調べるために、〈実験Ⅰ〉および〈実験Ⅱ〉を行った。次の問いに答えなさい。

(沖縄県 2015 年度)

〈実験Ⅰ〉

3つのビーカーに濃度の異なる塩酸が 10cm^3 入っている。それぞれ、塩酸A、塩酸B、塩酸Cとする。図1のようにBTB溶液を数滴加えた後、ガラス棒でよくかき混ぜながら、うすい水酸化ナトリウム水溶液を1滴ずつ加えていった。表1はビーカー内の水溶液が中性になるまでに加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積である。

表1 中性になるまでに加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積

	塩酸A	塩酸B	塩酸C
加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積 [cm^3]	6	10	4

図1

問1 うすい水酸化ナトリウム水溶液を加えるために、こまごめピペットを用いた。その持ち方として、もっとも適当なものを次のア～エから1つ選んで記号で答えなさい。

問1

問1

ウ

問1 ピペットの先は下に向けたままで、左手の小指と薬指でガラス部分をしっかりと持つ。