【過去問 1】

次の問いに答えなさい。

(北海道 2023 年度)

問2 長さ3 cm のばねを引く力の大きさとばねののびとの関係を調べたところ、図のようになった。このばねを0.4Nの力で引くと、ばねの長さは何 cm になるか、書きなさい。

問2	cm
----	----

問2	9 cm
----	------

問2 図から、このばねを0.2Nの力で引くと3 cm のびることがわかるので、0.4Nの力で引くと6 cm のびる。力を加えていないときのばねの長さが3 cm なので、0.4Nの力で引いたときのばねの長さは、 $3 + 6 = 9$ cm となる。

【過去問 2】

次の問いに答えなさい。

(北海道 2023 年度)

凸レンズによってできる像について調べるため、LEDをL字形にとりつけた物体を使って図1のような装置を組み立て、次の実験1～3を行った。

実験1 凸レンズAの位置を動かさずに、スクリーンにはっきりとした像がうつるように物体とスクリーンの位置を動かし、像の大きさを調べた。図2、3はこのときの結果をグラフに表したものである。

実験2 物体とスクリーンの位置を動かさずに、凸レンズAを物体側からスクリーン側に近づけていったところ、物体から凸レンズAまでの距離が15cmのときと30cmのときにスクリーンにはっきりとした像がうつった。

実験3 物体を凸レンズAとその焦点の間に置き、スクリーン側から凸レンズAをのぞいたときの像の大きさを調べた。次に、物体と凸レンズAの位置を動かさずに、凸レンズAをふくらみの小さい凸レンズBにかえ、同じように像の大きさを調べると、凸レンズAのときに比べ、小さくなった。

問2 実験1について、次の(1)、(2)に答えなさい。

- (1) 図5は、実験1で物体から凸レンズAを通る光の進み方の一部を模式的に示したものであり、光軸(凸レンズAの軸)上にある2つの●は凸レンズAの焦点の位置を示している。物体の先端から出た光は、凸レンズAを通過後、どのような道すじを通るか、解答欄の図にかき加えなさい。ただし、作図に用いた線は消さないこと。

- (2) 凸レンズAの焦点距離と物体の大きさはそれぞれ何cmと考えられるか、書きなさい。

問3 実験1, 2について、次の文の①～③に当てはまる数値を、それぞれ書きなさい。また、④に当てはまる内容を書きなさい。

スクリーン上にはっきりとした像を見ることができる、物体、凸レンズA、スクリーンの位置について考えると、物体から凸レンズAまでの距離が15cmのときは凸レンズAからスクリーンまでの距離は①cm、物体から凸レンズAまでの距離が30cmのときは凸レンズAからスクリーンまでの距離は②cmであり、物体からスクリーンまでの距離はどちらも③cmである。したがって、物体からスクリーンまでの距離が一定のとき、実像ができる凸レンズの位置は2つあり、④という規則性があることがわかる。

問4 実験3について、凸レンズBをふくらみの限りなく小さい凸レンズにとりかえたとしても、像の大きさはどのようになると考えられるか、書きなさい。

問2	(1)		
	(2)	焦点距離	cm
		大きさ	cm
問3	①		
	②		
	③		
	④		
問4			

問2	(1)		
	(2)	焦点距離	10 cm
		大きさ	3 cm
問3	①	30	
	②	15	
	③	45	
	④	例 物体から凸レンズまでの距離と凸レンズからスクリーンまでの距離が入れかわる	
問4	例 物体とほぼ同じ大きさになる。		

問2 (3) 凸レンズを通った光

- ・焦点を通った光…光軸（凸レンズの軸）に平行に進む
- ・凸レンズの中心を通った光…そのまま直進する
- ・光軸（凸レンズの軸）に平行な光…焦点を通る

物体の先端から出た光について考えると、図の①のように、光軸に対して平行に進み凸レンズAに入った光は、屈折して焦点を通るように進む。②のように、凸レンズAの中心を通った光は、そのまま直進する。③のように、凸レンズの手前の焦点を通過して凸レンズAに入った光は、屈折して光軸に対して平行に進む。この①～③の光が交わる点に、物体の先端の像ができる。図5の矢印のように進んだ光も、凸レンズAで屈折した後は、この像ができる点を通る。

(2) 凸レンズの焦点距離とできる実像の大きさ、位置の関係

- ・焦点距離の2倍の位置に物体がある → 焦点距離の2倍の位置のスクリーンに、物体と同じ大きさの実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置よりも遠くに物体がある → 焦点距離とその2倍の位置の間にあるスクリーンに、物体よりも小さな実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置と焦点距離の間に物体がある → 焦点距離の2倍の位置よりも遠くにあるスクリーンに、物体よりも大きな実像ができる

物体から凸レンズAまでの距離と、凸レンズAからスクリーンまでの距離が等しく、ともに焦点距離の2倍になっているとき、物体と同じ大きさの像ができる。図2で、物体から凸レンズAまでの距離が20cmのとき、凸レンズAからスクリーンまでの距離も20cmになっていることがわかる。よって、焦点距離は $20 \div 2 = 10\text{cm}$ である。図3より、物体から凸レンズAまでの距離が20cmのときの像の大きさは3cmであることがわかる。

問4 実験3で、凸レンズAをふくらみの小さい凸レンズBにかえると、凸レンズを通して見える虚像は小さくな

ったことから、ふくらみの小さい凸レンズを使うほど、虚像は小さくなると考えられる。ただし、凸レンズを通して見える虚像は、実像よりも大きい。よって、ふくらみの限りなく小さい凸レンズを使うと、像の大きさは、限りなく物体と同じ大きさに近づいていくと考えられる。

【過去問 3】

凸レンズによってできる像について調べるために、下の**実験 1**、**2**を行った。次の**問 1**、**問 2**に答えなさい。

(青森県 2023 年度)

実験 1 図1のように、光学台の上に物体（アルファベットの「L」の文字を記した方眼紙）、凸レンズを直線上に並べた。物体が凸レンズの焦点よりも内側にあるとき、凸レンズを通して物体を見ると文字の像が見えた。

図 1

実験 2 図2のように、光学台の上に方眼付きの半透明のスクリーンを加えて、直線上に並べた。物体は固定し、スクリーンに文字の像がはっきりとうつるように、凸レンズとスクリーンを光学台上でそれぞれ動かした。図3は、物体を表したもので、方眼の1目盛りは1cmであり、物体の中心は●で示している。物体から凸レンズまでの距離と、物体からスクリーンまでの距離、物体の文字の高さと比べた像の高さをそれぞれ測定すると、次の表ようになった。

図 2

図 3

物体から凸レンズまでの距離[cm]	28	30	36	40	()	60	70
物体からスクリーンまでの距離[cm]	98	90	81	80	81	90	98
物体の文字の高さと比べた像の高さ[倍]	2.50	2.00	1.25	1.00	0.80	0.50	0.40

ただし、物体、凸レンズ、スクリーンは光学台に対して垂直であり、それぞれの中心は、光学台に平行な凸レンズの軸上に並んでいるものとする。

問 1 **実験 1**について、次の**ア**、**イ**に答えなさい。

ア 下線部のとき、凸レンズを通して見える像を何というか、書きなさい。

イ 図1において、凸レンズを物体に少しずつ近づけていくと、凸レンズを通して見える文字の像はどのようなになるか。適切なものを、次の**1**～**4**の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

- 1 少しずつ大きくなり、やがて実際の文字より大きく見える。
- 2 少しずつ小さくなり、やがて実際の文字より小さく見える。
- 3 少しずつ大きくなるが、実際の文字より大きく見えることはない。
- 4 少しずつ小さくなるが、実際の文字より小さく見えることはない。

問2 実験2について、次のア～ウに答えなさい。

ア 用いた凸レンズの焦点距離として適切なものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

- 1 15cm 2 20cm 3 30cm 4 40cm

イ 表の()に入る適切な数値を書きなさい。

スクリーン

ウ 物体から凸レンズまでの距離が30cmのとき、スクリーンにうつった文字の像をかきなさい。ただし、スクリーンの方眼の1目盛りは1cmであり、スクリーンの中心は●で示しているものとする。

問1	ア	
	イ	
問2	ア	
	イ	
	ウ	

問1	ア	虚像
	イ	4
問2	ア	2
	イ	45
	ウ	

問1 物体が凸レンズの焦点よりも内側にあるとき、凸レンズを通して見る事ができる像を虚像という。凸レンズを通して見える虚像は、常に実物より大きい。右の図の a の位置に実物を置くと a' の位置に大きな虚像ができ、b の位置に実物を置くと b' の位置に虚像ができる。凸レンズを物体に近づけていくとできる虚像はしだいに小さくなるが、実物より小さくなることはない。

問2 ア 凸レンズの焦点距離とできる実像の大きさ、位置の関係

- ・焦点距離の2倍の位置に物体がある → 焦点距離の2倍の位置のスクリーンに、物体と同じ大きさの実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置よりも遠くに物体がある → 焦点距離の2倍の位置と焦点の間にあるスクリーンに、物体よりも小さな実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置と焦点の間に物体がある → 焦点距離の2倍の位置よりも遠くにあるスクリーンに、物体よりも大きな実像ができる

表より、物体から凸レンズまでの距離が 40cm のとき、物体からスクリーンまでの距離が 80cm になっていることがわかる。このとき、凸レンズからスクリーンまでの距離は $80 - 40 = 40\text{cm}$ となり、物体から凸レンズまでの距離と、凸レンズからスクリーンまでの距離が等しくなっていることがわかる。また、このとき物体の文字の高さと比べた像の高さが 1.00 倍になっており、物体と実像の大きさが同じであるとわかる。よって、この 40cm が焦点距離の2倍であるとわかるから、焦点距離は $40 \div 2 = 20\text{cm}$ である。

イ 物体から凸レンズまでの距離、凸レンズからスクリーンまでの距離、凸レンズからスクリーンまでの距離を物体から凸レンズまでの距離で割った値、物体の文字の高さと比べた像の高さをまとめると、次の表のようになる。

物体から凸レンズまでの距離 [cm]	28	30	36	40	()	60	70
凸レンズからスクリーンまでの距離 [cm]	70	60	45	40	—	30	28
凸レンズからスクリーンまでの距離を物体から凸レンズまでの距離で割った値	2.50	2.00	1.25	1.00	—	0.50	0.40
物体の文字の高さと比べた像の高さ [倍]	2.50	2.00	1.25	1.00	0.80	0.50	0.40

この表から、凸レンズからスクリーンまでの距離を物体から凸レンズまでの距離で割った値と、物体の文字の高さと比べた像の高さは一致していることがわかる。

よって、物体の文字の高さと比べた像の高さが 0.80 倍のとき、物体から凸レンズまでの距離を $x\text{cm}$ とすると、凸レンズからスクリーンまでの距離は $(81 - x)\text{cm}$ と表せるので、 $1.00 : 0.80 = x : (81 - x)$ が成り立ち、 $x = 45\text{cm}$ と求められる。

ウ スクリーンにうつる実像は、実物とは上下左右の向きが反対になる。また、表より、物体から凸レンズまでの距離が 30cm のとき、物体の文字の高さと比べた像の高さは 2.00 倍になっている。このとき、文字の高さ(右の図の l と l')だけでなく、文字の幅 (m と m') や、スクリーンの中心から文字のふちまでの距離 (n と n') も同様に 2.00 倍になる。

【過去問 4】

次の問いに答えなさい。

(岩手県 2023 年度)

問5 右の図のようなモノコードで、ことじとXの間で弦の中央をはじいて音を出しました。次のア～エのうち、このモノコードで音の大きさを変えずに、より低い音を出す方法として正しいものはどれですか。一つ選び、その記号を書きなさい。

- ア ことじの位置を変えずに、弱く弦をはじく。
- イ ことじの位置を変えずに、強く弦をはじく。
- ウ ことじの位置を右にずらし、同じ強さで弦をはじく。
- エ ことじの位置を左にずらし、同じ強さで弦をはじく。

問5	
----	--

問5	エ
----	---

問5 振動する弦が長くなるほど音は低くなる。また、同じ強さで弦をはじくと音の大きさは同じになる。

【過去問 5】

時計の歴史について調べ、次のような資料にまとめました。これについて、あとの問いに答えなさい。

(岩手県 2023 年度)

資料			
	時計	年代	説明
①	日時計	紀元前4,000年ころ	棒や石の柱が地面につくる影の位置や長さで時刻をはかった。
②	水時計	紀元前1,400年ころ	容器から水を流し、容器内の水の量で時間をはかった。
③	燃焼時計	6世紀ころ	ろうそくやランプを燃やして時間をはかった。
④	砂時計	14世紀ころ	船の上で時間をはかる手段として使われた。砂や大理石の細かい粒を使用することがあった。
⑤	振り子時計	16世紀ころ	振り子を使うことにより、時計の精度は飛躍的に向上した。
⑥	花時計	18世紀中ごろ	植物学者のリンネが、ほぼ定まった時刻に花が開閉するのを見て時計のかわりになると考えた。
⑦	クォーツ時計	20世紀前半	水晶を用いて、非常に正確な時計が開発された。
⑧	炭素時計	20世紀中ごろ	炭素に含まれる放射性物質により生物の生存した年代を調べた。

問2 ②について、水時計のしくみを調べるため、図Ⅱのようにペットボトルで模型をつくり、水を入れて下の穴から水を出し、一定時間ごとに水面の高さを示す線をかきました。次のア～ウのうち、かいた線の間隔として最も適当なものはどれですか。一つ選び、その記号を書きなさい。また、そのようになる理由を、水の量にふれながら簡単に書きなさい。

問2	記号	
	理由	

問2	記号	イ
	理由	例 水が多いときは圧力が大きく、水が少なくなると圧力が小さくなるから。

問2 水が多いときは穴の位置にかかる圧力が大きいので、水が勢いよく出るため、一定時間ごとの水の減少量は

大きくなる。水が少なくなると圧力が小さくなるので、水が出る勢いは弱くなり、一定時間ごとの水の減少量は小さくなる。

【過去問 6】

物体にはたらく力について調べるために、次の**実験 1**、**2**を行った。表は、実験結果のうち、ばねののびを示したものである。あとの問いに答えなさい。ただし、ばねののびは、ばねを引く力の大きさに比例するものとし、糸はのび縮みせず、質量と体積は無視できるものとする。また、質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。

(山形県 2023 年度)

【実験 1】 図 1 のように、ばねに糸と質量 50 g のおもりをつるし、おもりを静止させ、ばねののびを調べた。

【実験 2】 実験 1 と同じばね、糸、おもりを用いて、図 2 のような装置を組み、おもりが容器の底につかないようにおもりを水中に完全に沈めて静止させ、ばねののびと電子てんびんが示す値を調べた。

問 2 **実験 2**において、水中のおもりにはたらく重力の大きさは何Nか、求めなさい。

問 3 **実験 2**において、おもりを水中に完全に沈めたときに、水中のおもりにはたらく浮力の大きさは何Nか。最も適切なものを、次の**ア～オ**から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 0.04N イ 0.06N ウ 0.08N エ 0.10N オ 0.12N

問 4 **実験 2**において、おもりを水中に入れる前と水中に完全に沈めたあとの電子てんびんが示す値を比べたとき、値の関係を述べた文として適切なものを、次の**ア～ウ**から一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 水中に沈めたあとのほうが、大きい。 イ 水中に沈めたあとのほうが、小さい。 ウ 等しい。

問 2	N
問 3	
問 4	

問 2	0.5 N
問 3	イ
問 4	ア

問 2 100 g の物体にはたらく重力は 1 N なので、50 g のおもりには 0.5 N の重力がはたらく。おもりにはたらく重力の大きさは水中でも一定である。

問 3 表より、ばねを 0.5 N の力で引いたときののびは 17.5 cm であることがわかる。また、おもりを水中に完全に沈めたとき、ばねののびは 15.4 cm になっている。このときばねが下向きに引かれている力は、

$0.5\text{N} \times \frac{15.4}{17.5} = 0.44\text{N}$ である。よって、おもりにはたらく浮力は、 $0.5 - 0.44 = 0.06\text{N}$ である。

問4 おもりを水中に沈めると、おもりにはたらく浮力の大きさと同じだけ、電子てんびんが示す値は大きくなる。

【過去問 7】

光の進み方と凸レンズのはたらきを調べるために、**図1**のような装置を組み、次の**実験1**、**2**を行った。なお、物体は、透明なシートに**L**の文字を書いたものである。あとの問いに答えなさい。

(山形県 2023 年度)

【実験1】

- ① 光学台上に白熱電球と物体を固定し、物体から20cm離れた位置に凸レンズを置いたあと、光源である白熱電球を点灯した。
- ② スクリーンの位置を調整して、物体の像がスクリーンにはっきりとうつったとき、凸レンズとスクリーンとの距離をはかり、記録した。
- ③ ①の凸レンズの位置を、物体から5cmずつ遠ざけ、②と同様のことをそれぞれ行った。

グラフは**実験1**の結果を表している。

【実験2】

実験1と同じ装置を用いて光源を点灯し、スクリーンに物体の像をはっきりとうつしたあと、凸レンズの上側半分を黒いシートでおおって、光を通さないようにした。このとき、スクリーンにうつった像を観察した。

問1 **実験1**について、使用した凸レンズの焦点距離は何cmか、書きなさい。

図1

グラフ

問2 **実験1**について、スクリーンに像をはっきりとうつしているとき、物体側から観察したスクリーンの像として最も適切なものを、次の**ア**~**エ**から一つ選び、記号で答えなさい。

ア

イ

ウ

エ

問3 実験1について、図2は、スクリーンに物体の像がはっきりとうつついているときの模式図であり、物体上の点Pから出た光の道すじのうち、2本をX、Yで表している。光の道すじX、Yの、スクリーンまでの道すじを、それぞれ図2にかきなさい。ただし、光の進む方向は、凸レンズの中心線で変わるものとし、図2中の点Fは凸レンズの焦点である。

図2

問4 実験2について、凸レンズの上側半分を黒いシートでおおったときにスクリーンにうつった像は、黒いシートでおおう前にうつった像と比べてどのように変化したか、簡潔に書きなさい。

問1	cm
問2	
問3	<p>図2</p>
問4	

問1	15 cm
問2	エ
問3	<p>図2</p>
問4	<p>例</p> <p>像の全体が暗くなった。</p>

問1 凸レンズの焦点距離とできる実像の大きさ、位置の関係

- ・焦点距離の2倍の位置に物体がある → 焦点距離の2倍の位置のスクリーンに、物体と同じ大きさの実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置よりも遠くに物体がある → 焦点と焦点距離の2倍の位置の間にあるスクリーンに、物体よりも小さな実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置と焦点の間に物体がある → 焦点距離の2倍の位置よりも遠くにあるスクリーンに、物体よりも大きな実像ができる

グラフから、物体と凸レンズとの距離が30cmのとき、凸レンズとスクリーンとの距離も30cmになっていることがわかる。よって、これが焦点距離の2倍の位置であるから、焦点距離は、 $30 \div 2 = 15\text{cm}$ と求められる。

問2 スクリーンにうつる実像は、実物とは上下左右の向きが反対になる。

問3 凸レンズを通った光

- ・焦点を通った光…凸レンズの軸（光軸）に平行に進む
- ・凸レンズの中心を通った光…そのまま直進する
- ・凸レンズの軸に平行な光…焦点を通る

凸レンズの軸に平行なYの光は、右の図のように、凸レンズで屈折した後、凸レンズの反対側にある焦点Fを通る。この光がスクリーンに達した点をQとすると、Xの光も凸レンズで屈折した後、点Qに届く。こうして光が集まり、スクリーン上に像ができる。

問4 凸レンズの上半分をおおうと、凸レンズに入る光の量が減るので、像の全体は暗くなる。このとき、像の形は変化しない。

【過去問 8】

次の実験について、問1～問4に答えなさい。

(福島県 2023 年度)

実験1

図1のように、光学台上に、光源、フィルター（アルファベットのFの形をくりぬいたもの）、凸レンズ、スクリーンを一直線上に設置した。

はじめに、フィルターと凸レンズとの距離を 12cm にして、スクリーンを動かしてはっきりとした像がうつるようにし、そのときの凸レンズとスクリーンとの距離および像の大きさを調べた。次に、フィルターと凸レンズとの距離を 15cm, 20cm, 30cm, 60cm と変えて、それぞれスクリーンにはっきりとした像がうつるようにしたときの、凸レンズとスクリーンとの距離および像の大きさを調べた。

結果

フィルターと凸レンズとの距離[cm]	12	15	20	30	60
凸レンズとスクリーンとの距離[cm]	60	30	X	15	12
フィルターの大きさに対する像の大きさ	Y		同じ	Z	

図1

実験2

図2のように、フィルターの上半分を黒い紙でおおってから、図3のように、実験1で使用した装置を使い、スクリーンにうつる像を調べた。

図2

図3

問1 下線部について、**実験1**でスクリーンにうつった像を何というか。漢字2字で書きなさい。

問2 焦点を通る光が凸レンズに入射したとき、光はどのように進むか。そのときの光の道筋を模式的に表したものと最も適当なものを、次のア～エの中から1つ選びなさい。

問3 実験1について、次の①、②の問いに答えなさい。

- ① この凸レンズの焦点距離は何 cm か。求めなさい。
- ② X～Zにあてはまる数値とことばの組み合わせとして正しいものを、右のア～カの中から1つ選びなさい。

	X	Y	Z
ア	20	大きい	小さい
イ	20	小さい	大きい
ウ	22.5	大きい	小さい
エ	22.5	小さい	大きい
オ	25	大きい	小さい
カ	25	小さい	大きい

問4 実験2について、光源側からスクリーンを見たとき、スクリーンにうつった像として最も適当なものを、次のア～カの中から1つ選びなさい。

問1		
問2		
問3	①	cm
	②	
問4		

問1	実像	
問2	イ	
問3	①	10 cm
	②	ア
問4	カ	

問1 実験1のようにスクリーン上に光が集まってできる像を実像という。なお、虫眼鏡を通してものを拡大して見るときのような見かけの像を虚像という。

問2 凸レンズを通った光

- ・焦点を通った光…凸レンズの軸（光軸）に平行に進む
- ・凸レンズの中心を通った光…そのまま直進する
- ・凸レンズの軸に平行な光…焦点を通る

焦点を通過して凸レンズに入った光は、屈折して凸レンズの軸に平行に進むので、イのようになる。

問3 凸レンズの焦点距離とできる実像の大きさ、位置の関係

- ・焦点距離の2倍の位置に物体がある → 焦点距離の2倍の位置のスクリーンに、物体と同じ大きさの実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置よりも遠くに物体がある → 焦点と焦点距離の2倍の位置の間にあるスクリーンに、物体よりも小さな実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置と焦点の間に物体がある → 焦点距離の2倍の位置よりも遠くにあるスクリーンに、物体よりも大きな実像ができる

実験1の結果より、フィルターの大きさに対する像の大きさが同じになる20cmが、焦点距離の2倍の距離である。つまり、焦点距離は $20 \div 2 = 10\text{cm}$ である。Xはフィルターと凸レンズとの距離と同じで、焦点距離の2倍である20cmとなる。Yは、フィルターと凸レンズとの距離が焦点距離の2倍と焦点距離の間で、凸レンズとスクリーンとの距離が焦点距離の2倍よりも大きいときの像の大きさなので、フィルターよりも大きい。Zは、フィルターと凸レンズとの距離が焦点距離の2倍よりも大きく、凸レンズとスクリーンとの距離が焦点距離の2倍と焦点距離の間でのときの像の大きさなので、フィルターよりも小さい。

問4 フィルターの上半分を黒い紙でおおっているので、光源から出てフィルターの下半分を通った光だけが凸レンズに入る。よって、できる実像はフィルターの下半分の形になり、向きは上下左右が逆となる。

【過去問 9】

太郎さんは光の進み方について調べるために、白い半透明の紙と黒い2つの角筒を用いて図1のような形をした装置を製作した。装置の外側の角筒の片面には小さな穴がけられている。また、内側の角筒の片面には白い半透明の紙が貼られ、これがスクリーンの役割をしている。図1の矢印の方向から内側の角筒をのぞき込むことで、小さな穴を通過した光がスクリーンに映る様子を観察することができる。この装置を使って、太郎さんは実験を行った。

図1

問1～問4に答えなさい。

(茨城県 2023 年度)

《実験》

太郎さんがこの装置を机上有る花に向けて、内側の角筒をのぞき込んだところ、白い半透明の紙(スクリーン)上に像がうすく映っているところが見られた。

次に、太郎さんは装置の外側の角筒の片面にけられている穴を広げ、図2のように穴のところに凸レンズを取りつけた。この装置を用いて机上有る花を観察するために、内側の角筒と外側の角筒を重ねた状態から外側の角筒を固定し、内側の角筒を引き出すように引いた。はじめはスクリーン上にはっきりとした像は見られなかったが、ある位置まで内側の角筒を引くと、スクリーン上にはっきりと像が見えるようになった。このとき角筒を引くことをやめた。

問1 スクリーン上にはっきりと見えた像のことを何と
いうか、書きなさい。

図2

問2 次の文は、凸レンズを装着することでスクリーン上にはっきりと像が見えるようになった理由について述べたものである。文中の , に当てはまる語句の組み合わせとして最も適切なものを、あとのア～エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

凸レンズを装着することでスクリーン上にはっきりと像が見えるようになったのは、光の という性質によって、物体の表面ではね返った光がレンズを通過した後、 からである。

	あ	い
ア	屈折	1点に向かって進むようになった
イ	屈折	広がって進むようになった
ウ	全反射	1点に向かって進むようになった
エ	全反射	広がって進むようになった

問3 図3は、スクリーンにはっきりと像ができたときの花と凸レンズを模式的に表したものである。花は矢印を用いて模式的に表されていて、凸レンズの焦点は点 F_1 、点 F_2 に存在している。また、スクリーンは省略されている。

花の上部の点 Q ではね返った光のうち、凸レンズの軸（光軸）に平行に進み凸レンズに入った光と、凸レンズの中心を通る光は、それぞれどのように進むか。2つの光の道すじを、それぞれ実線で作図しなさい。同様に、スクリーン上に見える像についても矢印を用いて正しい位置に作図しなさい。ただし、スクリーンは解答用紙にかかなくてよい。また、像を求めるためにかいた線は消さなくてよい。

図3

問4 図4は、太郎さんが装置を用いて花を観察している様子を表したものである。太郎さんから見てスクリーンに映る花の像の見え方は、どのようになるか。最も適切なものを、次のア～エの中から1つ選んで、その記号を書きなさい。

図4

問1	
問2	
問3	
問4	

問1	実像
問2	ア
問3	
問4	ア

問3 凸レンズを通った光の進み方

- ・焦点を通った光…凸レンズの軸（光軸）に平行に進む
- ・凸レンズの中心を通った光…そのまま直進する
- ・凸レンズの軸（光軸）に平行な光…焦点を通る

点Qで反射された光のうち、凸レンズの軸（光軸）に平行に進み凸レンズに入った光は、凸レンズで屈折した後、 F_2 を通るように進む。凸レンズの中心を通る光は、そのまま直進する。この2つの光が交わった点が、点Qの像ができる位置である。このとき、花の像は図のように、実物の半分の大きさになる。

問4 スクリーンには、上下左右が反対になった実像が映る。これを太郎さんの位置から見るとアのようになる。

【過去問 10】

ユウさんとアキさんは、音の性質について調べるために、次の**実験(1)**、**(2)**を行った。

- (1) 図1のようなモノコードで、弦のPQ間の中央をはじいて音を発生させた。発生した音を、マイクとコンピュータで測定すると図2の波形が得られた。図2の横軸は時間を表し、1目盛りは200分の1秒である。縦軸は振動の振れ幅を表している。なお、砂ぶくろの重さにより弦の張り具合を変えることができる。
- (2) 砂ぶくろの重さ、弦の太さ、弦のPQ間の長さと言の高さの関係を調べるために、モノコードの条件を表の条件A、B、C、Dに変え、**実験(1)**と同様に**実験**を行った。なお、砂ぶくろIより砂ぶくろIIの方が重い。また、弦Iと弦IIは同じ材質でできているが、弦Iより弦IIの方が太い。

図1

図2

表

	砂ぶくろ	弦	弦のPQ間の長さ
条件A	砂ぶくろI	弦I	40cm
条件B	砂ぶくろI	弦I	80cm
条件C	砂ぶくろII	弦I	40cm
条件D	砂ぶくろI	弦II	40cm

このことについて、次の問1、問2、問3、問4に答えなさい。

(栃木県 2023 年度)

問1 次の 内の文は、弦をはじいてから音がマイクに伝わるまでの現象を説明したものである。() に当てはまる語を書きなさい。

弦をはじくと、モノコードの振動が () を振動させ、その振動により音が波としてマイクに伝わる。

問2 **実験(1)**で測定した音の振動数は何 Hz か。

問3 **実験(2)**で、砂ぶくろの重さと音の高さの関係、弦の太さと音の高さの関係、弦のPQ間の長さと言の高さの関係を調べるためには、それぞれの条件とどの条件を比べるとよいか。条件A、B、C、Dのうちから適切な組み合わせを記号で答えなさい。

問4 次の□内は、実験(2)を終えてからのユウさんとアキさんの会話である。①、②に当てはまる語句をそれぞれ()の中から選んで書きなさい。また、下線部のように弦をはじく強さを強くして実験を行ったときに、コンピュータで得られる波形は、弦をはじく強さを強くする前と比べてどのように変化するか簡潔に書きなさい。

<p>ユウ 「弦をはじいて発生する音の-highさは、砂ぶくろの重さや弦の太さ、弦の長さが関係していることがわかったね。」</p> <p>アキ 「そうだね。例えば、図2の波形を図3のようにするには、それぞれどのように変えたらよいだろう。」</p> <p>ユウ 「実験結果から考えると、砂ぶくろを軽くするか、弦を①(太く・細く)するか、弦のPQ間の長さを②(長く・短く)すればよいことがわかるよ。」</p> <p>アキ 「ところで、<u>弦をはじく強さを強くしたとき</u>はどのような波形が得られるのかな。」</p> <p>ユウ 「どのような波形になるか、確認してみよう。」</p>	<p>図3</p>
---	--

問1				
問2	Hz			
問3	砂ぶくろの重さと音の高さの関係	条件 () と条件 ()		
	弦の太さと音の高さの関係	条件 () と条件 ()		
	弦のPQ間の長さ と音の高さの関係	条件 () と条件 ()		
問4	①		②	
	波形の変化			

問1	空気			
問2	100 Hz			
問3	砂ぶくろの重さと音の高さの関係	条件 (A) と条件 (C)		
	弦の太さと音の高さの関係	条件 (A) と条件 (D)		
	弦のPQ間の長さ と音の高さの関係	条件 (A) と条件 (B)		
問4	①	太く	②	長く
	波形の変化		例 縦軸の振動の振れ幅が大きくなる。	

問1 音が空気を伝わる時、空気の振動が次々と伝わっていく。

問2 この音は $\frac{1}{100}$ 秒で1回振動しているため、振動数は、 $1 \div \frac{1}{100} = 100\text{Hz}$

問3 調べたい条件だけが異なり、それ以外の条件は同じになっているものを比べればよい。砂ぶくろの重さだけが異なるのはAとC、弦の太さだけが異なるのはAとD、弦のPQ間の長さだけが異なるのはAとBである。

問4 図3の波形は図2の波形よりも振動数が少ないので、音は低い。また、振幅は同じなので音の大きさは同じである。弦を太くするか、弦の振動する部分を長くすると、音は低くなる。同じ大きさの音を出すためには、弦をはじく強さは変えない。弦を強くはじくと、振幅が大きくなり、大きな音が出る。

【過去問 11】

演劇部のKさんとMさんは、四方八方に広がる光を一方向に集める図1のようなスポットライトを、部活動で使用するために自作できないかと考え、試行錯誤しています。問1～問5に答えなさい。

(埼玉県 2023 年度)

図1

会話1

スポットライトを作るには、図2のように電球にかさをつけるだけではだめかな。

かさだけだと、電球から出た光の一部しか有効に使えないのではないかな。懐中電灯には電球のまわりが鏡のようになっているものもあるよ。

そうか、光が鏡で **A** する性質を使って光を一方向に集めるんだね。

問1 会話1の **A** にあてはまる語を書きなさい。

問2 Kさんは、電球のまわりを鏡でおおい、スクリーンを照らす実験を行いました。図3は、その断面のようすを横から見た模式図です。矢印の向きに出た光はどのように進みますか。スクリーンまでの光の道すじを、定規を用いて作図しなさい。

図3

会話2

Kさん

スポットライトを作るなら、凸レンズでも光を一方向に集められるのではないかな。

なるほどね。光源に対する凸レンズの位置を変えて、光の進み方がどのように変わるのか、いろいろと試してみよう。

Mさん

実験

課題

光源に対する凸レンズの位置によって、光の進み方はどのように変わるのだろうか。

【方法】

- [1] 直径が6 cmで焦点距離が10cmの凸レンズを準備し、図4のように光学台の上に光源、凸レンズ、スクリーンを置いた装置を組み立て、光源のフィラメントが凸レンズの軸（光軸）上になるように調整した。
- [2] 光源を固定したまま凸レンズの位置を変え、スクリーンにうつる光のようすを、スクリーンを凸レンズから10cmずつ遠ざけて調べた。

図4

【結果】

		凸レンズからスクリーンまでの距離					
		10cm	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm
光源から凸レンズまでの距離	10cm	像はできず、いずれの距離でも明るい光が直径約6 cmの円としてうつった。					
	20cm	像はできず、明るい光が直径約3 cmの円としてうつった。	上下左右が逆向きのフィラメントの <u>実像</u> ができた。	像はできず、遠ざけるほど光が広がり、暗くなった。			

問3 【結果】の下線部について、このときできた像の大きさはもとの光源の大きさの何倍ですか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

- ア 0.5倍 イ 1倍 ウ 1.5倍 エ 2倍

問4 【実験】について、光源から凸レンズまでの距離が10cmのとき、スクリーンを凸レンズから遠ざけても、明るい光が同じ大きさの円としてうつる理由を、平行という語を使って説明しなさい。ただし、光源から出た光は凸レンズの軸（光軸）上の1点から出たものとしなさい。

会話3

問5 Kさんはフレネルレンズを理解するために、三角柱のガラスを机に並べ、光源装置から光を当てる実験を行いました。**図6**は、そのようすを上から見た模式図です。Kさんは、1点から出た光源装置の光を**図6**の6か所の□に置いた三角柱のガラスに当てると、それぞれの光がたがいに平行になるように進むことを確認しました。このときの三角柱のガラスの並べ方として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

図6

問 1	
問 2
問 3	
問 4	
問 5	

問 1	反射
問 2
問 3	イ
問 4	例 焦点から出た光は、凸レンズを通ったあと、凸レンズの軸（光軸）に平行に進むから。
問 5	エ

問1, 2 光は鏡の表面で反射し, そのとき, (入射角の大きさ) = (反射角の大きさ) となるように進む。よって, まず, 矢印を鏡までのばし (右図①), 鏡の表面で (入射角の大きさ) = (反射角の大きさ) となるように反射光をかいて (②), その反射光をスクリーンまでのばす (③)。

問3 光源が凸レンズの焦点距離の2倍の位置にあるとき, 凸レンズの反対側で, 凸レンズの焦点距離の2倍の位置のスクリーンに, 光源と同じ大きさの実像ができる。この凸レンズは焦点距離が10cmであ

るので, 光源から凸レンズまでの距離が20cm (=焦点距離の2倍) のとき, スクリーンには光源と同じ大きさ (=1倍) の実像ができる。

問4 光源から凸レンズまでの距離が10cmのとき, 光源はちょうど焦点の位置にある。ここでは, 光源から出た光は光軸上の1点から出ていると考えるので, この場合の光の道筋は, 右の模式図のようになり, レンズの反対側で光軸と平行に進むため, 光は1か所に集まらず, 像をつくらない。したがって, スクリーンと凸レンズとの距離がどこであっても, 平行に進む光が, 同じ大きさの円をつくるようすが観察される。

問5 光が空気中からガラス中へ進むとき, 右図のように, 屈折角は入射角よりも小さくなる。これに対し, ガラス中から空気中へ進むとき, 入射角は屈折角よりも小さくなる。すなわち, ガラス中でみられる角度 (屈折角・入射角) は, 空気中でみられる角度 (入射角・屈折角) よりもつねに小さい。光がこのように進むことを考えると, の前後の矢印が正しくつながるものはエとなる。図6で光の進む道すじが最も大きく変化している, 最も上の空欄にしぼってア～エを比較するとよい。

【過去問 12】

力のつり合いについて調べるため、次の**実験 1**、**2**を行いました、これに関して、あとの問いに答えなさい。
ただし、質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、ばねの質量は考えないものとします。また、台ばかりの目もりは、物体をのせていないとき 0 g を示すものとします。

(千葉県 2023 年度)

実験 1

- ① 図 1 のような、ばねに物体をつなげていないときの長さが 10 cm のばねを用意した。
- ② ①のばねに、質量の異なる物体をつなげて静止したとき、ばねの伸びをそれぞれ測定した。表はその結果をまとめたものである。

表

物質の質量 [g]	0	100	200	300	400	500	600
ばねの伸び [cm]	0	4	8	12	16	20	24

なお、図 2 は、ばねに質量 100 g の物体 A をつなげ、ばねと物体 A が静止したようすを、物体 A にはたらく力とともに表したものである。

図 2

実験 2

- ① 図 3 のように、**実験 1** で使用したのと同じばねにつなげた質量 400 g の物体 B を、台ばかりの上ののせた質量 200 g の物体 C の上に静かに置いた。このとき、ばねの伸びは、0 cm であった。
- ② ばねを一定の速さでゆっくりと引き上げたときの、ばねの伸びと、台ばかりの目もりを観察し、記録した。

図 3

問2 次の文章は、実験2についてのSさんたちと先生の会話である。あとの(a)~(c)の問いに答えなさい。

Sさん：実験2で、ばねののびが0cmのとき、台ばかりの目もりは600gです。

Tさん：そうすると、台ばかりが物体Cを押す力は6Nで、物体Cが物体Bを押す力は、4Nでしょうか。

先生：そうですね。それでは、ばねを一定の速さでゆっくりと引き上げて、ばねののびが4cmのとき、物体Cが物体Bを押す力の大きさは何Nですか。また、そのとき、台ばかりの目もりは何gになるか予想してみましょう。

Sさん：物体Cが物体Bを押す力の大きさは、 Nで、台ばかりの目もりは gです。

先生：そうですね。そのあともばねをゆっくりと引き上げて、台ばかりの目もりが変化しなくなるまで確認してみましょう。

Tさん：台ばかりの目もりが400gになるとき、ばねののびは、 cmでした。

Sさん：台ばかりの目もりが変化しなくなるまでの、ばねののびと台ばかりの目もりを観察し、記録した結果について、グラフにかいてまとめました。

先生：そうですね。グラフを用いて表すことができましたね。

(a) 会話文中の , にあてはまる数値をそれぞれ書きなさい。

(b) 会話文中の にあてはまる数値を書きなさい。

(c) ばねののびと台ばかりの目もりの関係を表すグラフを、解答用紙の図中に、実線をかきなさい。

問2	(a)	x	N
		y	g
	(b)	cm	
(c)			

問2	(a)	x	3 N
		y	500 g
	(b)	8 cm	
(c)			

問2 (a) 表から、100 g の物体をつなげて静止したとき、ばねののびが4 cm になっていることがわかる。つまり、ばねを1 N の力で引くと、ばねののびが4 cm になることがわかる。また、物体Bには、ばねに引かれる上向きの力、物体Cに押される上向きの力、下向きの重力がはたらいっており、これらが釣り合っている。よって、実験2でばねののびが4 cm のとき、物体Bはばねに1 N の力で上向きに引かれている。また、400 g の物体Bにはたらく重力は4 N なので、物体Cが物体Bを押す力の大きさは、 $4 - 1 = 3$ Nと求められる。このように、物体Bにはたらく力をまとめると右の上図のようになる。

このとき、物体Cには、下向きの重力、物体Bに押される下向きの力、台ばかりに押される上向きの力がはたらいっており、これらの力が釣り合っている。下向きの重力は2 N、物体Bに押される下向きの力は3 Nなので、台ばかりに押される上向きの力は $2 + 3 = 5$ Nとなる。このように、物体Cにはたらく力をまとめると右の下図のようになる。よって、物体Bが台ばかりを押す力も5 Nなので、台ばかりの目もりは500 gとなる。

- (b) 台ばかりの目もりが400 g のとき、物体Cが台ばかりに押される力は4 Nである。物体Cにはたらく重力は2 Nだから、物体Cが物体Bを上向きに押す力は、 $4 - 2 = 2$ Nとなる。物体Bにはたらく重力は4 Nなので、ばねが物体Bに引かれる力は $4 - 2 = 2$ Nである。よって、表より、ばねののびは8 cmである。
- (c) ばねが物体Bを引く力が1 N大きくなると、物体Cが台ばかりを押す力は1 N小さくなり、台ばかりの目もりが示す値は100 g小さくなる。つまり、ばねののびが4 cm大きくなるにつれて、台ばかりの目もりが示す値は100 gずつ小さくなっていく。台ばかりの目もりが示す値が200 gになると、物体Bと物体Cがはなれて、ばねののびも台ばかりの目もりが示す値も変化しなくなる。

【過去問 13】

次の問いに答えよ。

(東京都 2023 年度)

問4 図3のように、凸レンズの二つの焦点を通る一直線上に、物体（光源付き）、凸レンズ、スクリーンを置いた。

凸レンズの二つの焦点を通る一直線上で、スクリーンを矢印の向きに動かし、凸レンズに達する前にはっきりと像が映る位置に調整した。図3のA点、B点のうちはっきりと像が映る時のスクリーンの位置と、このときスクリーンに映った像の大きさについて述べたものとして適切なものは、下の表のア～エのうちではどれか。

	スクリーンの位置	スクリーンに映った像の大きさについて述べたもの
ア	A点	物体の大きさと比べて、スクリーンに映った像の方が大きい。
イ	A点	物体の大きさと比べて、スクリーンに映った像の方が小さい。
ウ	B点	物体の大きさと比べて、スクリーンに映った像の方が大きい。
エ	B点	物体の大きさと比べて、スクリーンに映った像の方が小さい。

問4	ア イ ウ エ
----	------------------

問4	イ
----	---

問4 物体の先端から出て光軸（凸レンズの二つの焦点を通る一直線）に平行に進む光は、凸レンズで屈折して焦点を通る。物体の先端から出て凸レンズの中心を通る光はそのまま直進する。この2つの光の道すじが交わる点が像の先端となる。よって、図のように、像はA点にできる。

【過去問 14】

次の問いに答えなさい。

(神奈川県 2023 年度)

問1 次の は、Kさんがモノコードの弦をはじいたときに出る音についてまとめたものである。文中の (X), (Y) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、**図2**と**図3**の1目盛りの値は同じであり、縦軸は振幅を、横軸は時間を表しているものとする。

図1のようなモノコードの a b間の弦をはじき、オシロスコープで音の波形を調べたところ、**図2**のようになった。このモノコードを用いて**図3**のような音を出すためには、弦を張る強さを (X) するか、ことじを動かして a b間の弦の長さを (Y) して、**図2**と音の大きさが同じになるように a b間の弦をはじけばよい。

図1

モノコード

図2

図3

1 X : 強く Y : 長く	2 X : 強く Y : 短く
3 X : 弱く Y : 長く	4 X : 弱く Y : 短く

問1	① ② ③ ④
----	------------------------

問1	2
----	---

問1 音の大きさと高さ

- ・音の大きさ…振幅が大きいほど大きくなる。
- ・音の高さ……振動数が多く (大きく) なるほど高くなる。

図2と**図3**の波形を比べると、振幅は同じで、振動数は**図3**の方が多し。モノコードの弦をはじいて音を出すとき、弦を張る強さを強くするか、弦の長さを短くすると、振動数が多くなり、音は高くなる。

【過去問 15】

光の進み方について調べるために、次の**実験 1**、**2**を行った。この実験に関して、下の**問 1**～**問 4**に答えなさい。
(新潟県 2023 年度)

実験 1 図1のように、半円形のガラスの中心を光が通るように、光源装置で光を当てて、光の道すじを観察した。

実験 2 図2のように、和実さんは、床に垂直な壁にかけた鏡を用いて、自分の像を観察した。
なお、和実さんの全身の長さは154cm、目の位置は床から142cm、鏡の縦方向の長さは52cm、鏡の下端の位置は床から90cm、和実さんと鏡との距離は100cmとする。

図 1

図 2

問 1 **実験 1**について、光の進み方を表したものとして、最も適当なものを、**図 3**の**ア**～**エ**から一つ選び、その符号を書きなさい。

問 2 **実験 1**について、光がガラスから空気へ進むときの入射角を大きくしていくと、全反射が起きた。このような光の性質を利用しているものとして、最も適当なものを、次の**ア**～**エ**から一つ選び、その符号を書きなさい。

- ア** エックス線写真 **イ** けい光灯
- ウ** 光ファイバー **エ** 虫眼鏡

問 3 **実験 2**について、和実さんから見える自分の像として、最も適当なものを、次の**ア**～**エ**から一つ選び、その符号を書きなさい。

問 4 次の文は、**実験 2**において、和実さんが全身の像を観察するために必要な鏡の長さ、その鏡を設置する位置について述べたものである。文中の **X**，**Y** に当てはまる値を、それぞれ求めなさい。ただし、和実さんと鏡との距離は変えないものとする。

和実さんが全身の像を観察するためには、縦方向の長さが少なくとも **X** cm の鏡を用意し、その鏡の下端が床から **Y** cm の位置になるように設置すればよい。

問 1				
問 2				
問 3				
問 4	X	cm	Y	cm

問 1	ア			
問 2	ウ			
問 3	エ			
問 4	X	77 cm	Y	71 cm

問 1 光がガラスや水から空気へ進むとき、光はそれらの境界面で屈折する。このとき、屈折角は入射角よりも大きくなる。

問 2 アのエクス線写真は放射線が物体を透過する性質を利用したもの。ウの光ファイバーは、2種類のガラスを組み合わせることで、入った光が全反射し、離れた場所へも早くに光を伝えることができるものである。エの虫眼鏡は凸レンズによる光の屈折を利用して、物体を拡大して観察するものである。

問 3 光の反射の法則より、入射角と反射角は等しくなる。鏡の上端は目と同じ高さにあるため、和実さんからは目の高さまでしか鏡にうつらない。また、鏡の下端では、入射角と反射角が等しくなるから、床から $90 - 52 = 38\text{cm}$ の高さより上にある部分から出た光が目が届く。

問 4 入射角と反射角は等しいことから、全身の像を観察するには、鏡の縦方向の長さは身長的一半である 77cm 必要である。また、つま先から出た光が目が届くためには、鏡の下端を床から目の高さまでの半分位置に設置すればよい。

【過去問 16】

風のない日に、グラウンドで太郎さんと浩二さんの100m走のタイムを測定した。図のように、スタートラインとゴールラインはそれぞれ校舎から200m、100m離れており、100m走のコースは校舎に対して垂直である。スタートラインの真横でスターターの花子さんがピストルを鳴らし、ゴールラインの真横で計測者の健一さんがストップウォッチで時間をはかった。次の健一さんと花子さんの会話を読んで、あとの問いに答えなさい。なお、音の伝わる速さは340m/sとする。

(富山県 2023 年度)

健一：すごいな。太郎さんのタイムは13.50秒だったよ。
 花子：健一さんは、ストップウォッチのボタンをいつ押しているの？
 健一：花子さんの鳴らしたピストルの音を聞いたと同時にボタンを押してはかり始め、ゴールした瞬間にボタンを押してストップさせたよ。
 花子：え？ その方法だと、太郎さんがスタートしてからゴールするまで実際にかかる時間を正しく測定できないよ。

問1 次の文は、下線部の理由を説明したものである。文中のP～Rの()の中から適切なものをそれぞれ選び、記号で答えなさい。

ピストルの音はP (ア 鳴ると同時に健一さんに伝わる イ 健一さんに伝わるまで時間がかかる)。そのため、健一さんがピストルの音を聞いたとき、太郎さんはQ (ウ まだスタートしていない エすでにスタートしている)。したがって、この方法で測定した時間は、太郎さんがスタートしてからゴールするまで実際にかかる時間よりもR (オ 短くなる カ 長くなる)。

問2 太郎さんがスタートしてからゴールするまで実際にかかる時間は何秒か。小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。

問3 スタートしてからゴールするまで実際にかかる時間をより正しく測定するためには、ピストルの音が鳴ると同時に出る煙が見えたときに、ストップウォッチのボタンを押してはかり始めるとよい。次の文は、その理由を説明したものである。文中の空欄(X), (Y)に適切なことばを書きなさい。

(X)が煙から健一さんまで進む速さは、(Y)がピストルから健一さんまで伝わる速さに比べて、はるかに速いから。

問4 次に、浩二さんのタイムを測定した。浩二さんは走り終えたあと「ピストルの音と同時にスタートしたけど、1回しか鳴らしていないピストルの音が、スタートした後にもう一度前方から小さく聞こえたよ。」と花子さんに話した。

- ① ピストルの音がもう一度聞こえた理由を簡単に書きなさい。
- ② 浩二さんが、もう一度ピストルの音を聞いたのはスタートしてから何秒後か。小数第3位を四捨五入して**小数第2位**まで求めなさい。ただし、浩二さんが100m走るのに実際にかかる時間は12.50秒であり、スタートしてからゴールするまで一定の速さで走ったものとする。

問1	P		Q		R	
問2	秒					
問3	X		Y			
問4	①					
	②	秒後				

問1	P	イ	Q	エ	R	オ
問2	13.79 秒					
問3	X	光	Y	音		
問4	①	ピストルの音が校舎で反射して、その後浩二さんに伝わったから。				
	②	1.15 秒後				

問1 光の伝わる速さに比べて音の伝わる速さはおそいため、ピストルの音が健一さんに伝わるまでには時間がかかり、健一さんがピストルの音を聞いたときには、太郎さんはすでにスタートしている。

問2 ピストルを鳴らしてから、その音が健一さんに伝わるまでの時間は、音の伝わる速さが340m/sだから、 $100\text{m} \div 340\text{m/s} = 0.294 \dots \text{s}$ である。よって、太郎さんがスタートしてからゴールするまで実際にかかる時間は、 $13.50 + 0.29 = 13.79$ より、およそ13.79秒となる。

問4 ② 浩二さんが走る速さは $100\text{m} \div 12.50\text{s} = 8.00\text{m/s}$ である。また、ピストルを鳴らしてから浩二さんがもう一度ピストルの音を聞くまでの時間を x とすると、ピストルを鳴らして出た音は校舎で反射して浩二さんのもとに届くから、音が伝わった距離は $340x$ であり、浩二さんが走った距離は $8.00x$ と表すことができる。音は校舎で反射して浩二さんのもとに届くから、ピストルを鳴らした位置から浩二さんがもう一度ピストルの音を聞いた位置までの距離は $400 - 340x$ であり、これは浩二さんが走った距離と等しい。よって、 $400 - 340x = 8.00x$ より $x \approx 1.15\text{s}$ となる。

【過去問 17】

以下の問いに答えなさい。

(石川県 2023 年度)

問4 光について、次の(1)、(2)に答えなさい。

(1) 太陽や蛍光灯のように、みずから光を出す物体を何というか、書きなさい。

(2) 図3の---▶---は、点Aから出た光の進む道すじの1つを表している。この道すじを進んできた光は三角柱のガラスを通過した後、どの道すじを進むか、図3のア～エから最も適切なものを1つ選び、その符号を書きなさい。

問4	(1)	
	(2)	

問4	(1)	光源
	(2)	エ

問4 (2) 光が空気中からガラスや水中に進むときには入射角は屈折角よりも大きく、光がガラスや水中から空気中に入る時には入射角は屈折角よりも小さくなる。

【過去問 18】

次の問1，問2に答えなさい。

(山梨県 2023 年度)

問1 かれんさんは、ジュースを入れたコップの中のストローが曲がって見えることに気づいた。このことに疑問をもったかれんさんは、光の性質を調べるために、次の実験を行った。(1)～(3)の問いに答えなさい。

〔実験1〕① 水平な台の上に、図1のように、光源装置と半円形ガラスを置いた。光源装置の光を半円形ガラスに向けて入射させたところ、半円形ガラスの中を進む光の道すじが観察できた。ただし、図1は実験のようすを真上から見たものである。

② 水平な台の上に、図2のように、半円形ガラスに接するように鉛筆を立てて置き、矢印⇨の向きから鉛筆を観察した。

(1) 〔実験1〕の①で、光が折れ曲がる現象を何というか、その名称を書きなさい。

(2) 〔実験1〕の②で、観察した鉛筆はどのように見えたと考えられるか、次のア～エから一つ選び、その記号を書きなさい。

(3) コップの中のストローが曲がって見えることと同じ原理によるものはどれか、次のア～エから一つ選び、その記号を書きなさい。

- ア 夜、明るい部屋の中から窓ガラスを見ると、部屋の中がうつって見える。
- イ 水中から、ななめ上の方向の水面を見ると、水中のものが水面にうつって見える。
- ウ カーブミラーを見ると、広い範囲が見える。
- エ 虫めがねを物体に近づけて見ると、物体が拡大されて見える。

問2 光が鏡にあたって進むようすを調べるために、次の実験を行った。(1)、(2)の問いに答えなさい。

〔実験2〕 図3のように、光源装置と鏡A、鏡Bを置き、真上から見たところ、光源装置の光が鏡にあたって進むようすが観察できた。ただし、鏡A、鏡Bの面のなす角度は 90° であり、図3には、観察した光の道すじの一部を示している。

図3
光源装置

(1) 光源装置の光が鏡Aにあたった後に進む光の道すじを、実線(——)でかきなさい。

(2) 〔実験2〕の光源装置のかわりに図4の時計を使って、鏡にうつる像について調べた。図5のように時計を置き、時計の文字盤を鏡に向けた。図5の矢印 $\Rightarrow$ の向きから観察したとき、正面と左右に時計の像がうつって見えた。正面に見える時計の像はどれか、次のア～エから一つ選び、その記号を書きなさい。

図4

図5

問1	(1)	
	(2)	
	(3)	
問2	(1)	
	(2)	

問 1	(1)	屈折
	(2)	イ
	(3)	エ
問 2	(1)
	(2)	ア

問 1 (2) 光がガラスや水などの境界で屈折したとき、光は屈折光の延長線上から直進してくるように見えるため、ガラス越しに見える鉛筆は実際の鉛筆の位置から右にずれて見える。

(3) 夜、明るい部屋の中から窓ガラスを見ると、部屋のように窓ガラスで反射して目に届く。カーブミラーは中央部分と縁部分の厚さが異なることで、小さな面積で広い範囲が見えるように工夫がされた鏡である。虫めがねには凸レンズが使われ、焦点よりも内側に物体を近づけることで、物体の虚像を見ることができる。

問 2 (2) 正面に見える時計の像は、時計ではね返った光が鏡 A、B で 1 回ずつ、合計 2 回反射して観察者に届くことによって見える。そのため、像の向きは物体と同じ向きになる。

【過去問 19】

問いに答えなさい。

(長野県 2023 年度)

問1 大村さんは、水道の蛇口から水筒に水を注いでいるとき、水筒から聞こえる音の高さが次第に変化することに興味をもち、次のような実験を行った。ただし、表1、2は、水を注ぎ始めたときの音の波形を模式的に表したものであり、縦軸と横軸の目盛りのとり方はすべて等しく、縦軸は振動のはばを、横軸は時間を表し、横軸の1目盛りは0.0004秒である。

【実験1】

- ① 3本の同じペットボトルを、長さが同じになるように上部を切り、図1のように、100mLの水を入れたものをA、150mLの水を入れたものをB、200mLの水を入れたものをCとした。

- ② 図2のように、水を注いだとき、A～Cから発生した音を、マイクロホンを通してそれぞれパソコンに記録し、波形で表したものを、表1にまとめた。

表1

- (1) 実験1で、水を注いで発生した音の振動は、何の振動によってマイクロホンに伝えられたか、書きなさい。
- (2) 表1をもとに、音の大きさや高さについて考えた。
- 音の大きさに関係がある、振動の中心からのばを何というか、書きなさい。
 - 表1のA～Cのうち、音の高さが最も高いものはどれか、記号を書きなさい。また、そのように判断した理由を簡潔に書きなさい。
 - Aから発生した音の振動数は約何Hzか、最も適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号を書きなさい。
ア 約420Hz イ 約625Hz ウ 約835Hz エ 約1250Hz

問 1	(1)	例 空気			
	(2)	i	振幅		
		ii	記号	C	
			理由	例 振動数を比べると、Cが最も多いから	
	iii	イ			
	(3)	あ	ア	い	キ
		う	イ	え	オ
		お	カ		

問 1 (1) 空気が音の振動を伝えているため、真空中では音は伝わらない。

(2) i, ii 音の大きさと高さ

- ・音の大きさ…振幅が大きいほど大きくなる。
- ・音の高さ……振動数が多く（大きく）なるほど高くなる。

表 1 の A～C では、縦軸が振動のはば（振幅）を表しているから、このはばが大きい波形は、大きい音を表している。横軸は時間を表しているから、同じ時間における波の数が最も多い波形が、振動数が多く高い音を表している。

iii A から発生した音の波形を見ると、4 目盛り分の時間で 1 回振動していることがわかる。1 目盛りは 0.0004 秒を表しているので、4 目盛りは、 $0.0004 \times 4 = 0.0016$ 秒を表している。よってこの音の振動数は、 $1 \div 0.0016 = 625$ Hz となる。

(3) 図 3 の D と E では、水の部分の長さは同じで、空気の部分の長さは異なる。表 2 の D と E の波形を比較すると振動数が異なっているので、音の高さは空気の部分の長さによって変化することがわかる。また、空気の部分の長さが同じで、水の部分の長さは異なる B と E の波形を比較すると、振動数が同じになっている。これは C と D についても同様である。よって、音の高さは水の部分の長さによって変化しないことがわかる。

【過去問 20】

問いに答えなさい。

(岐阜県 2023 年度)

問3 図3のように、1辺の長さが6 cm の正方形に切りとったプラスチック板をスポンジの上に置き、水を入れてふたをしたペットボトルを逆さまにして立てると、スポンジが沈んだ。このとき、正方形のプラスチック板と、水を入れてふたをしたペットボトルの質量の合計は 360 g であった。ただし、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。また、 $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ である。

- (1) プラスチック板からスポンジの表面が受ける圧力は何 Pa か。
- (2) プラスチック板を1辺の長さが半分の正方形にしたとき、プラスチック板からスポンジの表面が受ける圧力は約何倍になるか。ア～オから最も適切なものを1つ選び、符号で書きなさい。
- ア 約 $\frac{1}{4}$ 倍 イ 約 $\frac{1}{2}$ 倍 ウ 約1倍 エ 約2倍 オ 約4倍

問3	(1)	Pa
	(2)	

問3	(1)	1000 Pa
	(2)	オ

問3 (1) 1 辺の長さが $6 \text{ cm} = 0.06 \text{ m}$ の正方形であるプラスチック板の面積は、 $0.06 \text{ m} \times 0.06 \text{ m} = 0.0036 \text{ m}^2$ であり、プラスチック板とペットボトルの合計の質量 360 g にはたらく重力の大きさは 3.6 N なので、プラスチック板からスポンジの表面が受ける圧力は、
 圧力 [Pa] = 力の大きさ [N] ÷ 力がはたらく面積 [m^2] より、 $3.6 \text{ N} \div 0.0036 \text{ m}^2 = 1000 \text{ Pa}$ となる。

(2) 正方形の1辺の長さが半分 ($=\frac{1}{2}$) となると、その面積は $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ となる。(1)の計算式より、割る数である面積が $\frac{1}{4}$ となると、圧力の大きさは4倍となる。

【過去問 21】

次の実験について、あとの各問いに答えなさい。

(三重県 2023 年度)

〈実験〉 音の大きさや高さ^{げん しんどう}と弦の振動の関係を調べるために、次の①、②の実験を行った。

① 図1のように、モノコードの弦のA B間をはじめて、音を聞いた。1回目は、弦のA B間の長さを34 cmにしてはじいた。2回目は、ことじを移動させて、弦のA B間の長さを47cmにして、弦の張り、弦をはじく強さは変えずにはじいた。

図1

② 図2のように、弦をはじいたときに出了音をマイクロホンで拾って、音の波形をコンピュータで観察した。図3は、コンピュータの画面に表示された音の波形を模式的に表したものである。

図2

図3

問1 ①について、次の(a), (b)の各問いに答えなさい。

(b) 2回目は、1回目と比べて、音の高さや振動数はどのように変化するか、次のア～エから最も適当なものを1つ選び、その記号を書きなさい。

- ア 音の高さは高くなり、振動数は多くなった。
- イ 音の高さは高くなり、振動数は少なくなった。
- ウ 音の高さは低くなり、振動数は多くなった。
- エ 音の高さは低くなり、振動数は少なくなった。

問2 ②について、次の(a), (b)の各問いに答えなさい。

(a) 図3の横軸の1目盛りが0.001秒を表しているとき、この音の振動数は何Hzか、求めなさい。

(b) 弦をはじいたときに出了音は、音の高さは変わらず、音の大きさが小さくなっていき、やがて聞こえなくなった。図4は、音が出てから聞こえなくなるまでの、コンピュータで観察された音の波形の変化を表している。□ Y に入る波形はどれか、下のア～エから最も適当なものを1つ選び、その記号を書きなさい。ただし、音の波形を表した図3と図4の縦軸、横軸の1目盛りが表す値は同じものとする。

図4

ア

イ

ウ

エ

問 1	(b)	
問 2	(a)	Hz
	(b)	

問 1	(b)	エ
問 2	(a)	250 Hz
	(b)	ウ

問 2 (a) 振動数は弦が 1 秒間に振動する回数である。図 3 は 1 回の振動に 4 目盛り分の時間がかかっているから、振動数は、 $1 \div (0.001 \times 4) = 250\text{Hz}$ となる。

(b) 弦をはじいたときに出た音は、音の高さは変わらず、しだいに音の大きさが小さくなっていくことから、振動数は同じで、振幅が小さいものを選べばよい。

【過去問 22】

ルーペやカメラに用いられている凸レンズの役割に興味をもったRさんは、光の進み方と凸レンズのはたらきについて調べ、実験を行った。また、調べたことや実験の内容をもとに、ルーペやカメラに用いられている凸レンズの役割についてまとめた。次の問いに答えなさい。

(大阪府 2023 年度)

問1 図Iは、光がガラスから空気へ進むときの様子を模式的に表したものである。

① 次のア～ウのうち、図Iにおける光の入射角と屈折角の大きさの関係を正しく表している式はどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

- ア 入射角 > 屈折角 イ 入射角 = 屈折角 ウ 入射角 < 屈折角

② 図Iにおいて、入射角を少しでも大きくすると、やがて光はすべてガラスと空気の境界面で反射するようになる。このような反射は何と呼ばれる反射か、書きなさい。

【Rさんが光の進み方と凸レンズのはたらきについて調べたこと】

- ・自ら光を出すものは光源と呼ばれ、光源はさまざまな方向に光を出す。光源からの光を物体が乱反射することによって、物体からもさまざまな方向に光が出る。
- ・物体が凸レンズの焦点の外側にあるとき、物体のある1点からさまざまな方向に出た光のうち、凸レンズを通る光は1点に集まり、実像ができる。
- ・物体からの光が多く集まるほど、実像は明るくなる。
- ・図IIは、物体の先端からさまざまな方向に出た光のうち、凸レンズを通る3本の光の道すじを作図したものである。

問2 物体から出た光の道すじについて述べた次の文中の に入れるのに適している内容を簡潔に書きなさい。

物体からさまざまな方向に出た光のうち、光軸（凸レンズの軸）に は、凸レンズを通った後に焦点を通る。

問3 次のア～エのうち、図Ⅱの物体の先端から出てP点を通った後に凸レンズを通る光の道すじを作図したものとして最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

【実験】Rさんは、図Ⅲのように凸レンズを用いて実験装置を組み立てた。凸レンズの位置は固定されており、物体、電球、スクリーンの位置は光学台上を動かすことができる。物体として用いた厚紙は、凸レンズ側から観察すると図Ⅳのように高さ2.0cmのL字形にすきまが空いており、このすきまから出た光がつくる物体の像を調べるため、次の操作を行った。

表 I

A[cm]	5.0	15.0	20.0	30.0
B[cm]	—	30.0	20.0	15.0
実像の高さ[cm]	—	4.0	2.0	1.0
倍率[倍]	—	2.0	1.0	0.50

- 凸レンズの中心線から物体までの距離をA cmとし、A=5.0, 15.0, 20.0, 30.0のとき、それぞれスクリーンを動かして、スクリーンに実像ができるかを調べた。

- 凸レンズの中心線からスクリーンまでの距離をB cmとし、スクリーンに実像ができた場合は、Bと図Ⅲ中に示した実像の高さを測った。また、実像の高さを物体のすきまの高さ(2.0cm)で割った値を倍率とした。

表 I は、これらの結果をまとめたものであり、スクリーンに実像ができない場合は、B、実像の高さ、倍率は「—」と示されている。

問4 表 I から、凸レンズの焦点距離は何 cm になると考えられるか、求めなさい。答えは小数第 1 位まで書くこと。

問5 次の文中の□に入れるのに適している語を書きなさい。

A=5.0 のとき、スクリーン側から凸レンズを通して物体を観察すると、物体よりも大きな像が見られた。この像は、光が集まってできたものではなく、実像に対して□像と呼ばれている。

問6 Rさんは表 I から、A=15.0, 20.0, 30.0のとき、倍率の値がA、Bを用いた文字式でも表せることに気付いた。このことについて述べた次の文中の① [] から適切なものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。また、□②に入れるのに適している数を小数第 1 位まで書きなさい。

A=15.0, 20.0, 30.0のとき、倍率の値は、いずれも① [ア A÷B イ 2A÷B ウ B÷A エ B÷2A] の値に等しいことが分かる。スクリーンに実像ができるとき、この関係がつねに成り立つものとする、A=35.0, B=14.0であれば、スクリーンにできる実像の高さは□② cmになると考えられる。

問7 A=20.0 のとき、図Vのように光を通さない黒い紙で凸レンズの一部を覆った。このときにスクリーンにできた実像は、光を通さない黒い紙で凸レンズの一部を覆う前にスクリーンにできた実像と比較して、どのような違いがあったと考えられるか。次のア～エのうち、適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

図V

- ア 像全体が暗くなったが、像は欠けなかった。
- イ 像の一部のみ暗くなったが、像は欠けなかった。
- ウ 像全体が暗くなり、像の一部が欠けた。
- エ 像全体の明るさは変わらず、像の一部が欠けた。

【Rさんがルーペやカメラに用いられている凸レンズの役割についてまとめたこと】

- ・ルーペには、物体を拡大して観察するために凸レンズが用いられており、物体は凸レンズの焦点の にくるようにする。凸レンズを通して見られる像は、物体と上下が同じ向きになる。
- ・カメラには、物体からの光を集めるために凸レンズが用いられており、物体は凸レンズの焦点の にくるようにする。物体からの光を集めてできる像は、物体と上下が になる。

問8 次のア～エのうち、上の文中の ～ に入れるのに適している内容の組み合わせはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。ただし、ルーペやカメラに用いられているレンズは、それぞれ1枚の凸レンズでできているものとする。

- ア ㉔ 内側 ㉕ 外側 ㉖ 同じ向き イ ㉔ 内側 ㉕ 外側 ㉖ 逆向き
- ウ ㉔ 外側 ㉕ 内側 ㉖ 同じ向き エ ㉔ 外側 ㉕ 内側 ㉖ 逆向き

問1	①	ア イ ウ
	②	反射
問2		
問3		ア イ ウ エ
問4		cm
問5		像
問6	㉔	ア イ ウ エ
	㉕	cm
問7		ア イ ウ エ
問8		ア イ ウ エ

問 1	①	ウ
	②	全 反射
問 2	平行な光	
問 3	エ	
問 4	10.0 cm	
問 5	虚 像	
問 6	㉑	ウ
	㉒	0.8 cm
問 7	ア	
問 8	イ	

- 問 1 ① 光がガラスや水中から空気へ進むとき、入射角は屈折角よりも小さくなる。
- 問 2 光軸（凸レンズの軸）に平行な光は、凸レンズを通った後焦点を通るように直進する。
- 問 3 焦点よりも凸レンズから離れた位置にある点から出た光は、さまざまな方向に出て凸レンズを通過してやがて一点に集まる。そのため、物体の先端から出て P 点を通った光も、凸レンズで屈折したあと実像の先端へ向かって進む。
- 問 4 焦点距離の 2 倍の位置に物体を置くと、同じ大きさの実像ができる。表 I より、A が 20cm のときの倍率が 1 倍になっていることから、焦点距離は 10cm であると分かる。
- 問 6 A、B の値に着目すると、 $A = 15.0\text{cm}$ のとき、倍率は $B \div A = 30.0 \div 15.0 = 2$ 倍となっていることが分かる。A が 20.0cm、30.0cm のときにもこの関係は成り立つ。よって、 $A = 35.0\text{cm}$ 、 $B = 14.0\text{cm}$ であるとき、その倍率は $14.0 \div 35.0 = 0.4$ 倍となり、スクリーンにできる実像の大きさは、 $2.0 \times 0.4 = 0.8\text{cm}$ であると考えられる。
- 問 7 凸レンズの一部を光を通さない黒い紙で覆っても、覆っていない部分は光が通過することができる。物体からは無数にさまざまな方向へ光が出ているため、凸レンズを通る光の量が減り像全体が暗くなるが、像の形に変化はない。
- 問 8 ルーペでは物体を拡大して観察を行うため、見える像は実物よりも大きな虚像である必要がある。したがって、ルーペで観察を行うときは、観察する物体を凸レンズの焦点の内側にくるようにする必要がある。また、カメラでは、凸レンズを使って物体からの光を集める必要があるため、物体は凸レンズの焦点よりも外側にくるようにする必要がある。このとき光が集まってできた像は実像であるため、物体と上下の向きが逆向きになる。

【過去問 23】

和美さんたちは、「世界の科学者」というテーマで調べ学習に取り組んだ。次の問いに答えなさい。

(和歌山県 2023 年度)

問2 次の文は、紀夫さんがイギリスの科学者である「フック」について調べ、まとめたものの一部である。下の(1)~(4)に答えなさい。

イギリスの科学者であるフックは、自作の顕微鏡でコルクの一部を観察したところ、中が空洞になっている多数の小さな部屋のようなものを発見し、これを「②細胞」と名づけました。また、さまざまな植物や昆虫、③ヒトの皮膚など数多くのもをを観察し、これらの記録を「ミクログラフィア」という本にまとめました。

さらに、④ばねについても研究し、ばねののびは、ばねを引く⑤力の大きさに比例するというものを発見しました。

(4) 下線部⑤について、力の大きさは「N」という単位で表される。この単位のよみをカタカナで書きなさい。

問2	(4)	
----	-----	--

問2	(4)	ニュートン
----	-----	-------

【過去問 24】

たけしさんとともこさんは琴を演奏したときに弦の長さやはじき方によって出る音が違うことや、瓶に水を入れていくと瓶から出る音が変わっていくことに興味を持ち、音の性質を調べるために、次の実験1、実験2を行った。あとの各問いに答えなさい。

(鳥取県 2023 年度)

図1

実験1

図1のように、モノコードの弦をはじき、出した音をマイクロホンで拾い、コンピュータの波形表示ソフトを用いて音の波形を表示させた。弦の長さ、弦のはりの強さ、弦をはじく強さを変えながら音を出し、音の大きさや高さを聞き比べたり、出した音の波形を調べたりした。

問1 音の伝わり方について述べたものとして、適切なものを、次のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。

- ア 容器に入れたブザーから音を出し、その容器内の空気をぬいていくと、聞こえるブザーの音が小さくなっていく。
- イ 音は、空気中を約 30 万 km/s の速さで進む。
- ウ 音を出す物体は振動しており、振動を止めると音も止まる。
- エ 音が伝わる速さは、固体中より空気中のほうが速い。

問2 実験1で、弦をはじいて音を出したところ、図2のような音の波形がコンピュータの画面に表示された。この音の振動数は何 Hz か、求めなさい。ただし、図2の縦軸は振幅、横軸は時間を表し、横軸の1目盛りを $\frac{1}{2000}$ 秒とする。

図2

問3 問2で音を出した条件から、弦のはりの強さと弦をはじく強さは変えずに弦の長さを長くしたところ、音の大きさは変化せず、振動数が2分の1となった。このとき、コンピュータの画面に表示されるおよその音の波形をかきなさい。ただし、解答用紙の(・)を始点として、端まで作図すること。

実験 2

図3のように、長さ 20cm の試験管の中の水の量を変えながら、同じ強さで試験管の口にゆっくりと息を吹きかけ、ド (低)・ミ・ソ・ド (高) の音階の音が出る時の振動数と試験管の底から水面までの長さを測定し、結果を表にまとめた。

あとの会話は、2人が結果について話し合ったものである。

図 3

フルート(上)とピッコロ(下)

表

音階	ド (低)	ミ	ソ	ド (高)
振動数 [Hz]	523	659	784	1047
試験管の底から水面 までの長さ [cm]	3.7	7.1	9.2	11.9

会話

たけしさん：表から、水面が高くなるほど音が高くなるのがわかるね。

ともこさん：実験2でも実験1の振動する弦と同じ関係であると考えると、音の高さの変化が説明できそうだね。

たけしさん：同じ関係とはどのような関係だろう。

ともこさん：それは、(①) の関係だと思うよ。

たけしさん：なるほど。そのように考えると、このときに振動している物体は (②) だと考えられるね。

ともこさん：管楽器のフルートとピッコロを比べたときに、フルートの方が低い音が出ることから同じ関係が説明できるね。他の楽器でも試してみよう。

問4 会話の (①) にあてはまるものとして、最も適切なものを、次のア～エからひとつ選び、記号で答えなさい。

- ア 振動する弦の長さと言の高さ
- イ 振動する弦の太さと音の高さ
- ウ 振動する弦の振れ幅と言の高さ
- エ 振動する弦のはりの強さと音の高さ

問5 会話の (②) にあてはまる語句として、最も適切なものを、次のア～エからひとつ選び、記号で答えなさい。

- ア 試験管の中の水
- イ 試験管の中の空気
- ウ 試験管を持つ手
- エ 試験管のガラス

問 1	
問 2	Hz
問 3
問 4	
問 5	

問 1	ア, ウ
問 2	500 Hz
問 3	<p>例</p>
問 4	ア
問 5	イ

問 2 1回の振動に4目盛り分の時間がかかっているため、振動数は $1 \div \left(\frac{1}{2000} \times 4\right) = 500\text{Hz}$ となる。

問 4 ある弦において、弦のはりの強さを変えずに、弦の長さを短くしていくと弦をはじいたときに出る音は高くなる。**実験 2**では、試験管の底から水面までの高さが高くなるほど音が高くなっていることから、試験管の口から水面までの距離が短くなると息を吹きかけたときに出る音が高くなるといえる。よって、振動する弦の長さと言の高さの関係と同じ関係であると考えることができる。

問 5 試験管の中の水の量を変えると空気の体積が変わり、また、フルートとピッコロでは全体の長さが異なることと出る音の高さが変わっていることから、**実験 2**では試験管の中の空気が振動することで音が出ていると考えられる。

【過去問 25】

次の問いに答えなさい。

(島根県 2023 年度)

問1 ユウキさんは、美容室で鏡に人がどのようにうつるのか興味をもった。そこで、アイさんに協力してもらって**実験1**を行い、その結果を考察した。これについて、下の1~4に答えなさい。

実験1

ユウキさんは、**図1**のような横幅3mの鏡を使って、**①**~**⑥**の位置でアイさんのもつろうそくが鏡にうつるようすについて調べた。**図2**は、そのときの位置関係を表した図である。ただし、1マスの辺の長さは1mに対応している。

- 1 アイさんが**①**の位置に立っているとき、鏡で反射してユウキさんに届くろうそくの**光の道筋**を、矢印で図にかき入れなさい。
- 2 アイさんが**①**の位置に立っているとき、ユウキさんから見るとアイさんのもっているろうそくが鏡のおくにあるように見える。この位置を見かけの位置とすると、鏡にうつって見えるろうそくの見かけの位置はどこか、●で図にかき入れなさい。
- 3 次の文は、実験の結果をもとに考察したものである。にあてはまる位置を図2の**①**~**⑥**から一つ選び、記号で答えなさい。また、にあてはまる最も適当なものを、下の**ア**、**イ**から一つ選び、記号で答えなさい。

アイさんが**①**から順番に右に移動すると、鏡にうつるろうそくの見かけの位置も変わる。このため、ユウキさんから見てろうそくが鏡にうつるのは、までである。その理由の一つは、のときのと壁との交点が鏡の右端に位置するからである。

- ア** ろうそくの見かけの位置から壁に引いた垂線
イ ろうそくの見かけの位置からユウキさんに引いた直線

- 4 図3のように、横幅1 mの鏡5枚と、a～dの位置にろうそくを置く。このとき、ユウキさんが鏡で見ることができるろうそくはどれか。図3のa～dからすべて選び、記号で答えなさい。ただし、どの鏡を用いてもよいこととする。

図3

問 1	1		
	2		
	3	①	②
	4		

問 1	1		
	2		
	3	①	②
	4	b, c	

問 1 4 壁に対して線対称な位置にそれぞれの像はうつる。それぞれの見かけの位置からユウキさんに引いた直線上に鏡があれば、ユウキさんの位置からろうそくを鏡で見ることができる。

【過去問 26】

次の問いに答えなさい。

(岡山県 2023 年度)

問2 凸レンズに関して、①、②に答えなさい。

- ① 図1のように、凸レンズの焦点距離の2倍の位置に、物体とスクリーンを置くと、スクリーン上には物体と同じ大きさの上下左右逆の実像ができます。物体を図1のAの位置に移動させたときの、実像ができる位置と実像の大きさについて述べたものとして最も適当なのは、ア～ウのうちではどれですか。一つ答えなさい。

- ア 実像ができる位置は凸レンズから遠くなり、実像の大きさは大きくなる。
 イ 実像ができる位置も実像の大きさも変わらない。
 ウ 実像ができる位置は凸レンズから近くなり、実像の大きさは小さくなる。

- ② 図2のように、焦点の位置から矢印の2方向に進んだ光が、凸レンズで屈折して進むときの光の道筋を、解答欄の図にかきなさい。ただし道筋は、光が凸レンズの中心線で1回だけ屈折しているようにかくこととします。

- 問2 ① 凸レンズの焦点距離の2倍の位置に物体とスクリーンを置くと、スクリーン上には物体と同じ大きさで上下左右逆の実像ができる。物体を焦点距離の2倍の位置よりも凸レンズ側に移動させると実像ができる位置は凸レンズから遠くなり、実像の大きさは大きくなる。
- ② 焦点を通過して凸レンズを通過した光は、屈折して光軸に平行に進む。

【過去問 27】

水圧や浮力に関して、あとの問1～問4に答えなさい。

(広島県 2023 年度)

問1 右の図1は、直方体の物体Aを糸でつるし、物体A全体を水中に沈めて静止させているときの様子を模式的に示したものです。次のア～エの中で、この物体Aにはたらく水圧を矢印で表したものと適切なのはどれですか。その記号を書きなさい。ただし、矢印の長さは、水圧の大きさに比例しているものとします。

問2 次の図2のように、質量30g、底面積1cm²、高さ10cmの直方体の物体Bに糸をつけ、ばねばかりでつるした装置を下方に動かして物体Bをゆっくりと水中に沈め、水面から物体Bの底面までの距離を2cmずつ変えてそれぞれ静止させたときの物体Bにはたらく力を調べる実験をしました。表1は、水面から物体Bの底面までの距離と、そのときのばねばかりの示す値をそれぞれ示したものです。あとの(1)～(3)に答えなさい。ただし、質量100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとします。

表1

水面から物体Bの底面までの距離 [cm]	0	2	4	6	8	10
ばねばかりの示す値 [N]	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20

(1) この実験で用いたばねばかりは、フックの法則を利用してつくられています。次の文は、フックの法則を説明したものです。文中の $\boxed{a} \cdot \boxed{b}$ に当てはまる語はそれぞれ何ですか。下のア～エの組み合わせの中から適切なものを選び、その記号を書きなさい。

ばねの $\boxed{a}$ は、ばねを引く力の大きさに $\boxed{b}$ する。

- ア $\left[\begin{array}{l} \boxed{a} : \text{長さ} \\ \boxed{b} : \text{比例} \end{array} \right.$ イ $\left[\begin{array}{l} \boxed{a} : \text{長さ} \\ \boxed{b} : \text{反比例} \end{array} \right.$ ウ $\left[\begin{array}{l} \boxed{a} : \text{のび} \\ \boxed{b} : \text{比例} \end{array} \right.$ エ $\left[\begin{array}{l} \boxed{a} : \text{のび} \\ \boxed{b} : \text{反比例} \end{array} \right.$

(2) 水面から物体Bの底面までの距離が10cmの位置に物体Bを静止させているとき、物体Bにはたらく浮力の大きさは何Nですか。

(3) 右の図3のように、図2と同じ装置を用いて、水面から物体Bの底面までの距離が10cmの位置から、水槽に当たらないように物体B全体をゆっくりと水中に沈め、水面から物体Bの底面までの距離を変えて静止させたときの物体Bにはたらく力を調べる実験をします。この実験で得られる結果と、表1を基にして、水面から物体Bの底面までの距離と、そのときのばねばかりの示す値との関係をグラフで表すと、どのようなグラフになると考えられますか。次のア～エの中から適切なものを選び、その記号を書きなさい。

図3

水面から物体Bの底面までの距離

問3 質量が同じで、形がともに直方体である物体Xと物体Yがあり、この2つの物体は、いずれか一方は亜鉛で、もう一方は鉄でできています。次の図4のように、この2つの物体を1本の棒の両端に取り付けた同じ長さの糸でそれぞれつるし、棒の中央に付けた糸を持って棒が水平につり合うことを確認した後、図5のように、この2つの物体全体を水中に沈め、棒が水平になるように手で支えました。

次の文章は、図5で棒を支える手をはなした後の2つの物体の様子と、その様子から分かることについて述べたものです。文章中の **c** に当てはまる内容を、「質量」、「体積」、「密度」の語を用いて簡潔に書きなさい。また、**d** に当てはまる語は亜鉛・鉄のうちどちらですか。その語を書きなさい。ただし、亜鉛の密度は 7.14 g/cm^3 、鉄の密度は 7.87 g/cm^3 とします。

棒を支えている手をはなすと、物体Xが上に、物体Yが下に動き始めた。これは、水中にある物体の体積が大きいほど、浮力が大きくなるためである。このことから、2つの物体のうち、物体Xの方が **c** ことが分かり、物体Xが **d** であることが分かる。

問4 水に浮く直方体の物体Zがあります。次の図6は、物体Zを水中に沈めて静かに手をはなしたときの物体Z全体が水中にある様子を、図7は、物体Zの一部が水面から出た状態で静止している様子を、それぞれ模式的に示したものです。図6における物体Zにはたらく重力と浮力をそれぞれ重力*i*、浮力*i*とし、図7における物体Zにはたらく重力と浮力をそれぞれ重力*ii*、浮力*ii*としたとき、下のア～オの中で、物体Zにはたらく力について説明している文として適切なものはどれですか。その記号を全て書きなさい。ただし、物体Zの形や質量は常に変わらないものとします。

- ア 重力*i*と浮力*i*の大きさを比べると、浮力*i*の方が大きい。
- イ 重力*i*と浮力*ii*の大きさを比べると、浮力*ii*の方が大きい。
- ウ 重力*ii*と浮力*i*の大きさを比べると、重力*ii*の方が大きい。
- エ 重力*ii*と浮力*ii*の大きさを比べると、大きさが等しい。
- オ 浮力*i*と浮力*ii*の大きさを比べると、大きさが等しい。

問 1	
問 2	(1)
	(2)
	(3)
問 3	c
	d
問 4	

問 1		エ
問 2	(1)	ウ
	(2)	0.10
	(3)	イ
問 3	c	体積が大きく、また、2つの物体の質量が同じであることから、密度が小さい
	d	亜鉛
問 4		ア, エ

問 1 水面からの深さが深くなるほど、物体にはたらく水圧は大きくなる。

問 2 (2) 水面から物体Bの底面までの距離が0cmのとき、物体には浮力をはたらいしていない。このときのばねばかりの示す値は0.30Nであるから、物体Bにはたらく重力は0.30Nであると分かる。水面から物体Bの底面までの距離が10cmのとき、ばねばかりの示す値は0.20Nとなっているので、このとき物体Bにはたらく浮力は、 $0.30 - 0.20 = 0.10\text{N}$ と求められる。

(3) 物体Bの高さは10cmなので、水面から物体Bの底面までの距離が10cm以上になると、物体Bは水中に完全に沈む。物体が完全に水中にあるときは、物体を沈めた深さに関係なくはたらく浮力は一定である。よって、イのようなグラフになる。

問 3 密度

$$\text{密度} [\text{g}/\text{cm}^3] = \frac{\text{質量} [\text{g}]}{\text{体積} [\text{cm}^3]}$$

水中にある物体の体積が大きいほど、物体にはたらく浮力は大きくなる。物体X、Yは質量が同じだが、ともに水中に沈めたとき、物体Xが上に、物体Yが下に動いたことから、物体Xにはたらく浮力の方が、物体Yにはたらく浮力より大きいとわかる。よって、物体X、Yでは、物体Xの方が体積が大きい。質量が同じ場合、体積が大きい方が密度は小さくなる。よって、Xは密度が小さい亜鉛で、Yは密度が大きい鉄である。

問 4 水中にある物体Zの体積が大きいほど浮力は大きくなるので、浮力 i > 浮力 ii である。重力は一定なので、

重力 $i =$ 重力 ii である。

図 6 では浮力 $i >$ 重力 i であるため、物体 Z は上へ移動していく。物体 Z の一部が水面から出た図 7 では、浮力 $ii =$ 重力 ii となるため、物体 Z が静止する。

【過去問 28】

Kさんは、みそ汁を作っているときに、なべの底に沈んでいた豆腐が、煮込むことによって浮いてきたことに疑問をもち、Lさんと次の会話をし、実験を行った。あとの問いに答えなさい。ただし、100 g の物体の重さを1 Nとする。

(山口県 2023 年度)

Kさん：豆腐は水に沈むと思っていたけれど、煮込んだら浮いてきて、火を消したあとも浮いたままだったんだ。水の対流が原因ではなさそうだけれど、なぜだろう。

Lさん：水に浮いてきたということは、煮込む前と後で浮力が変化したのではないかな。

Kさん：そうだね。浮力の変化の原因には、質量の変化や体積の変化が考えられるよね。

Lさん：2種類の粘土を使って、これらのことを調べてみようよ。

[実験 1]

- ① 2種類の粘土A, Bを、それぞれ100mLはかりとった後、
図1のように糸を取り付けて形を整えた。
- ② 1 Lメスシリンダーに500mLの水を入れた。
- ③ ①の粘土Aをばねばかりにつるし、空気中でのばねばかりの値を記録した。
- ④ 粘土Aを②のメスシリンダーの水の中にすべて入れ、ばねばかりの値とメスシリンダーの目盛りの値を記録した。
- ⑤ 粘土Aを粘土Bに変え、②～④を行った。
- ⑥ 実験の結果を表1にまとめた。

図 1

表 1

	空気中		水の中	
	ばねばかりの値	メスシリンダーの目盛りの値	ばねばかりの値	メスシリンダーの目盛りの値
粘土 A	1.6N	500mL	0.6N	600mL
粘土 B	2.0N	500mL	1.0N	600mL

[実験2]

- ① 2種類の粘土A, Bを, それぞれ160gばかりとった後, 図2のように糸を取り付けて形を整えた。
- ② 1Lメスシリンダーに500mLの水を入れた。
- ③ ①の粘土Aをばねばかりにつるし, 空気中でのばねばかりの値を記録した。
- ④ 粘土Aを②のメスシリンダーの水の中にすべて入れ, ばねばかりの値とメスシリンダーの目盛りの値を記録した。
- ⑤ 粘土Aを粘土Bに変え, ②~④を行った。
- ⑥ 実験の結果を表2にまとめた。

図2

表2

	空気中		水の中	
	ばねばかりの値	メスシリンダーの目盛りの値	ばねばかりの値	メスシリンダーの目盛りの値
粘土 A	1.6N	500mL	0.6N	600mL
粘土 B	1.6N	500mL	0.8N	580mL

問2 図3は, 豆腐の種類の一つである木綿豆腐をつくる主な工程を表した模式図である。次のア, イに答えなさい。

図3

イ 木綿豆腐は, 凝固剤で固まった豆乳をくずして型枠に入れ, 図4のように, 上から圧力を加えて型枠の穴から水を抜いてつくる。

図4において, 型枠のふたは1辺10cmの正方形, 型枠のふたとおもりは合わせて200gとすると, 木綿豆腐の上面に加わる圧力は何Paか。求めなさい。

図4

問3 KさんとLさんは、実験後、T先生と次の会話をした。下のア、イに答えなさい。

Lさん：T先生、実験の結果は、表1、表2のようになりました。このことから、浮力は、水の中に入れた物体の体積と関係があることがわかりました。

T先生：結論をどのように導きましたか。

Lさん：表1から、[実験1]では ということがわかりました。また、表2から、[実験2]では ということがわかりました。

これらのことから、浮力の大きさは、質量ではなく、体積と関係があると考えました。

T先生：よく考えましたね。アルキメデスの原理によると、「物体にはたらく浮力の大きさは、その物体が押しのけた液体の重さに等しい。」とされています。

つまり、「物体の重さ」と「その物体と同じ体積の水の重さ」を比較して、「物体の重さ」の方が小さいと、物体は水に浮くことになります。

Kさん：そうなのですね。これらの実験の結果をふまえると、なべの底に沈んでいた豆腐が浮いてきたのは、煮込むことによって、豆腐の ので、「豆腐の重さ」より「豆腐が押しのけた水の重さ」が大きくなったからというわけですね。

T先生：そのとおりです。実験の結果をもとに正しく考察できましたね。

ア Lさんの発言が、それぞれの実験の結果と合うように、, に入る適切な語句を、次の1～3からそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。ただし、同じ記号を選んでもよい。

- 1 粘土Aにはたらく浮力の大きさは、粘土Bにはたらく浮力の大きさより大きい
- 2 粘土Aにはたらく浮力の大きさは、粘土Bにはたらく浮力の大きさより小さい
- 3 粘土Aにはたらく浮力の大きさと、粘土Bにはたらく浮力の大きさは等しい

イ Kさんの発言が、実験の結果をもとにした考察となるように、 に入る適切な語句を書きなさい。

問1			
問2	イ	Pa	
問3	ア	あ	
		い	
	イ		

問1	双子葉類		
問2	イ	200 Pa	
問3	ア	あ	3
		い	1
	イ	体積が大きくなった	

問2 イ 圧力の求め方

$$\text{圧力【Pa】} = \frac{\text{力の大きさ【N】}}{\text{力がはたらく面積【m}^2\text{】}} \quad (1 \text{ cm}^2 = 0.0001 \text{ m}^2, 100 \text{ Pa} = 1 \text{ hPa})$$

木綿豆腐の上面に垂直に加わる力は、型枠のふたとおもりにはたらく重力で、その大きさは2 Nである。よって、木綿豆腐の上面に加わる圧力は、 $2 \text{ N} \div (0.1 \times 0.1) \text{ m}^2 = 200 \text{ Pa}$ である。

問3 ア [実験1]で粘土Aにはたらく浮力の大きさを表1から求めると、 $1.6 - 0.6 = 1.0 \text{ N}$ である。同様に粘土Bにはたらく浮力の大きさは、 $2.0 - 1.0 = 1.0 \text{ N}$ である。よって、[実験1]では、粘土Aにはたらく浮力の大きさと、粘土Bにはたらく浮力の大きさは等しい。また、[実験2]で粘土Aにはたらく浮力の大きさは、 $1.6 - 0.6 = 1.0 \text{ N}$ 、粘土Bにはたらく浮力の大きさは、 $1.6 - 0.8 = 0.8 \text{ N}$ 。よって、[実験2]では、粘土Aにはたらく浮力の大きさは、粘土Bにはたらく浮力の大きさより大きい。

イ 『豆腐の重さ』より『豆腐が押しつけた水の重さ』が大きくなったからというわけですね』と書かれていることから考えると、煮込んでいる間に豆腐の体積が大きくなって豆腐が押しつける水の量が増え、浮力が大きくなったので浮いてきたのだと考えられる。

【過去問 29】

水中の物体にはたらく力を調べる実験を行った。問1～問5に答えなさい。ただし、100 gの物体にはたらく重力の大きさを1 Nとし、糸の質量は考えないものとする。

(徳島県 2023 年度)

実験

- ① 図1のように、高さが6.0cmの物体をばねばかりにつるすと、ばねばかりは2.1Nを示した。
- ② 次に、水そうに底面から10.0cmの高さまで水を入れた。
- ③ 図2のように、物体を水面から3.0cmの深さまで沈め、ばねばかりの値を記録した。
- ④ ③の後、物体を水面から6.0cmの深さまで沈め、ばねばかりの値を記録した。
- ⑤ 表1は、このときの記録をまとめたものである。

表1

物体を沈めた深さ[cm]	0	3.0	6.0
ばねばかりの値[N]	2.1	1.7	1.3

問1 物体の質量は何gか、求めなさい。

問2 物体を水面から3.0cmの深さまで沈めたとき、物体にはたらく浮力の大きさは何Nか、求めなさい。

問3 物体を水面から6.0cmの深さまで沈めたとき、物体にはたらく水圧の大きさと向きを模式的に表したものととして、最も適切なものをア～エから選びなさい。ただし、矢印は、物体にはたらく水圧の大きさと向きを表している。

問4 **実験**と同じ装置で物体を水面から10.0cmの深さまで沈めたとき、ばねばかりの値はどのように変化したと考えられるか、ア～エから1つ選びなさい。

問5 みづきさんは、学校のプールで泳いだときよりも、海で泳いだときの方が体がよく浮いたことを思い出した。このことを調べるため、水を塩化ナトリウム水溶液にかえ、**実験**と同じように物

体を沈める実験を行った。表2は、このときの記録をまとめたものであり、表1に比べ物体にはたらく浮力が大きいことがわかった。水に沈めたときよりも、塩化ナトリウム水溶液に沈めたときの方が物体にはたらく浮力が大きいのはなぜか、その理由を書きなさい。ただし、水の密度を 1.0 g/cm^3 、塩化ナトリウム水溶液の密度を 1.2 g/cm^3 とし、物体の上面と下面にはたらく力をふまえ、「圧力の差」という語句を用いて書くこと。

表2

物体を沈めた深さ [cm]	0	3.0	6.0
ばねばかりの値 [N]	2.1	1.6	1.1

問1	g
問2	N
問3	
問4	
問5	

問1	210 g
問2	0.4 N
問3	ア
問4	ウ
問5	塩化ナトリウム水溶液は、水より密度が大きく、物体の上面と下面にはたらく圧力の差が、水より大きいため。

- 問1 100 g の物体にはたらく重力が 1 N で、ばねばかりが 2.1 N を示したことから、物体の質量は 210 g とわかる。
- 問2 表1より、物体を沈めた深さが 3.0 cm のとき、ばねばかりの値は 1.7 N となっているので、このとき物体にはたらく浮力は、 $2.1 - 1.7 = 0.4 \text{ N}$ である。
- 問3 水面から深くなるほど、はたらく水圧は大きくなる。
- 問4 水中に入っている部分の体積が大きいほど、物体には大きな浮力がはたらく。物体が完全に水中に沈んだ後は、物体を深く沈めても浮力の大きさは変わらない。この物体の高さは 6.0 cm なので、物体を沈めた深さが 6.0 cm になるまでは、深さが大きくなるほど浮力が大きくなり、ばねばかりの値は小さくなっていく。物体を沈めた深さが 6.0 cm になると、物体が完全に水中に沈むため、それ以上深く沈めてもばねばかりの値は変化しなくなる。

問5 液体の中に沈めた物体の上面にはたらく圧力と、下面にはたらく圧力の差が大きいほど、浮力は大きくなる。
液体の密度が大きいほど、その液体に沈めた物体にはたらく圧力は大きくなるので、上面と下面ではたらく圧力の差も大きくなり、浮力が大きくなる。

【過去問 30】

次の問いに答えなさい。

(香川県 2023 年度)

問1 凸レンズによる像のでき方について、次の(1)、(2)の問いに答えよ。

(1) 下の図Ⅰのように、光源とK字型に切り抜いた厚紙、凸レンズ、スクリーンを光学台上に並べた装置を用いて、スクリーンにうつる像のでき方を調べる実験をした。K字型に切り抜いた厚紙の下の端を光軸（凸レンズの軸）に合わせ、光軸とスクリーンの交点をX点とし、スクリーンに鮮明な像ができるようにした。スクリーンの凸レンズ側にはどのような像ができるか。あとの㉠～㉤から最も適当なものを一つ選んで、その記号を書け。

(2) 下の図Ⅱのように、物体（光源）と凸レンズ、スクリーンを光学台上に並べた装置を用いて、凸レンズによる物体の像のでき方を調べる実験をした。図Ⅲは、それを模式的に表したものである。あとの文は、スクリーンにできる物体の鮮明な像の大きさ、物体とスクリーンの位置について述べようとしたものである。文中の2つの〔 〕内にあてはまる言葉を、㉠、㉡から一つ、㉢、㉣から一つ、それぞれ選んで、その記号を書け。

図Ⅲのように、物体を凸レンズの焦点距離の2倍の位置に置き、スクリーンを物体の鮮明な像ができる位置に置いた。このとき、像の大きさは、物体の大きさと同じであった。物体の大きさに比べて、スクリーンにできる物体の鮮明な像の大きさを小さくするには、物体を図Ⅲ中の〔㉞ P ㉟ Q〕の向きに、スクリーンを図Ⅲ中の〔㊸ R ㊹ S〕の向きにそれぞれ移動させるとよい。

問 1	(1)	
	(2)	と

問 1	(1)	㊹
	(2)	㉞ と ㊸

問 1 (1) 凸レンズによってスクリーン上にできる実像は、上下左右が実物と反対向きになる。このとき、光軸を中心として向きが変わるので、光軸より上にある実物の像は、X点より下にできる。

(2) 凸レンズの焦点距離とできる実像の大きさ、位置の関係

- ・ 焦点距離の2倍の位置に物体がある → 焦点距離の2倍の位置のスクリーンに、物体と同じ大きさの実像ができる
- ・ 焦点距離の2倍の位置よりも遠くに物体がある → 焦点距離とその2倍の位置の間にあるスクリーンに、物体よりも小さな実像ができる
- ・ 焦点距離の2倍の位置と焦点距離の間に物体がある → 焦点距離の2倍の位置よりも遠くにあるスクリーンに、物体よりも大きな実像ができる

物体をPの向きに動かすと、物体から凸レンズまでの距離が焦点距離の2倍より大きくなり、スクリーンをRの向きに動かすと、凸レンズからスクリーンまでの距離が焦点距離の2倍より小さくなる。

【過去問 31】

電流と磁界，光に関する次の問いに答えなさい。

(愛媛県 2023 年度)

問3 [実験5] 光学台上に，物体Mを固定し，凸レンズとスクリーンNを光学台上で動かすことができる，図5のような装置をつくった。物体Mと凸レンズとの距離Xを変え，スクリーンNに像がはっきりできる位置にスクリーンNを動かし，このときの，物体Mと凸レンズとの距離X，物体MとスクリーンNとの距離Y，図6に示すスクリーンN上にできた青色LEDの像の中心と赤色LEDの像の中心との距離Zを測定した。表1は，その結果をまとめたものである。

図5

- (1) 図7は，図5の装置を模式的に表したものである。物体Mの赤色LEDから出た光hが，凸レンズを通過したあとにスクリーンNまで進む道筋を，解答欄の図中に実線でかけ。

図6

表1

	距離X	距離Y	距離Z
測定1	60.0cm	90.0cm	1.5cm
測定2	40.0cm	80.0cm	3.0cm
測定3	30.0cm	90.0cm	6.0cm

- (2) 実験5で用いた凸レンズの焦点距離は何cmか。
- (3) 次の文の①，②の{ }の中から，それぞれ適当なものを1つずつ選び，その記号を書け。

図5の装置で，物体Mと凸レンズとの距離Xを，焦点距離より短くすると，スクリーンN上に像はできず，スクリーンNをはずして凸レンズをのぞきこむと，像が見えた。このとき見えた，LEDの像の色は，凸レンズの上側から① {ア 青色，緑色，赤色 イ 赤色，緑色，青色} の順で並び，青色LEDの像の中心と赤色LEDの像の中心との距離は，3.0cmより② {ウ 大きい エ 小さい}。

図7

2本の破線(----)は，凸レンズの軸と平行で，凸レンズの軸との距離が同じである。光hは，点iで破線jと交わっている。

問3	(1)		
	(2)	cm	
	(3)	①	②

問3	(1)				
	(2)	20.0 cm			
	(3)	①	ア	③	ウ

問3 (1) 凸レンズを通った光

- ・焦点を通った光…凸レンズの軸（光軸）に平行に進む
- ・凸レンズの中心を通った光…そのまま直進する
- ・凸レンズの軸に平行な光…焦点を通る

光 h は焦点を通過して凸レンズに入っているため、凸レンズを通過した後は凸レンズの軸に平行に進む。

(2) 凸レンズの焦点距離とできる実像の大きさ、位置の関係

- ・焦点距離の2倍の位置に物体がある → 焦点距離の2倍の位置のスクリーンに、物体と同じ大きさの実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置よりも遠くに物体がある → 焦点距離とその2倍の位置の間にあるスクリーンに、物体よりも小さな実像ができる
- ・焦点距離の2倍の位置と焦点距離の間に物体がある → 焦点距離の2倍の位置よりも遠くにあるスクリーンに、物体よりも大きな実像ができる

表1では、距離 X が物体 M から凸レンズまでの距離を表しており、距離 Y と距離 X の差が凸レンズからスクリーン N までの距離を表している。測定2では、 $距離 Y - 距離 X = 80 - 40 = 40\text{cm}$ で、物体 M から凸レンズまでの距離と、凸レンズからスクリーン N までの距離が同じ 40cm になっており、像の大きさは実物と同じになっている。よって、この 40cm が焦点距離の2倍にあたるので、焦点距離は、 $40 \div 2 = 20\text{cm}$

(3) 凸レンズをのぞいて見える虚像は、向きは実物と同じで、大きさは実物よりも大きい。

【過去問 32】

次の問いに答えなさい。

(高知県 2023 年度 A)

問1 音の大きさと高さを調べるために、マイクロホンをつないだ簡易オシロスコープと、モノコードを用いて次の実験Ⅰ・Ⅱを行った。このことについて、下の(1)~(3)の問いに答えなさい。

実験Ⅰ 図1のように、モノコードに弦を張り、ことじをおいた。弦をはじいて出た音を、マイクロホンを使って簡易オシロスコープで調べると、図2のような波形が表示された。

実験Ⅱ マイクロホンの位置と弦を張る強さは変えずに、ことじの位置とはじく強さを変えて弦をはじいたところ、簡易オシロスコープに表示された波形から、実験Ⅰに比べ、低く大きな音が生じたことが分かった。

(1) 次の文は、この実験でモノコードの弦をはじいたときの音の伝わり方について述べたものである。文中の共通して当てはまる語を書きなさい。

弦をはじくと、弦が し、その が空気を させ、音としてマイクロホンに伝わった。

(2) 実験Ⅱにおいて簡易オシロスコープに表示された波形として最も適切なものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、ア~エの目盛りのとり方は、図2とすべて同じである。

ア

イ

ウ

エ

(3) 実験Ⅱにおける、ことじの位置と弦をはじいた強さについて述べた文として最も適切なものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア はじく弦の長さが短くなるように、ことじの位置を変え、弦を弱くはじいた。

イ はじく弦の長さが短くなるように、ことじの位置を変え、弦を強くはじいた。

ウ はじく弦の長さが長くなるように、ことじの位置を変え、弦を弱くはじいた。

エ はじく弦の長さが長くなるように、ことじの位置を変え、弦を強くはじいた。

問 1	(1)	
	(2)	
	(3)	

問 1	(1)	振動
	(2)	ウ
	(3)	エ

問 1 (2) 音の大きさと高さ

- ・音の大きさ…振幅が大きいほど大きくなる。
- ・音の高さ……振動数が多く（大きく）なるほど高くなる。

実験Ⅱでは、実験Ⅰに比べて低く大きな音が生じた。低い音は振動数が少なく、大きな音は振幅が大きいので、図2よりも振動数が少なく振幅が大きい音の波形を選べばよい。横方向が時間を、縦方向が振幅を表しているが、波形の山と谷の数が少ないほど振動数が少ないので図2より振動数が少ない音の波形はウとエで、図2より振幅が大きい音の波形はアとウである。これらのことから、ウが当てはまる。

(3) はじく弦の長さが長いほど、弦の振動数が少なくなり、低い音が出る。また、弦を強くはじくほど、振幅が大きくなり、大きな音が出る。

【過去問 33】

図1のように、形も大きさも同じで材質は異なる直方体の物体A、B、Cと、物体Aと同じ材質で体積が2倍の直方体の物体D、物体A～Dとは形も大きさも材質も異なる物体Eがある。物体A～Dの高さは5 cm、物体にはたらく重力の大きさは、物体Aは1.0 N、物体Bは1.5 N、物体Cは0.4 N、物体Dは2.0 N、物体Eは1.0 Nであり、物体Eの密度は物体Aの密度より大きい。水中の物体にはたらく力について調べるために、物体A～Eを用いて次の実験Ⅰ～Ⅲを行った。このことについて、下の問1～問5に答えなさい。ただし、糸にはたらく重力の大きさと糸の体積は無視できるものとする。

(高知県 2023 年度 A)

図1

実験Ⅰ 図2のように、糸でばねばかりにつるした物体Aをビーカーの中の水に少しずつ沈めていき、物体Aを沈めた深さとそのときのばねばかりの示す値を読み取った。また、物体B、物体Dについても、物体Aと同じ測定を行った。下の表は、この実験の結果をまとめたものである。

図2

物体を沈めた深さ [cm]		0	1	2	3	4	5	6	7
ばねばかりの値 [N]	物体A	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
	物体B	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0
	物体D	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0

実験Ⅱ 図3のように、物体Cを水中に入れ、静かに手を離した。すると、物体Cは水面より上に一部が出た状態で浮かんで静止した。

図3

実験Ⅲ 図4のように、物体Aと物体Eを棒の両端に糸でつるしたところ、棒が水平になって静止した。この状態から、物体Aと物体Eの全体を水中に沈め、そのようすを観察した。

図4

問1 実験Ⅰにおいて、物体Aの全体が水中に沈んでいるとき、物体Aが受ける水圧を矢印を使って模式的に表したものと最も適切なものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、矢印の向きは水圧のはたらく向きを、矢印の長さは水圧の大きさを表している。

問2 実験Ⅰの結果をもとに、物体Aをビーカーの中の水に沈めた深さと、物体Aにはたらく浮力の大きさとの関係を表すグラフを実線でかきなさい。

問3 次の文は、実験Ⅰの結果からわかる、物体にはたらく浮力の大きさについて述べたものである。文中の 、 に当てはまる語の組み合わせとして正しいものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書きなさい。

物体にはたらく浮力の大きさは、 によって決まり、 には関係しない。

ア X—物体の水中にある部分の体積	Y—物体にはたらく重力の大きさ
イ X—物体にはたらく重力の大きさ	Y—物体の水中にある部分の体積
ウ X—物体にはたらく重力の大きさ	Y—物体全体の体積
エ X—物体全体の体積	Y—物体の水中にある部分の体積

問4 実験Ⅱについて、物体Cの水面より上にある部分の体積は、物体C全体の体積の何%か。

問5 実験Ⅲについて、物体Aと物体Eの全体を水中に沈めたとき、棒はどのようになるか。最も適切なものを、次のア～ウから一つ選び、その記号を書きなさい。また、そう判断した理由を、「密度」、「体積」、「浮力」の三つの語を使って書きなさい。

問 1		
問 2	<p style="text-align: center;">物体 A を沈めた深さ [cm]</p>	
問 3		
問 4	%	
問 5	記号	
	理由	

問 1	ウ	
問 2	<p style="text-align: center;">物体 A を沈めた深さ [cm]</p>	
問 3	ア	
問 4	20 %	
問 5	記号	イ
	理由	<p>例 物体Eは物体Aより密度が大きいので、体積は物体Eの方が小さく、物体Eにはたらく浮力は物体Aより小さいから。</p>

問 4 物体Cが水に浮かんで静止したとき、物体Cにはたらく重力の大きさ (0.4N) と物体Cにはたらく浮力の大きさはつり合っているから、物体Cにはたらく浮力の大きさは0.4Nであることがわかる。浮力の大きさは物体の水中にある部分の体積によって決まるので、物体Cにはたらく浮力が0.4Nになるときの物体Cの水中にある部分の体積を考える。その体積を数値で直接求めることはできないが、物体Cと物体Aが同じ形、同じ大きさであることを利用すると、実験 I の表で物体Aを水に4 cm 沈めたときに、 $1.0 - 0.6 = 0.4\text{N}$ の浮力がはたらくていることから、物体Cを水に4 cm 沈めたときにやはり0.4Nの浮力がはたらく。つまり、物体Cが水に浮かんで静止したとき、物体Cは水に4 cm 沈んでおり、 $5 - 4 = 1\text{ cm}$ だけ水面に出ている。したがって、物体Cの水面より上にある部分の体積は、物体C全体の体積の、 $\frac{1}{5} \times 100 = 20\%$ である。

問 5 物体Aと物体Eにはたらく重力の大きさはどちらも1.0Nで、物体Eの密度は物体Aの密度よりも大きいので、物体Eの体積は物体Aよりも小さい。したがって、物体Aと物体Eの全体を水中に沈めたとき、物体Aにはたらく浮力の方が、物体Eにはたらく浮力よりも大きくなる。このことから、物体Aと物体Eが完全に水中にあるとき、大きな浮力がはたらく物体Aの方が水面の方へ移動するので、イのようになることがわかる。

【過去問 34】

次の問いに答えなさい。

(佐賀県 2023 年度 一般)

問2 凸レンズの左側に物体Aをおき、凸レンズの右側に置いたスクリーンを動かすと、図2の位置のときスクリーン上にはっきりとした像ができた。下の(1)、(2)の問いに答えなさい。

- (1) この凸レンズの2つの焦点を作図により求め、点(●)で示しなさい。ただし、作図の線は消さずに残しておくこと。
- (2) 図2の凸レンズを焦点距離の短いものに変えた。このとき、スクリーン上にはっきりとした像ができるときのスクリーンの位置と、できた像の大きさを説明した文として最も適当なものを、次のア～エの中から1つ選び、記号を書きなさい。ただし、物体Aと凸レンズの間の距離は変えないものとする。
- ア スクリーンは図2と比べて凸レンズに近づき、図2のときの像より小さな像ができる。
- イ スクリーンは図2と比べて凸レンズに近づき、図2のときの像より大きな像ができる。
- ウ スクリーンは図2と比べて凸レンズから遠ざかり、図2のときの像より小さな像ができる。
- エ スクリーンは図2と比べて凸レンズから遠ざかり、図2のときの像より大きな像ができる。

問2	(1)
	(2)	

問2	(1)
	(2)	ア

問2 (1) 物体の先端から出て凸レンズの中心を通る光を作図すると、その光とスクリーンの交点に物体の先端から出た光は集まる。光軸に平行に進み凸レンズに入射した光は、凸レンズで屈折した後焦点を通過して、その交点に集まる。また、焦点を通過して凸レンズに入射した光も、凸レンズに入射した後光軸に平行に進み、その交点に集まる。

問3 (2) タンパク質が体内で分解されるときには、有害な物質であるアンモニアが生じる。アンモニアは肝臓(A)で無害な尿素につくりかえられる。その後、尿素は血液によって腎臓(D)に運ばれて、不要な物質として尿中に排出される。

問4 (2) 地球からの距離が遠いほど、地球に届く光の量は少なくなる。

【過去問 35】

次の I, II の問いに答えなさい。

(長崎県 2023 年度)

I 音さを用いて手順 1, 2 で実験を行った。

手順 1 図 1 のように音さをたたき、音による空気の振動のようすをオシロスコープの画面に表示させると、図 2 のようになった。ただし、図 2 の縦軸は振幅、横軸は時間を表しており、横軸の 1 目盛りは 0.001 秒である。また、矢印 $\longleftrightarrow$ は 1 回の振動を示している。

手順 2 条件を同じにして、たたき強さを変えて音さをたたくと、手順 1 のときよりも小さい音が出た。

問 1 1 秒間に音源が振動する回数を振動数という。図 2 に示された音の振動数は何 Hz か。

問 2 手順 2 のとき、オシロスコープの画面に表示されたものとして最も適当なものは、次のどれか。ただし、縦軸、横軸の 1 目盛りの値は図 2 と同じとする。

II 図 3 のように高さが 6.0cm の直方体の物体を軽く細い糸でばねばかりにつると、ばねばかりは 2.0N の値を示した。次に、図 4 のように水面と物体の下面とを一致させた状態から、物体の下面を水平に保ったまま図 5 の状態をへて、水面から物体の下面までの距離が 14.0cm となる図 6 の状態までゆっくり沈めた。図 6 のとき、ばねばかりは 0.5N の値を示した。

問3 次の文は図5, 図6のように, 水中にある物体の面にはたらく力と浮力について説明したものである。文中の空欄 (X), (Y) に適する語句を下の語群から選び, 文を完成せよ。ただし, 同じ語句を2度用いてもよい。

図5のときの物体の下面にはたらく力の大きさは, 図6のときの物体の上面にはたらく力の大きさ (X)。また, 水中の深いところの水圧は浅いところの水圧 (Y) ため, この差により浮力が生じる。

語群 と等しい より大きい より小さい

問4 図4の状態から図6の状態まで物体を沈めるとき, 「ばねばかりの値」と, 「水面から物体の下面までの距離」の関係を表すグラフを解答用紙の図7にかけ。

問1		Hz
問2		
問3	X	
	Y	
問4	<p>図7</p>	

問 1	500 Hz																			
問 2	ウ																			
問 3	X	と等しい																		
	Y	より大きい																		
問 4	<p>図 7</p> <table border="1"> <caption>Data for Figure 7</caption> <thead> <tr> <th>水面から物体の下面までの距離 [cm]</th> <th>ばねばかりの値 [N]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>12.0</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>14.0</td><td>0.5</td></tr> </tbody> </table>		水面から物体の下面までの距離 [cm]	ばねばかりの値 [N]	0	2.0	2.0	1.5	4.0	1.0	6.0	0.5	8.0	0.5	10.0	0.5	12.0	0.5	14.0	0.5
水面から物体の下面までの距離 [cm]	ばねばかりの値 [N]																			
0	2.0																			
2.0	1.5																			
4.0	1.0																			
6.0	0.5																			
8.0	0.5																			
10.0	0.5																			
12.0	0.5																			
14.0	0.5																			

- 問 1 1回の振動の時間は2目盛り分である。1目盛りが0.001秒なので、2目盛りは0.002秒。よって、振動数は、 $1 \div 0.002 \text{ 秒} = 500 \text{ Hz}$
- 問 2 たたく強さ以外は同じ条件なので、音の高さは変わらない。よって、振動数が同じで、振幅が変わっているウがあてはまる。ア、イ、エはいずれも振動数が図2とは異なる。
- 問 3 水圧の大きさは深さによって決まる。図5のときの物体の下面と、図6のときの物体の上面はいずれも水面から8.0cmの深さにあるので、はたらく水圧は等しい。また、図5の物体の下面と図6の上面の面積は等しいので、それぞれの面にはたらく力の大きさも等しい。
- 問 4 物体にはたらく浮力は、水中に沈んだ部分の体積によって決まる。よって、図4の状態から物体が完全に水中に沈むまで（水面から物体の下面までの距離が6.0cmになるまで）は浮力が大きくなっていき、ばねばかりの値は小さくなっていく。物体は直方体なので、水中に沈んだ部分の体積の大きさは、水面から物体の下面までの距離に比例する。物体が完全に水中に沈んだ後は、物体をより深く沈めても浮力の大きさは変わらないため、ばねばかりの値は0.5Nで一定となる。

【過去問 36】

次の問いに答えなさい。

(熊本県 2023 年度)

問1 葵さんと令子さんは、音の性質を調べるため、図25のように、コンピュータにマイクを接続し、モノコードの弦をはじいたときの振動の様子を波形として表示した。図26は、その結果を示したものである。

図25

図26

(1) 図26の波形が得られてから時間が経過するにつれて、モノコードの音が小さくなった。音が小さくなったとき、1回の振動にかかる時間は①(ア 長くなり イ 短くなり ウ 変化せず)、振幅は②(ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変化しない)。

また、図25の木片を移動させて弦をはじいたとき、モノコードの音が高くなった。音が高くなったとき、振動数は③(ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変化しない)。

①～③の()の中からそれぞれ最も適当なものを一つずつ選び、記号で答えなさい。

次に二人は、図25のモノコードを用いて、はじく弦の太さや長さ、弦を張るおもりの質量をかえ、弦をはじいたときの音の振動数を調べる実験Ⅰ～Ⅳを行った。表27は、その結果をまとめたものである。

表27

	弦の太さ [mm]	弦の長さ [cm]	おもりの質量 [g]	振動数 [Hz]
実験Ⅰ	0.3	20	800	270
実験Ⅱ	0.3	20	1500	370
実験Ⅲ	0.3	60	1500	125
実験Ⅳ	0.5	20	1500	225

(2) 表27において、弦の長さと言の高さの関係を調べるには、を比較するとよい。また、弦の太さと音の高さの関係を調べるには、を比較するとよい。

, に当てはまるものを、次のア～カからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

- ア 実験Ⅰと実験Ⅱ イ 実験Ⅰと実験Ⅲ ウ 実験Ⅰと実験Ⅳ
エ 実験Ⅱと実験Ⅲ オ 実験Ⅱと実験Ⅳ カ 実験Ⅲと実験Ⅳ

(3) 20cmの長さの弦と1500gのおもりを使って、200Hzの音を出すためには、弦の太さを

①(ア 0.3mmより細く イ 0.3mmより太く 0.5mmより細く ウ 0.5mmより太く)する必要がある。

また、0.3mmの太さの弦と800gのおもりを使って、150Hzの音を出すためには、弦の長さを

②(ア 20cmより短く イ 20cmより長く 60cmより短く ウ 60cmより長く)する必要がある。

①, ②の()の中からそれぞれ最も適当なものを一つずつ選び、記号で答えなさい。

問 1	(1)	①		②		③	
	(2)	①			②		
	(3)	①			②		

問 1	(1)	①	ウ	②	イ	③	ア
	(2)	①	エ		②	オ	
	(3)	①	ウ		②	イ	

問 1 (2) 音の高さは、振動数が多いか少ないかによって決まる。弦の長さや音の高さの関係を探るには、弦の長さだけが異なり、それ以外の条件(弦の太さとおもりの質量)が同じものどうしを比較するとよい。よって、**実験Ⅱ**と**実験Ⅲ**を比較する。また、弦の太さと音の高さの関係を探るには、弦の太さだけが異なり、それ以外の条件が同じものどうしを比較するとよい。よって、**実験Ⅱ**と**実験Ⅳ**を比較する。

(3) **実験Ⅱ**と**実験Ⅳ**を比べると、どちらも 20cm の長さの弦と 1500 g のおもりで、弦の太さが 0.3mm のときは振動数が 370Hz、弦の太さが 0.5mm のときは振動数が小さくなって 225Hz である。したがって、振動数がさらに小さい 200Hz の音を出すには、弦の太さを 0.5mm よりも太くする必要があるとわかる。また、**実験Ⅱ**と**実験Ⅲ**を比べると、どちらも 0.3mm の太さの弦と 1500 g のおもりで、弦の長さが 20cm のときは振動数が 370Hz、弦の長さが 60cm のときは振動数が小さくなって 125Hz である。したがって、振動数が 125Hz よりも少し多い 150Hz の音を出すためには、弦の長さを 20cm より長く、かつ 60cm より短くする必要があるとわかる。

【過去問 37】

次の問いに答えなさい。

(鹿児島県 2023 年度)

問5 ある日、動物園に行ったみずきさんは、いろいろな動物を見たり、乗馬体験をしたりした。

- 1 動物のエサやり体験コーナーに行くと、エサの入った箱が水平な机の上に置かれていた。エサと箱を合わせた質量を 10kg、エサの入った箱が机と接している部分の面積を 0.2m^2 とするとき、机が箱から受ける圧力の大きさは何 Pa か。ただし、質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。

問5	1	Pa
----	---	----

問5	1	500 Pa
----	---	--------

問5 1 質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさが 1 N であるから、エサの入った 10kg (=10000 g) の箱に加わる重力の大きさは 100N となる。机には、箱によってこの大きさの力が加わるため、圧力の大きさ [Pa] = 面に垂直に加わる力の大きさ [N] ÷ 力が加わる面積 [m^2] より、
 $100\text{N} \div 0.2\text{m}^2 = 500\text{Pa}$ となる。

【過去問 38】

次の問いに答えなさい。答えを選ぶ問いについては記号で答えなさい。

(鹿児島県 2023 年度)

問1 凸レンズのはたらきを調べるため、図1のように、光源、焦点距離10cmの凸レンズ、スクリーン、光学台を使って実験装置を組み立て、次の**実験1**～**3**を行った。このとき、凸レンズは光学台に固定した。

実験1 光源を動かして、光源から凸レンズまでの距離Xを30cmから5cmまで5cmずつ短くした。そのたびに、はっきりとした像がうつるようにスクリーンを動かして、そのときの凸レンズからスクリーンまでの距離Yをそれぞれ記録した。表はその結果であり、「-」はスクリーンに像がうつらなかったことを示す。

表

X [cm]	30	25	20	15	10	5
Y [cm]	15	17	20	30	-	-

実験2 図1の装置でスクリーンにはっきりとした像がうつったとき、図2のように、凸レンズの下半分を光を通さない厚紙でかくした。このとき、スクリーンにうつった像を観察した。

実験3 図1と焦点距離の異なる凸レンズを使って、スクリーンにはっきりとした像がうつるようにした。図3は、このときの光源、凸レンズ、スクリーンを真横から見た位置関係と、点Aから凸レンズの点Bに向かって進んだ光の道すじを模式的に表したものである。

- 凸レンズのような透明な物体の境界面に、ななめに入射した光が境界面で曲がる現象を光の何というか。
- 実験1**で、スクリーンに光源と同じ大きさの像がうつった。このときのXは何cmか。
- 実験2**について述べた次の文中の①、②について、それぞれ正しいものはどれか。

凸レンズの下半分を厚紙でかくしたとき、かくす前と比べて、観察した像の明るさや形は次のようになる。

- ・観察した像の明るさは① (ア 変わらない イ 暗くなる)。
- ・観察した像の形は② (ア 変わらない イ 半分の形になる)。

4 実験3で、点Bを通った後の光の道すじを解答欄の図中に実線(—)でかけ。ただし、作図に用いる補助線は破線(----)でかき、消さずに残すこと。また、光が曲がって進む場合は、凸レンズの中心線で曲がるものとする。

問1	1		
	2	cm	
	3	①	②
	4		

問1	1	屈折	
	2	20 cm	
	3	①	②
	4	イ	ア

- 問1 2 光源から凸レンズまでの距離Xが焦点距離の2倍であるとき、光源と同じ大きさの像がスクリーンにうつる。このとき、凸レンズからスクリーンまでの距離Yも焦点距離の2倍になる。
- 3 凸レンズの下半分を厚紙でかくすと、凸レンズを通る光の量は少なくなるため、できる像の明るさは暗くなる。一方で、光源から出た光は無数にあり、凸レンズの上半分を通った光によって像ができるため、できる像の形は変わらない。
- 4 点Aから出て、凸レンズの中心を通った光は向きを変えずに直進し、スクリーンと交わる点で実像ができる。点Bを通った光も、同じ交点に集まって実像ができるため、凸レンズの中心を通過して直進する光とスクリーンとの交点と点Bを結べばよい。

【過去問 39】

リカさんのクラスは、理科の授業で光の進み方について調べるための**実験**を行った。先生とリカさんの会話を
読み、次の問いに答えなさい。

(沖縄県 2023 年度)

〈実験〉半円形レンズに入射した光が進む道すじを調べる。

〈準備〉

- ① 図1のように、実験に使う半円形レンズより大きい円を紙にかき、円の中心で垂直に交わる線(縦軸、横軸)をかく。さらに、中心から円周に向かって 30° ごとの線をかく。

図1

図2

- ② 図2のように、半円形レンズの直線部分(境界面)と横軸を重ね、その直線部分の midpoint (点O) が円の中心と重なるように置く。
- ③ 円周上の点Aに、光源装置を点Oに向けて置く。ただし、点A、点Bは①で引いた 30° ごとの線上にあるものとする。

先生: では、光が進む道すじを観察してみましょう。光はどのように進んでいますか?

リカ: 光が半円形レンズの中を進み、境界面の点Oに当たった後、光の進む道すじが2本見えます。片方は反射して半円形レンズ側に、もう片方は屈折して空気側に進んでいます。

先生: 次に、光源装置を点Oに向けたまま、光源装置の位置を円周に沿って移動させて、入射角を大きくしてみましょう。

リカ: あれ? 半円形レンズを空気側に通る光がなくなりました。

先生: はい。入射角が一定以上大きくなると、半円形レンズから空気中へ進む光はなくなり、すべての光が境界面で反射します。この現象を(①)といいます。

先生: 次に、光源装置を点Bに移動させて、空気から半円形レンズに光が入射する様子を観察します。光源装置を点Bに移動させましょう。

光が点Oに当たった後、光の進む道すじが2本見えます。片方は反射した光、もう片方は屈折した光ですね。

リカ

それでは、光源装置を点Oに向けたまま、円周に沿って光源装置を動かして入射角を変化させてみましょう。半円形レンズで屈折した光の進み方に注目して観察してください。

先生

問1 光源装置が点Aにあるとき、光の入射角は何度か。整数で答えなさい。

問2 光源装置が点Aにあるときの光の道すじとして最も適当なものを、次のア～エの中から1つ選び記号で答えなさい。

問3 会話文中の (①) に当てはまる語句を答えなさい。

問4 図3に示すように、光源装置を点Bに移動させ、光源装置を点Oに向けたまま円周に沿って移動させ、入射角を 0° 以上 90° 未満の範囲で変化させた。このときの光の進み方として適当でないものを、次のア～エの中から1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 入射角を大きくすると、屈折角も大きくなった。
- イ 光源装置を点Bに置いたとき、屈折した光の屈折角は入射角よりも小さかった。
- ウ 入射角を大きくすると、屈折せずに光がすべて反射した。
- エ 入射角を 0° にすると、光は空気と半円形レンズの境界面で曲がらずに直進した。

リカさんは、半円形レンズを通して向こう側の物体を見ると、物体の位置や大きさが変わって見えることに気が付いた。そこで、次の〈追加実験〉を行った。

〈追加実験〉図4のように、リカさんから見て棒の中心が点Oと一直線上になるように四角形の棒を置き、半円形レンズを通して見る。

〈結果〉図5のように、リカさんの目と同じ高さにある棒の端の点Cが少し外側の点C'にあるように見え、半円形レンズを通して見た棒は実際より太く見えた。

問5 棒の端の点Cから出て、半円形レンズを通して目に入るまでに通った光の道すじを、解答用紙の図に、定規を用いて作図しなさい。ただし、図4中の点線は、リカさんの目の位置と点C、点C'、点Oをそれぞれ結んだ線であり、作図の際に利用してよい。

図4 上から見た棒とリカさんの目の位置

図5 リカさんから見た棒の見え方

問1	度
問2	
問3	
問4	
問5	

問1	30 度
問2	エ
問3	全反射
問4	ウ
問5	

問2 光がガラスや水から空気中に出るとき，入射角は屈折角よりも小さくなる。

問5 光が屈折したとき，光は屈折光の延長線上から直進してくるように見える。

【過去問 40】

ユイさんは海に潜ったとき、自分の身長程度の深さまで潜ると耳の中が痛くなってしまい、それ以上深く潜ることができなかった。なぜそうなるかを調べてみると、

- ・水の中にある物体は、あらゆる方向から水圧を受ける。
- ・外からの水圧によって鼓膜が変形し、耳の中が痛くなる。

ということが分かった。そこで、水圧についての実験を行い、耳の中が痛くなる原因を調べた。次の問いに答えなさい。

(沖縄県 2023 年度)

〈実験〉

- ① 透明な円筒の両側に薄いゴム膜を張った水圧実験器を準備する。(図1)
- ② 円筒を水平にした状態で水を入れた水槽の中に沈め、水面からの深さとゴム膜のようすを真横から観察する。(図2)

図1 水圧実験器

図2 実験のようす

問1 図3は空気中にある水圧実験器を横から見たときのゴム膜のようすを点線で示したものである。〈実験〉で観察されたゴム膜の変化は、次のア～エのようになった。水面からの深さの浅い順にア～エを並べ替えなさい。

図3

ア

イ

ウ

エ

問2 水面からの深さと水圧との関係を調べたところ、図4のようになることが分かった。ユイさんの身長と同じ160cmの深さでは、何Paの水圧が加わるか答えなさい。

問3 水槽の底につかないように、立方体の物体全体を水中に沈めた。物体の面にはたらく水圧を、正しく表しているのはどれか。最も適当なものを次のア～エの中から1つ選び記号で答えなさい。ただし、矢印の長さは水圧の大きさに比例しているものとする。

問4 水中の物体に対し、上向きにはたらく力の名称を答えなさい。

問1	→ → →
問2	Pa
問3	
問4	

問1	エ → ア → ウ → イ
問2	16000 Pa
問3	ウ
問4	浮力

- 問1 水の中にある物体は、あらゆる方向から水圧を受け、水圧の大きさは、同じ深さでは向きに関係なく等しく、深いほど大きくなる。したがって、水面からの深さが浅いほど、ゴム膜のへこみは小さくなる。
- 問2 図4から、水圧の大きさは水面からの深さに比例することがわかる。よって、160cmの深さで加わる水圧の大きさを x とすると、 $1\text{cm} : 100\text{Pa} = 160\text{cm} : x$ より、 $x = 16000\text{Pa}$ となる。
- 問4 水中の物体において、物体の側面に左右方向に加わる水圧は同じ深さでは同じ大きさで向きが反対であるため打ち消し合い、上下方向に加わる水圧は物体の上面に下向きに加わる水圧よりも物体の底面に上向きに加わる水圧の方が大きくなる。これによって、水中の物体には上向きの力がはたらき、この力を浮力という。